This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

COUNTWAY LIBRARY
HC 1YX3 E

16. F. 29.

DIE KRANKHEITEN

DER

MUNDHÖHLE, DES RACHENS UND DER NASE.

Mit Einschluss

der

Rhinoskopie und der local-therapeutischen Technik

für

praktische Aerzte und Studirende

von

DR. PHILIPP SCHECH,

Docent an der Universität München.

Mit 14 Abbildungen.

Zweite sehr vermehrte und verbesserte Auflage.

LEIPZIG UND WIEN.

TOEPLITZ & DEUTICKE.

1888.

16 F. 29

4191

Druck von Wilhelm Kohler, Wien, VI Mollardgasse 41

BOSTON MEDICAL
SEP 1 5 1919
LIBRARY

Vorwort zur ersten Auflage.

Die Fortschritte auf dem Gebiete der Mundrachen- besonders der noch nicht in ihrer Bedeutung genügend gewürdigten Nasenkrankheiten sind in den letzten Jahren so wesentliche geworden, dass der in der Praxis stehende oder in dieselbe eintretende Arzt nicht umhin kann, von ihnen Notiz zu nehmen. Wenn auch an guten, den betreffenden Stoff behandelnden Schriften und Werken kein Mangel ist, so leidet doch bei aller Vortrefflichkeit ein Theil an zu grosser Knappheit oder an allzu grosser Ausführlichkeit. Der Aufforderung der Verlagsbuchhandlung, ein weniger voluminöses aber doch die Materie vollständig erschöpfendes Lehrbuch zu schreiben, kam ich um so lieber nach, als ich in einer zwölfjährigen Lehrthätigkeit nicht nur die Bedürfnisse des Praktikers kennen gelernt habe, sondern auch selbst auf dem Gebiete der Hals- und Nasenkrankheiten litterarisch und praktisch thätig war. Die Eintheilung des Stoffes mag Manchen ungewohnt sein, doch glaube ich, dass sie ebenso gut ist, wie irgend eine andere. Dass das Hauptgewicht überall auf den objectiven Befund gelegt wurde, erschien mir im Hinblicke auf die grosse Zahl symptomatisch gleicher Erkrankungen absolut nothwendig; ist man doch gerade bei den Krankheiten des Mundes, Rachens, Kehlkopfes und der Nase genöthigt, die Diagnose fast nur auf die objectiven Zeichen zu basiren. Die ausführlichere Behandlung mancher Capitel erklärt sich aus der Häufigkeit resp. Wichtigkeit der betreffenden Affection; derjenige, welcher die Therapie zu specialistisch gefärbt findet, möge bedenken, dass es keine andere, einfachere und ebenso wirksame gibt. Die Verdienste Anderer wird der Leser nach Gebühr berücksichtigt finden, aber auch die eigene selbständige Erfahrung und Kritik des Verfassers nicht vermissen.

München, im October 1884.

Dr. Philipp Schech.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Früher als der Verfasser erwarten durfte, ist eine neue Auflage des vorliegenden Werkchens nothwendig geworden. Die günstige Aufnahme, welche das Buch im In- und Auslande gefunden — eine Uebersetzung ins Englische erschien 1886 (The diseases of the mouth, throat, and nose, translated by R. H. Blaikie, Edinburgh: Young J. Pentland) — ist dem Verfasser der beste Beweis, dass dasselbe seinen Zweck nicht verfehlt hat. Die Verbesserungen der zweiten Auflage bestehen theils in Einfügung zahlreicher kleinerer Ergänzungen und Zusätze, theils in Veränderung der Eintheilung und Einschaltung neuer Capitel, wie sie durch die Fortschritte der Wissenschaft und der Vollständigkeit wegen geboten erschienen. Dem vielfach ausgesprochenen Wunsche nach Vermehrung der Abbildungen und einem Literaturverzeichniss wurde gleichfalls Rechnung getragen. Und so möge auch die zweite Auflage, welcher trotz beträchtlicher Vermehrung des Inhaltes der ursprüngliche Charakter eines kurzen Lehrbuches gewahrt blieb, sich derselben günstigen Aufnahme erfreuen wie die erste.

München, im October 1887.

Dr. Philipp Schech.

Inhaltsverzeichniss.

I. Abtheilung.

Die Krankheiten der Mundhöhle und Speicheldrüsen.

	Seite
Anatomisch-klinische Vorbemerkungen	1
Untersuchungsmethode	5
Allgemeine Therapie	6
Missbildungen, angeborene u. erworbene Formfehler und sonstige Anomalien	7
Stomatitis catarrhalis	9
Leukoplakia oris	12
Stomatitis phlegmonosa und parenchymatosa	16
Stomatitis exsudativa	23
Stomatitis ulcerosa	27
Stomatitis diphtheritica	36
Stomatitis gangraenosa	37
Syphilis	41
Tuberculose, Lupus, Lepra, Rotz	45
Mykosen	49
Blutungen	54
Neubildungen und Geschwülste	55
Nervenkrankheiten	58

Die Krankheiten der Speicheldrüsen.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen	65
Vermehrung der Speichelsecretion, Speichelfluss	66
Verminderung der Speichelsecretion	68
Parotitis epidemica	69
Parotitis suppurativa	73
Sialodochitis	75
Erkrankungen der Submaxillaris und Sublingualis	75
Angina Ludovici	76
Neubildungen und Concretionen	78

II. Abtheilung.

Die Krankheiten des Rachens.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen	83
Untersuchungsmethode	88
Allgemeine Therapie	94

Seite
Missbildungen, angeborene u. erworbene Formfehler und sonstige Anomalien 100
Pharyngitis catarrhalis acuta 106
Pharyngitis chronica 114
Pharyngitis phlegmonosa 142
Retropharyngealabscess 147
Pharyngitis exsudativa 151
Pharyngitis diphtheritica 154
Pharyngitis gangraenosa 176
Syphilis 178
Tuberculose 182
Scrophulose, Lupus, Lepra, Rotz 184
Mykosen 187
Blutungen 189
Fremdkörper und Concretionen 191
Neubildungen und Geschwülste 194
Nervenkrankheiten 198

III. Abtheilung.

Die Krankheiten der Nase.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen 207
Untersuchungsmethode 213
Allgemeine Therapie 216
Missbildungen, Anomalien und Formfehler 220
Rhinitis catarrhalis acuta 225
Rhinitis chronica 230
Rhinitis phlegmonosa 242
Rhinitis exsudativa 243
Rhinitis diphtheritica 246
Rhinitis gangraenosa 247
Syphilis 247
Tuberculose 253
Scrophulose, Lupus, Rotz, Rhinosclerom 255
Mykosen und Parasiten 259
Blutungen 260
Fremdkörper und Concretionen 264
Neubildungen und Geschwülste 266
Nervenkrankheiten 276
Reflexneurosen 280

Die Krankheiten der Nebenhöhlen.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen 293
Missbildungen, Formfehler und sonstige Anomalien 295
Die Krankheiten der Kieferhöhle 297
Die Krankheiten der Stirnhöhle 301
Die Krankheiten der Keilbeinhöhle 304
Die Krankheiten der Siebbeinhöhlen 305

Figurenverzeichniss.

			Seite
Figur	1.	Das rhinoskopische Bild	90
„	2.	Vergrössertes Bild des Nasenrachenraums von vorne nach Zaufal	92
„	3.	Universalhandgriff von Schech für galvanokaustische Operationen in Rachen, Nase und Kehlkopf	98
„	4.	Zweielementige Zinkkohlentauchbatterie nach von Bruns	99
„	5.	Adenoide Wucherungen mittleren Grades	117
„	6.	Ringmesser von Gottstein	123
„	7.	Ringmesser von V. Lange	123
„	8.	Choanenzange von Schech	124
„	9.	Ansicht der rechten Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes	209
„	10.	Verschiedene Nasenspiegel	214
„	11.	Einfache und polypoide Hypertrophie der hinteren Muschelenden	232
„	12.	Vom Vomer ausgehender Nasenrachenpolyp	268
„	13.	Vom Keilbein ausgehender Nasenrachenpolyp	268
„	14.	Schlingenschnürer für die Nase (kalte Schlinge)	271

I. Abtheilung.

Die Krankheiten der Mundhöhle und der Speicheldrüsen.

BOSTON MEDICAL
SEP 15 1919

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen.

Als Mundhöhle bezeichnet man denjenigen Raum, welcher vorne von den Lippen, seitlich von der Schleimhaut der Wangen, oben vom harten Gaumen, hinten vom Gaumensegel und unten von der Zunge und den vom Unterkiefer zum Zungenbein gehenden Muskeln begrenzt wird. Durch das Vorgeschobenwerden der Alveolen des Ober- und Unterkiefers zerfällt die Mundhöhle in zwei Theile, einen kleineren vorderen, das Vestibulum oris, und einen grösseren hinteren, das eigentliche Cavum oris. Beide Theile communiciren mit einander durch eine Lücke, welche zwischen dem letzten Backzahne und dem vorderen Rande des Kronenfortsatzes des Unterkiefers liegt. Die vordere Oeffnung der Mundhöhle, die Rima oris, wird gebildet durch die Lippen, zwei äusserst bewegliche Gebilde, deren Bedeckung in die Schleimhaut des Digestionstractus übergeht und von denen jede mittelst einer schmalen Schleimhautfalte, dem Frenulum labii super. et infer., an das Zahnfleisch angeheftet ist. Die Schleimhaut der Lippen setzt sich einerseits auf die Innenfläche der Wangen, anderseits auf die Alveolarfortsätze des Ober- und Unterkiefers fort, um durch die Lücken zwischen den Zähnen auf den harten Gaumen und mittelst des Zungenbändchens auf die Zunge und die Ausführungsgänge der Sublingual- und Submaxillardrüsen sich zu erstrecken.

Wenn auch die vordere Fläche des weichen Gaumens anatomisch noch zur Mundhöhle gehört, so kann derselbe doch erst bei den Rachengebilden besprochen werden.

Der wichtigste Bestandtheil der Mundhöhle ist die Zunge.

Ihre obere convexe Fläche ist bis zum Isthmus faucium hin mit Tast- und Geschmacksorganen besetzt und erhält dadurch ein unebenes rauhes, zottiges Aussehen. Man unterscheidet kleine fadenförmige Erhabenheiten, die Papillae filiformes, welche in unzähliger Menge die Oberfläche der Zunge einnehmen und derselben das rauhe, pelzartige Aussehen geben, ferner die grösseren Papillae fungiformes, welche als rundliche Knöpfchen oder kurze, zapfenartige Höcker zwischen den ersteren eingestreut sind, und endlich die grössten, die Papillae circumvallatae, welche in V-förmiger Stellung gegen den Isthmus faucium gerichtet über die übrige Schleimhaut beträchtlich hervorragen und deshalb von ängstlichen

Leuten öfters für pathologische Producte, besonders für Krebswucherungen gehalten werden.

Der hinterste Theil der Zunge von den wallartigen Papillen bis zum Kehldeckel hinab besitzt sehr entwickelte Balgdrüsen, welche geschlossene Follikel enthalten. An den Seitenrändern der Zunge, unmittelbar vor der Insertion der vorderen Gaumenbögen, findet sich theils eine flache, unebene oder gekerbte Erhabenheit, theils eine deutlich abgegrenzte, linsengrosse Erhöhung, die Papilla foliata, ein Geschmacksorgan, das, namentlich wenn dasselbe excessiv vergrössert oder gar der Sitz von Schmerzen ist, für ein pathologisches Gebilde gehalten werden kann.

Hinsichtlich der Oberfläche der Zunge begegnet man den grössten Verschiedenheiten.

Während meistens die Oberfläche glatt und gleichmässig ist, erscheint sie bei manchen Personen der Länge und der Quere nach zerklüftet und tief eingeschnitten, welchen Zustand man auch als Glossitis dissecans bezeichnet.

Sehr häufig finden sich sowohl unter normalen als pathologischen Verhältnissen an den Rändern der Zunge die Abdrücke der Zähne. Treten die Papillen durch Schwellung und Röthung stärker hervor, dann spricht man von Himbeer-, Katzen- oder Erdbeerzunge, wie sie hauptsächlich bei Scharlach beobachtet wird. Narben an der Zunge deuten auf frühere Verletzungen, vielleicht in Folge von Epilepsie, überstandener Syphilis oder Leukoplakie.

Die Oberfläche der Zunge ist mit einer weissen, weissgelben oder grünlichen Masse bedeckt, welche gegen die Zungenspitze zu allmählich spärlicher wird oder ganz fehlt, in der Mitte der Zunge aber, besonders gegen den Isthmus faucium hin an Mächtigkeit zunimmt, dem sogenannten Zungenbelag, dessen Vorhandensein nach Unna an die haarbüscheltragenden Papillae filiformes geknüpft ist.

Bei manchen ganz gesunden Individuen, namentlich Rauchern und Trinkern, erreicht der Zungenbelag eine Dicke, die man sonst nur bei pathologischen Zuständen zu sehen bekommt. Der pathologische Zungenbelag entsteht in den meisten Fällen durch eine Schwellung der gesammten Haarbüschelbegleitung der Pap. filif.

Die Weisse des Zungenbelags ist theilweise durch Quellung der obern Hornschichten theilweise durch Pilzwucherungen in denselben bedingt.

Trocknes, glänzendes, wie lackirtes Aussehen der Zunge beobachtet man bei Fiebernden, namentlich Typhösen, Pneumonikern, Diabetikern oder Solchen, welche nicht durch die Nase athmen können, ebenso bräunlichen fuliginösen Belag; schwarzer oder dunkelbraunrother Belag rührt theils von Medicamenten und Ingesten, so namentlich von Eisenpräparaten, Succ. liquir, Rothwein und Heidelbeeren, theils von eingetrocknetem Blute aus kleinen Schleimhautrissen her.

Die Form des Zungenbelags variirt ausserordentlich. Er erscheint theils in Längsstreifen an den Rändern oder in der Mitte der Zunge, theils in Form rundlicher oder länglicher Flecken, theils in Gestalt

gewundener Linien und Kreise, deren Centrum roth erscheint, theils in zusammenhängenden Flächen. Der Belag besteht, wie jener an dem Zahnfleisch und zwischen den Zähnen, zum kleinern Theile aus jüngeren und älteren theilweise fettig degenerirten Epithelien, Speiseresten, Fettkugeln, Schleimkörperchen, zum grösseren Theile hingegen aus Microorganismen, Leptothrix, Coccen, Bacterien, Bacillen und Spirillen. Wenn auch diese Organismen, von denen Miller in dem Verdauungstractus an 25 verschiedene Arten gefunden hat, für gewöhnlich unschädlich sind, so können dieselben doch zeitweise und unter gewissen nicht näher bekannten Umständen, wenn sie in eine Wunde gerathen, gefährliche Erscheinungen zur Folge haben, wie auch durch zahlreiche Versuche constatirt ist, dass durch Inoculation normalen Mundspeichels Thiere getödtet werden können.

Die Schleimhaut der Mundhöhle ist nicht an allen Orten gleich stramm an ihre Unterlage festgeheftet. Am festesten ist sie über dem harten Gaumen, lockerer an den Uebergangsstellen zum Zahnfleisch und den Lippen. Ihr Epithel ist Pflasterepithel, das namentlich an der Zunge in beständiger Desquamation begriffen ist. Sie ist besonders reich an Schleimdrüsen, deren Ausführungsgänge als stecknadelstichgrosse Punkte leicht erkennbar sind, während die zu Gruppen vereinigten Acini namentlich an den Lippen durch die Schleimhaut durchschimmern.

Blässe der Schleimhaut deutet stets auf Anämie, mag sie eine primäre oder secundäre sein. Cyanose sieht man bei Herzfehlern und Larynx- und Trachealstenose, Emphysem, braune Pigmentirung in Form kleinerer oder grösserer Flecken an den Lippen, Wangen und hartem Gaumen bei Morb. Addisonii, weisse Flecken bei Leukoplakie, Hydrargyrose, Soor, Aphthen, Syphilis etc., gelbe bei Xanthelasma.

An Lymphgefässen ist besonders die Zunge reich. Die Capillaren der Schleimhaut und ihrer Papillen bilden reiche injicirbare Netze, welche zu grösseren Stämmchen zusammenfliessen und mit denen des Pharynx und der Zungenmuskeln sich verbinden. An Lymphdrüsen sind besonders zu nennen die Glandul. auricul. anter., faciales profundae, hauptsächlich aber die Submaxillares und die oberflächlichen und tiefen Cervical- und Jugulardrüsen.

Die arteriellen Gefässe der Mundhöhle stammen aus sehr verschiedenen Zweigen. So schickt z. B. die Art. maxillaris externa die Art. submentalis für die Haut und Muskeln unter dem Kinne, die Rami glandulares und musculares für Parotis, Submaxillaris, M. digastricus, stylohyoideus, masseter und pterygoid. int., ferner die Coronaria der Ober- und Unterlippe; die Art. auricul. post. aus der Carotis externa versorgt die Parotis, den M. digastricus, stylohyoideus, styloglossus etc.; die Art. temporalis gleichfalls die Parotis und mittelst der Art. transversa faciei die Wange und Gesichtsmuskeln; an die Zähne gehen Aeste der Art. maxillar. interna, so die Art. alveol. inf. an die Zähne des Unterkiefers, die Art. alveolar. sup. an die des Oberkiefers, endlich gehen auch noch Aeste der Art. maxill. int. an die Kaumuskeln.

Die grössten Gefässe führt die Zunge. Die Arteria lingualis aus der Carotis externa entspringt in gleicher Höhe mit dem grossen Horne des Zungenbeins und dringt zwischen Hyoglossus und Constrictor phar. med. in die Zunge ein. Ihre Verzweigungen in der Zungensubstanz selbst heissen Art. hyoidea, Art. dorsal. linguae, Art. sublingualis und Art. profunda linguae oder ranina; die letztere ist der stärkste Ast und tritt neben dem Frenulum linguae in die Zunge, weshalb sie bei Operationen am Boden der Mundhöhle, wie z. B. dem Lösen des Frenulum, leicht verletzt werden kann.

Die Venen Venae buccales, labii super. und inf. massetericae, parotideae, submentalis, münden in die Vena facial. anter., die Vena transvers. faciei, alveolaris super. et infer., parotidea münden in die Vena facialis posterior, die unter der Zungenspitze entstehenden Venae linguales in die V. jugular. interna.

Die Nerven der Mundhöhle dienen theils dem Tastsinne, theils dem Geschmack, theils der Bewegung der Muskeln.

Die Gefühlsnerven stammen aus dem Trigeminus, die Geschmacksnerven aus dem Glossopharyngeus. Dem Nerv. lingualis des Trigeminus, besonders der in ihm vorhandenen Chorda tympani, welche vom Facialis stammt, schreibt man eine specifische Geschmacksempfindung zu, zumal er sich in jenen Regionen der Zungenschleimhaut verbreitet, in die der Glossopharyngeus nicht hingelangt.

Die Motilität der Zunge wird durch den N. hypoglossus vermittelt; seine Zweige begeben sich zum M. hyoglossus, M. geniohyoideus, genioglossus, longitudinalis und transversus linguae. Die Musc. mylohyoid., sowie der vordere Bauch des M. biventer erhalten ihre Innervation vom dritten Aste des Trigeminus. Die Kaumuskeln werden von der motorischen Portion des Trigeminus innervirt, der Orbicul. oris sowie die mimischen Muskeln vom N. facialis.

Die Muskulatur der Mundhöhle setzt sich zusammen aus den Muskeln der Lippen, der Wangen und der Zunge.

Unter den Muskeln der Lippen ist der wichtigste der Orbic. oris. Er schliesst den Mund, spitzt die Lippen zum Pfeifen, Küssen und Ausblasen des Lichtes und verlängert sie zu einem kurzen Rüssel beim Saugen.

Zu den mimischen Muskeln gehören der Levator lab. super., der Levat. und Depressor anguli oris, der Zygomat. maj. und minor, der Risorius Santorini, Levator menti etc.

Von den Muskeln der Wange ist der Buccinator zu erwähnen. Wirkt er allein, so erweitert er die Mundhöhle in die Quere; wird diese Erweiterung durch die gleichzeitige Thätigkeit des Orbic. oris aufgehoben, dann drückt er die Wange an die Zähne oder er comprimirt die mit Luft gefüllte Mundhöhle, welche, wenn die Lippen sich ein wenig öffnen, mit Gewalt entweicht, wie beim Spielen von Blasinstrumenten; er heisst deshalb auch Trompetermuskel.

Zu den Kaumuskeln rechnet man den Musc. temporalis, den Masseter und Pterygoid. internus und extern. Sie haben alle die Function, den Unterkiefer an den Oberkiefer heranzuziehen; der ptery-

goid. int. hebt nicht nur den Unterkiefer, sondern schiebt ihn auch nach vorne, wenn er einseitig wirkt, nach der entgegengesetzten Seite und wird dabei vom Pteryg. int. unterstützt.

Der Boden der Mundhöhle resp. Zunge wird gebildet von dem M. digastricus (biventer), mylohyoideus, geniohyoideus, stylohyoideus, genioglossus, hyoglossus, styloglossus.

Die Zunge selbst besteht ausser den sich rechtwinkelig miteinander verwebenden Fasern des Genioglossus, hyoglossus und styloglossus noch aus drei besonderen Muskelschichten, welche in der Zunge entspringen und auch in ihr endigen.

Die obere Längenschichte gleich unter der Schleimhaut gelegen schiebt ihre Bündel zwischen die des Genioglossus hinein. Die untere überragt an Stärke die obere. Sie dehnt sich zwischen dem Musc. genioglossus und hyoglossus an der unteren Fläche der Zunge bis zur Spitze hin.

Die quere Muskelschichte, Musc. lingualis transversus, entspringt von den Seitenflächen des Septum linguae. Ihre Fasern laufen nach aus- und aufwärts, die inneren gehen zum Rücken der Zunge, die äusseren zum Zungenrande und schieben sich zwischen den Längsfasern des Genioglossus und Hyoglossus hindurch.

Die M. genioglossi ziehen die Zunge nach vorne und bewirken deren Herausstrecken, die M. hyoglossi ziehen sie nach hinten. Gemeinschaftlich wirkend platten diese beiden Muskeln die Zunge ab. Die einzelnen Muskelfasern können sich unabhängig von einander contrahiren, wodurch die Zunge nach auf- und abwärts, rechts und links beweglich und wölbungsfähig wird und sich auch rinnenförmig vertiefen kann.

In der Mundhöhle befinden sich die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, deren anatomische Beschreibung bei den Krankheiten der Speicheldrüsen nachzusehen ist.

Untersuchungsmethode.

Zur Untersuchung der Mundhöhle bedient man sich vorzugsweise der Inspection.

Man lässt entweder das diffuse oder reflectirte Tageslicht in die Mundhöhle fallen, oder bei trübem Wetter oder bei Nacht das reflectirte künstliche Licht. Niemals unterlasse man, mit den hakenförmig in die Mundwinkel eingesetzten Zeigefingern die Wangen abzuziehen oder die Lippen umzustülpen und Zähne und Zahnfleisch genau zu besichtigen.

Schlechte, cariöse Zähne finden sich sehr oft im Gefolge von Bluterkrankungen, so namentlich bei Anämie, Tuberculose, Syphilis, Diabetes mellitus, ferner bei Verdauungsstörungen, Rhachitis, rasch aufeinanderfolgendem Genuss heisser und kalter Ingesta, dem Gebrauch

von Mineralsäuren und gewisser Eisenpräparate und Mundwässer. Das Zahnfleisch zeigt häufig einen rothen, entzündeten und gelockerten Rand, so namentlich bei Scorbut; häufig ist ein schiefergrauer Saum bei Bleivergiftung.

Grosse Schwierigkeiten bietet oft die Untersuchung des Bodens der Mundhöhle. Während Sänger oder Gesangeskundige durchwegs ihrer Zunge jede gewünschte Stellung geben können, benehmen sich Ungeübte, besonders Fettleibige, Bonvivants oder Aengstliche meist recht ungeschickt. Würge- und Brechbewegungen beim blossen Versuche, die Zunge herauszustrecken, rollendes Herumwerfen derselben sowie Einrisse in das Zungenbändchen gehören bei diesen zu den gewöhnlichen Vorkommnissen. Wie sehr die laryngoskopische Untersuchung durch das sogenannte Steigen der Zunge erschwert wird, ist ja genügend bekannt.

Der hinterste Theil der Zunge wird am besten mit dem Kehlkopfspiegel untersucht, doch leistet auch die Palpation mit dem Finger gute Dienste. Dieselbe ist unentbehrlich zur Constatirung des Umfanges und der Consistenz etwaiger Tumoren oder Fremdkörper, sowie der Beschaffenheit des Grundes und der Ränder der Geschwüre.

Wichtige Aufschlüsse gibt auch in manchen Fällen der Geruchssinn, sowie die chemische Analyse der Mundsecrete. Von grösster Bedeutung ist endlich auch die mikroskopische Untersuchung der Geschwürssecrete, Belege, Gewebsbestandtheile und Neubildungen.

Allgemeine Therapie.

Die Mundhöhle ist der localen Behandlung sehr leicht zugänglich. Die Application von Heilmitteln in Form von Mundwässern ist so alt wie die Medicin. Man benützt dazu wässerige oder schleimige Flüssigkeiten, Pflanzeninfuse oder Decocte, in welchen die Arzneistoffe aufgelöst oder suspendirt werden. Am häufigsten werden jetzt gebraucht die Desinficientia, so namentlich das Kali chloricum, Kali hypermang., die Salicyl-, Bor-, Carbolsäure, das Salol, (ein Kaffeelöffel voll einer 6% alkoh. Lösung in einem Glas Wasser); ferner die Adstringentia, Alaun, Natr. biborac., Tannin, Arg. nitr., Tinct. Ratanh.; Tinct. gallar., endlich auch die Aromatica, Tinct. Benzoes, Tinct. Myrrhae etc. Diese Stoffe werden auch in Form von Einspritzungen, Inhalationen und Pinselungen angewendet.

Pulverförmige Substanzen, Seifen, Pasten sind fast nur zur Reinigung der Zähne in Gebrauch.

Von den narkotischen Mitteln sind die beliebtesten Tinct. opii, Morphium; als locales Anästheticum, besonders bei schmerzhaften Fissuren und Geschwüren empfiehlt sich besonders das Cocain.

Von den Aetzmitteln sind die gebräuchlichsten Argent. nitr.; Zinc. chlor., Sublimat, Milchsäure, Chromsäure, ferner der Thermo-

cautère und die Galvanokaustik. Auch die Elektricität findet zur Reizung der Muskeln und Nerven ausgedehnte Verwendung. Relativ selten dagegen werden in der Neuzeit verordnet die Kaumittel, Pastillen, Lecksäfte.

Bei manchen Affectionen ist endlich auch eine externe Behandlung nöthig; sie besteht in Blutentziehungen mittelst Blutegeln und der Application kalter und warmer Umschläge und medicamentöser Einreibungen und Bepinselungen mit Jod, Jodoform, Ung. cin., Chloroform, Ol. Hyoscyami.

Auch die Massage wurde, allerdings mit sehr zweifelhaftem Erfolge, bei Lymphdrüsengeschwülsten, Cysten etc. empfohlen.

Missbildungen, angeborene und erworbene Formfehler und sonstige Anomalien.

Unter den Formfehlern der Mundhöhle kommen vor allen jene Spaltbildungen in Betracht, welche dadurch zu Stande kommen, dass die einzelnen Theile, aus welchen sich das Gesicht zusammensetzt, sich getrennt von einander entwickeln oder dass dieselben da, wo diese Trennung für eine gewisse Entwicklungsstufe normal ist, sich später nicht miteinander vereinigen.

Die bekannteste und häufigste Missbildung ist die Spaltung der Lippen, die Hasenscharte. Sie betrifft meist die Oberlippe seitlich von der Mittellinie und ragt häufig bis an den Nasenflügel oder in das Nasenloch hinein. Sie ist häufiger einseitig als doppelseitig, auf beiden Seiten gleich stark oder auf einer Seite schwächer entwickelt. Von den Dehiscenzen der eigentlichen Mundhöhle ist zu erwähnen die Kieferspalte zwischen Schneide- und Augenzahn. Dieselbe kann sich auf den harten Gaumen fortsetzen und erzeugt so die Gaumenspalte oder bei Doppelseitigkeit den Wolfsrachen, bei welchem in der Regel auch Lippen und weicher Gaumen mitgespalten erscheinen. Die Folgen dieser Missbildung beziehen sich hauptsächlich auf die Ernährung. Da das Saugen erschwert ist, bleiben die Kinder oft atrophisch, auch dann, wenn die Nahrung mit dem Löffel gegeben wird, da ein Theil durch die Nase herausgeschleudert wird.

Auch theilweisen oder gänzlichen Verschluss der Mundhöhle durch Verwachsung der Lippenränder hat man beobachtet, ebenso abnorme Kleinheit der Mundöffnung, „Mikrostomie", so dass manchmal kaum eine Sonde durchpassiren kann, ferner abnorme Kürze der Lippen, „Brachylie", abnorme Kürze des Lippenbändchens, Lippenfisteln, Verwachsungen und Verbindungen der Lippen mit den Alveolarrändern der Kiefer oder dem Gaumen. Relativ selten ist die Doppellippe; man versteht darunter einen allmälig an dem Roth der Oberlippe sich entwickelnden Wulst, der

durch eine Furche von der eigentlichen Lippe getrennt und durch das Frenul. labii öfters in zwei Hälften getheilt wird.

Verhältnissmässig häufig ist die Hypertrophie der Lippen. Sie ist theils angeboren theils erworben und beruht auf Wucherung des interstitiellen Bindegewebes in Folge von Eczem, chron. Rhinitis, resp. Lymphadenitis und venöser Stase. Bekannt ist die dicke Oberlippe der scrophulösen und tuberkulösen Kinder und die der Erwachsenen in Folge von häufigen Entzündungen dieser Theile. Die geschwellte Lippe ist schmerzlos, fühlt sich hart und derb an und ist zuweilen mit Einrissen versehen. Hypertrophische knorpelharte Lippen sah Verf. einmal in einem Falle von Sclerema adultorum.

Als angeborne Anomalien kommen auch das Fehlen und die Spaltung der Zunge, die abnorme Kleinheit oder die abnorme Grösse, Makroglossie, zur Beobachtung, ferner Verwachsungen der Zunge mit dem Zahnfleische und dem Boden der Mundhöhle, angeboren oder erworben nach Ulcerationen, ferner zu grosse Kürze oder zu grosse Länge des Zungenbändchens. Mit der abnormen Kürze des Frenulum, der „angewachsenen Zunge", wurde von jeher viel Unfug getrieben und alles Mögliche auf das angebliche Vorhandensein dieser Anomalie geschoben; von einer abnormen Kürze des Zungenbändchens kann jedoch nur dann die Rede sein, wenn der Finger nicht unter die Spitze der Zunge gelegt und diese letztere nicht über die Schneidezähne hervorgestreckt werden kann. Da, wo das Zungenbändchen sich zu weit nach vorne inserirt, sind die Bewegungen der Zungenspitze beschränkt und das Saugen und Sprechen erschwert. Zu grosse Länge des Frenulum bedingt das sogenannte Verschlucken der Zunge, welche sich beim Saugen gegen den harten Gaumen aufbäumt und durch Niederdrücken des Kehldeckels Dyspnoe verursachen kann; dasselbe geschieht häufig in der Chloroformnarkose, wenn die gelähmten Muskeln in Folge ihrer Schwere die Zunge nach rückwärts ziehen. Das Lallen, Stammeln, Stottern, sowie die anderen Sprachfehler, Sigmatismus, Rotacismus, Lambdacismus, haben relativ selten ihren Grund in organischen Veränderungen der Sprachwerkzeuge, als vielmehr in unrichtiger Verwendung und Stellung oder mangelhafter Uebung.

Erwähnt sei noch, dass Schäffer einmal einen Nävus des Gesichts sich auf die Schleimhaut des Mundes, Rachens und Kehlkopfes fortsetzen sah.

Von den erworbenen Defecten des harten Gaumens nehmen in Bezug auf Häufigkeit die durch Zerfall syphilitischer Producte entstandenen die erste Stelle ein; seltener verdanken sie penetrirenden Schusswunden oder der Phosphornekrose oder der Scrophulose, dem Lupus und Carcinom ihre Entstehung.

Erworbene Lippenspalten sind die Folgen von Verletzungen, Hieben, Schnitten; Verwachsungen der Lippen mit dem Kiefer, Mangel der Lippen (Achylie), sowie Ectropien sind bedingt durch geschwürige Zerstörung und Narbenretraction. Einrisse und Fissuren des Lippenroths sind namentlich zur kälteren Jahreszeit sehr häufig und schmerzhaft.

Eine Folge tiefgehender Ulcerationen und Substanzverluste der Mundhöhle, wie sie bei Stomacace, Scorbut und Noma vorkommen, ist die narbige Kieferklemme. Durch ausgebreitete Narben, welche vom Oberkiefer von der Innenseite der Wangen zum Unterkiefer herabziehen, wird das Oeffnen des Mundes unmöglich gemacht.

Es gibt ferner auch eine arthrogene und myogene Kieferklemme; die erstere ist bedingt durch Ankylose des Kiefergelenks in Folge von Verletzungen, Fracturen und Gelenkentzündungen, die letztere durch syphilitische Gummata resp. schwielige Entartung (Myositis) oder abnorme Erregungszustände der Kaumuskeln.

Da die Behandlung des grössten Theils der besprochenen Zustände in das Gebiet der plastischen Chirurgie fällt, so soll hier nur der Lösung des Zungenbändchens gedacht werden. Man bringt das Bändchen zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand oder in den Einschnitt einer Myrthenblattsonde und schneidet mit einer Scheere das Bändchen ein, hüte sich aber vor einer Verletzung der Zungensubstanz, da sonst die Blutung aus der A. ranina eine sehr beträchtliche sein kann.

Gegen die Hypertrophie der Lippen muss, wenn dieselbe auf scrophulöser Basis beruht, ausser passender Diät mehrere Monate lang Leberthran oder Jodeisen verabreicht und ein kochsalz- oder jodhaltiges Bad, so namentlich Nauheim, Kreuznach, Tölz, Heilbrunn, Hall, sowie längerer Landaufenthalt verordnet werden.

Stomatitis catarrhalis.

Die Entzündung der Mundhöhle charakterisirt sich in ihrer einfachsten Form als erythematöse Röthung und Schwellung der Schleimhaut, deren Secretion in der Regel sehr gesteigert ist.

Aetiologisch unterscheidet man eine primäre oder idiopathische und eine secundäre oder symptomatische, sowie eine acute und chronische Stomatitis.

Als Ursachen der acuten primären Form müssen mechanische, chemische und thermische Reize angeführt werden, als da sind: scharfe Zahnkanten, Zahncaries, Zahnstein, Durchbruch der Zähne, dauernd erschwertes Saugen in Folge von Milchmangel der Brüste oder schlechter Warzen und Saugpfropfen, allzu energisches Abschaben der Zunge, zu heisse und zu kalte, zu stark gewürzte und saure Speisen, scharfkantige Ingesta, Nüsse, Mandeln, saures Obst, Alcoholica, Tabak, Mineralsäuren und caustische Alkalien. Die ausserordentliche Häufigkeit von Mundkrankheiten bei Säuglingen erklärt sich theils aus dem Gebrauche der Lutschbeutel, unreiner Gummistöpsel oder Veilchenwurzeln, kurz aus mangelhafter Pflege der Mundhöhle, theils nach Epstein aus dem Reize der Luft, dem mechanischen Acte des Saugens, der zarten Beschaffenheit der Epithelien

und der oft allzu energischen Reinigung der Mundhöhle. Ob Erkältungen in ähnlicher Weise wie auf der Schleimhaut des Rachens und der Nase Entzündung erzeugen können, erscheint sehr zweifelhaft.

Die secundäre Stomatitis findet sich als Begleiterin anderweitiger Mundaffectionen, namentlich der Geschwüre, sowie der meisten fieberhaften und Infectionskrankheiten, so namentlich des Scharlachs, der Masern, der Blattern, des Erysipels und Typhus, ferner auch der meisten Affectionen des Magendarmcanals; endlich nach Einverleibung gewisser Medicamente, wie des Jods, Broms und Quecksilbers.

Unter den subjectiven Erscheinungen nimmt bei der acuten Form der Schmerz die hervorragendste Stelle ein; die Empfindlichkeit, die sich schon bei dem Erfassen der Ingesta bemerkbar macht, steigert sich beim Kauen zu intensiven Schmerzen, so besonders an der Zungenspitze; Kinder greifen beständig in den Mund, strecken die Zunge heraus, verweigern die Saugflasche oder Brustwarze und lassen dieselben sofort unter Wimmern und Schreien wieder los. Anfangs klagen die meisten Kranken über Hitzegefühl und Trockenheit im Munde, später über vermehrte theils flüssige theils klebrige Secretion. Der Appetit ist theils normal theils verringert, letzteres namentlich bei den mit Fieber oder Magendarmaffectionen verbundenen Fällen, der Durst vermehrt. Der Geschmack ist in erheblicher Weise verändert, alle Speisen, besonders die aromatischen, schmecken gar nicht oder schlecht. Der von den Kranken geklagte faulige, fade, pappige Geschmack muss theils auf die Zersetzung der Secrete theils auf Alteration der Geschmacksnerven zurückgeführt werden.

Wenn auch Erwachsene durch die Affection wenig in ihrer Ernährung leiden, so ist es doch begreiflich, dass Säuglinge und jüngere Kinder durch eine länger anhaltende Stomatitis sehr herunterkommen, eventuell sogar zu Grunde gehen können.

Die objectiven Erscheinungen bestehen in einer mehr oder weniger ausgesprochenen Röthe und Schwellung der Schleimhaut; die Zungenränder sowie die Wangen zeigen die Eindrücke der Zähne, die Schleimhaut ist mit einem weisslichen, zähen, fad- oder übelriechenden Schleim überzogen, der sehr zellen- und kernreich ist und besonders auf der Zunge und dem Zahnfleische eine beträchtliche Dicke erreicht. Die Papillen der Zunge sind kolbig geschwellt, treten deutlich hervor, werden durch tiefe Furchen von einander geschieden, das sie bedeckende Epithel ist gequollen, von weissgrauer oder gelblicher Farbe; in selteneren Fällen wird das Epithel abgestossen und es treten die lebhaft rothen zuweilen blutigen Spitzen der Papillen zu Tage (Papillitis). Bei hysterischen Frauen schwellen zuweilen die Papill. circumvallatae an, um sich nach einigen Tagen von selbst wieder zurückzubilden.

Localisirt sich der Process auf dem Zahnfleisch (Gingivitis), dann sind die Beschwerden im Ganzen geringer; dasselbe erscheint tief- oder blauroth, die Fortsätze zwischen den Zähnen vergrössert und mit schmierigem Secrete bedeckt. Sehr schmerzhaft ist die

Schwellung des Zahnfleisches an der Rückfläche der obern Schneidezähne und den benachbarten Theilen des harten Gaumens; die normaler Weise hier befindlichen zahlreichen Falten der Schleimhaut nehmen beträchtlich an Volumen zu und sind trotz der geringen an ihnen wahrnehmbaren Röthe spontan oder bei Berührung sehr empfindlich. Die Schleimhaut des harten Gaumens ist netzförmig injicirt, die Schleimdrüsen erscheinen vergrössert und treten als hirsekorngrosse weisse oder rothgraue Knötchen oder als helle Bläschen deutlich hervor.

Geschwüre kommen bei einfacher Stomatitis nicht oder nur ausnahmsweise bei Kindern vor, höchstens kommt es zur Lockerung und Desquamation des Epithels.

Eine eigenthümliche Form ist die Stomatitis sicca, ein Analogon der Pharyngitis sicca. Verfasser sah die theils acut theils chronisch verlaufende Affection bisher nur bei älteren Personen. Die Schleimhaut der Zunge, der Lippen, des weichen Gaumens erscheint geröthet, die Zungenoberfläche glatt, mit äusserst spärlichen Papillen besetzt, glänzend wie lackirt und mit einem bald zähen und klebrigen bald zu Borken eingetrockneten Secrete bedeckt.

Die Hauptklage besteht in unerträglicher zu häufiger Anfeuchtung mit Wasser nöthigender Trockenheit im Munde und Rachen; zuweilen ist auch Empfindlichkeit gegen zu warme oder zu kalte sowie scharfe Speisen und Getränke vorhanden.

Die chronische Stomatitis verdankt hauptsächlich dem Missbrauche des Alkohols und des Tabaks ihre Entstehung. Ganz constant ist sie bei Säufern, zumal wenn sich bei ihnen schon hochgradige Verdauungsstörungen eingestellt haben. Die Beschwerden sind oft sehr gering, namentlich kann Schmerz ganz fehlen. Bei Schwangeren, hauptsächlich schwächlichen Mehrgeschwängerten, kommt zuweilen eine vom vierten Monate der Gravidität bis zum ersten oder zweiten Monate nach der Geburt dauernde sehr schmerzhafte Entzündung des Zahnfleisches vor, die selbst zum Ausfallen der Zähne Anlass geben kann.

Der Verlauf der acuten idiopathischen Stomatitis ist gut, da meist schon nach einigen Tagen ein Rückgang der Erscheinungen bemerkbar wird; auch die symptomatische Form gibt eine günstige Prognose, doch ist der Verlauf dem Charakter der Grundkrankheit entsprechend oft ein sehr schleppender; die chronische Stomatitis kann Monate und Jahre dauern, zumal wenn die Schädlichkeiten, welche sie veranlassten, fortwirken.

Die Behandlung sei vor allen Dingen eine causale, schädliche Ingesta müssen verboten, das Rauchen unterlassen, Zahnstein entfernt, cariöse Zähne extrahirt, schlechte Brüste und Saugflaschen, Gummistöpsel etc. durch bessere neue ersetzt werden.

Die Diät beschränke sich in acuten Fällen auf flüssige oder ganz weiche Substanzen, Milch, Eier, Bouillon, die bei der ausserordentlichen Empfindlichkeit der Mundhöhle stets lau oder kalt zu geniessen sind. Säuerliche oder stark zuckerhaltige Fruchtsäfte zum

Getränke beizusetzen verbiete man; am besten eignet sich reines frisches Brunnenwasser oder Eis; die so sehr beliebten künstlichen kohlensäurehaltigen Mineralwässer verursachen sehr oft ein prickelndes und brennendes Gefühl.

Die Indicatio morbi erheischt die locale Behandlung der erkrankten Schleimhaut. Am einfachsten und schonendsten sind bei diffuser Erkrankung die medicamentösen Mundwässer. In der Wahl der Stoffe sei man ebenso vorsichtig wie in der Concentration.

Am meisten empfiehlt sich das Kali chloricum in 1—2% Lösung, ferner das Natr. biborac. (2—3%). Borsäure in 1—4% Lösung ohne Zusatz von Honig oder Syrup. Auch die Adstringentia, namentlich das Tannin (5 : 500 mit 20 Glycerin), Zinc. sulfur, Alaun in schwacher Concentration sind vortheilhaft. Bei circumscripter Erkrankung, wie z. B. bei Gingivitis mit Lockerung des Zahnfleisches, mache man Einpinselungen mit Tannoglycerin (1 : 10) oder mit Tinct. Catechu, Tinct. gallar., Tinct. Ratanh.; die letzteren können auch mit Tinct. Myrrh. vermischt und mit Wasser verdünnt (1 Kaffeelöffel auf 200 Gramm) als Mundwässer gebraucht werden. Kindern, welche noch nicht spülen können, muss nach jeder Nahrungsaufnahme die Mundhöhle vorsichtig mit kaltem Wasser gereinigt und mit den erwähnten Medicamenten, besonders mit Natr. biborac. 1 : 10 oder mit 2—4% Borsäurelösung mittelst eines reinen Leinenlappens ausgewischt oder mit einem feinen Haarpinsel ausgepinselt werden.

Bei chronischer Stomatitis empfiehlt sich der fortgesetzte Gebrauch schwacher Alkalien oder alkalischer Quellen als Mundwasser oder innerlich, ferner Pinselungen mit Arg. nitr., Tannin, Tinct. Ratanh., das Kauen von Rhabarberstücken, gegen die Gingivitis der Schwangern Bepinselungen mit einer Cocain-Tanninlösung oder von gleichen Theilen Spirit. Cochlear. und Chloralhydrat.

Bei der chronischen Form der Stomatitis sicca empfehlen sich ausser alkalischen Mundwässern ganz besonders Lösungen von Jodkalijodglycerin zum Pinseln.

Leukoplakia oris.

Die Leukoplakia oris, auch Leukoma, Psoriasis, Ichthyosis, Keratosis oder Tylosis oris, sowie chronische superficielle Glossitis, Raucherplaques genannt, wird vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus am besten zu den chronischen Entzündungsprocessen gerechnet.

Man versteht unter Leukoplakie eine chronisch verlaufende Mundaffection, die sich durch das Auftreten theils circumscripter theils diffuser weisser Flecken kennzeichnet. An diesen Stellen sind das Pflasterepithel stets mehr oder weniger gewuchert und verdickt, die Submucosa mit lymphoiden Zellen durchsetzt, die Gefässe vermehrt, erweitert und von kleinzelliger Wucherung umgeben. Nach längerem

Bestande tritt in den obersten Epithelschichten Verhornung ein, oft mit starker Wucherung der Papillen. In den unteren Epithellagen zeigt sich nach Schuchardt deutliche Riffelung der Zellen und eine Art Kappenbildung der Zellkerne; auch findet sich unmittelbar unter den verhornten Epithelien eine eigenthümliche Substanz, das Eleidin, das mit der Verhornung in engem Zusammenhange steht.

Die Leukoplakie befällt mit Vorliebe die Schleimhaut der Lippen, besonders die der Unterlippe, der Wangen, die Gegend der Mundwinkel, die obere und seitliche Fläche der Zunge; nur ganz ausnahmsweise greift sie auf die untere Zungenfläche über. Ob sich die Affection in der That aus circumscripten rothen Flecken entwickelt, welche allmälig eine weisse Farbe annehmen, ist nicht sichergestellt. Nur so viel ist sicher, dass sich das Epithel allmählich trübt, dass die Schleimhaut milchig, weisslich wird, mit einem Stich in's Bläuliche, als ob man mit einem Lapisstifte touchirt hätte. Die Flecken sind im Beginne meist klein, stecknadelkopf- bis erbsengross, vergrössern sich aber allmählich und bilden durch Confluenz längliche und unregelmässige Flächen. Sie heben sich theils scharf von der gesunden Schleimhaut ab, theils verlieren sie sich allmählich in dieselbe, zuweilen erscheint die Schleimhaut an den Uebergangsstellen geröthet; ein eigenthümlich marmorirtes Aussehen erhält sie dann, wenn zwischen den einzelnen Flecken gesunde Schleimhaut liegt, oder wenn in der Mitte grösserer zusammenhängender Flecken epitheliense purpurrothe Stellen sich befinden. Die Flecken sind im Anfangsstadium meist glatt und geschmeidig, eben, von geringer Consistenz, kaum oder wenig über die übrige Schleimhaut erhaben und zeigen oft eine felder- oder mosaikartige Eintheilung. Die Oberfläche der Zunge erscheint meist sehr arm an Papillen und deshalb glatt. In diesem Zustande können die Flecken jahrelang verharren oder auch nach Abstossung der Epithellage verschwinden, um wiederzukehren oder um definitiv auszubleiben. Acute Naschschübe sind nicht selten und erzeugen bei Desquamation der Epithelien heftige Schmerzen.

Je länger die Affection dauert, um so auffallender wird das Aussehen der Flecken. Allmählich verlieren sie ihre bläulichweisse Farbe, werden matt silberweiss oder gelblichweiss, nehmen an Dicke zu und bilden theils unebene, rauhe Flächen, theils bei stärkerer Entwicklung der Papillen warzige, stachelige, panzerartige, knorpelharte Prominenzen, die meist noch ihre felderartige Eintheilung bewahren. Häufig finden sich jetzt in den Flecken Rhagaden und eiternde Fissuren, namentlich an den Lippen und der Zunge, also an Theilen, welche in Folge ihrer Muskulatur verschiedenen Bewegungen ausgesetzt sind.

Nach der Heilung bleiben Narben mit centraler Vertiefung und peripherer Erhebung zurück; eine Umwandlung der Flecken in Ulcerationen ist jedoch dem Bilde der Leukoplakie völlig fremd; dagegen finden sich papillomatöse, hahnenkammartige Wucherungen an den Rändern der Flecken und geschwürige Einrisse nicht selten vor. Aehnliche Flecken hat man auch in der Vulva beobachtet, auch

sollen in einzelnen Fällen auf der Haut Eruptionen von Psoriasis und Lichen planus sich vorgefunden haben.

Die subjectiven Erscheinungen sind bei den einzelnen Kranken sehr verschieden. Während bei der Mehrzahl derselben in den ersten Stadien der Krankheit fast alle Beschwerden fehlen, so dass die Affection oft nur zufällig entdeckt wird, klagt ein Theil schon ziemlich früh über lästiges Brennen im Munde, grosse Empfindlichkeit beim Sprechen, Essen, Trinken und Rauchen, namentlich bei dem Genusse scharfer, gesalzener Speisen und Alcoholica; oft treten die Beschwerden nur zeitweise, besonders bei Nachschüben oder Epithelialverlusten auf, um für Wochen und Monate zu verschwinden. In den späteren Stadien, wenn bereits beträchtliche Verdickung und Verhornung des Epithels eingetreten ist, können zwar gleichfalls die Beschwerden sehr geringfügig sein, doch klagen die Kranken meist über Steifigkeit und Schwerbeweglichkeit der Zunge und der Lippen beim Kauen und Sprechen. Sehr schmerzhaft ist aber die Affection dann, wenn sich das Epithel in grösserer Ausdehnung abstösst oder Rhagaden und ulcerirende Fissuren, voluminöse Excrescenzen oder Carcinom sich gebildet haben; öfters kommt es dabei zu Blutungen; Alteration des Geschmackes und Salivation werden nur bei sehr diffuser Erkrankung beobachtet.

Die Aetiologie ist zum Theil noch recht dunkel. Sicher ist, dass jede länger andauernde Reizung der Mundhöhle, mag sie durch starkes Tabakrauchen oder -Kauen, Alcoholica, reizende Kost, Mercurialcuren, Einathmen von Russ und Rauch, scharfe Zahnkanten etc. unterhalten werden, die Krankheit hervorrufen kann.

Auch Anämie, Diabetes, sowie Störungen der Verdauung werden als Ursachen angegeben. Jedenfalls gehört dazu aber, wie Butlin mit Recht betont, noch eine gewisse Prädisposition, d. h. abnorme Zartheit und Widerstandslosigkeit der Mundschleimhaut. Dass die Leukoplakie ein Product der Syphilis sei und nichts vorstelle als permanent gewordene Schleimhautplaques, ist unrichtig; doch muss man zugeben, dass Syphilitische insoferne zu Leukoplakie disponiren, als durch wiederholte und länger dauernde Quecksilbercuren eine Reizung der Mundschleimhaut erzeugt wird, welche namentlich dann höhere Grade erreicht, wenn noch eine oder mehrere der obengenannten Schädlichkeiten, namentlich Missbrauch des Tabaks dazukommen. Verf. rechnet die Epithelialtrübungen nach Quecksilbergebrauch ebenfalls zur Leukoplakie; wenn dieselben sich wieder zurückbilden und selten jenen hohen Grad der Verhornung erreichen wie die anderen Formen, so liegt das darin, dass die sie veranlassende Schädlichkeit, das Quecksilber, gerne gemieden wird, wenn es nicht mehr nöthig ist, während das Rauchen, Trinken und Essen das ganze Leben lang mit ungeschwächter Leidenschaft fortgesetzt werden. (Vergleiche auch die Capitel Stomatitis mercurialis und Pharynxhydrargyrose.)

Die Diagnose ist bei genauer Beobachtung der objectiven Erscheinungen leicht. Am häufigsten kommen Verwechselungen mit syphilitischen Papeln vor. Für Leukoplakie charakteristisch ist die

Persistenz der Flecken; sie verharren monatelang an einem und demselben Ort, während die syphilitischen Papeln sowie die gutartigen Plaques eine viel kürzere Lebensdauer besitzen, rasch grösser werden oder heilen. Während die leukoplakischen Flecke sich niemals vollständig in Geschwüre verwandeln, sondern nur Einrisse zeigen, wandeln sich die syphil. Plaques schon nach kurzer Zeit in oberflächliche Ulcerationen um; während sich die leukoplakischen Producte mit der Zeit immer härter und resistenter, zum Schlusse warzenartig und knorpelig anfühlen, erscheint die Oberfläche der syphil. Plaques gelockert, wenig cohärent und weich; syphilitische Plaques heilen unter allgemeiner und localer Behandlung ziemlich rasch und ohne Narben, während die Leukoplakie von Mercur und Jod nicht beeinflusst wird und tiefe central eingezogene Narben hinterlässt. Während endlich die Leukoplakie so gut wie nie die untere Zungenfläche, den Mundboden und den Rachen befällt, kommt die syphil. Papel an den genannten Stellen äusserst häufig vor.

Ausser mit Syphilis ist ferner noch eine Verwechselung mit Eruptionen von Lichen ruber planus möglich. Bei demselben finden sich zuweilen ebenfalls kleinere und grössere, isolirte oder zusammenhängende weisse Flecken auf den Lippen, den Wangen, der Zunge, dem Zahnfleisch und dem weichen Gaumen, welche den leukoplakischen vollkommen ähnlich sehen. Nach Touton schützt nur die Gruppirung der Flecken und netzförmigen Streifen, sowie ihre Entstehung aus deutlichen Knötchen, und die gleichzeitige oder bald nachfolgende Mitbetheiligung der äusseren Haut vor Verwechselung; auch erweist sich der innerliche Gebrauch von Arsen sowie die locale Behandlung mit Sublimat bei Lichen sehr, bei Leukoplakie gar nicht wirksam.

Der Verlauf der Leukoplakie ist ein sehr chronischer; sie kann sich auf einige Monate beschränken, aber auch 10, 20, 30 Jahre, ja bis zum Lebensende dauern; öfters tritt Stillstand ein, doch sind Recidiven häufiger.

Die Prognose ist mit Ausnahme der durch Mercurialien erzeugten Form in doppelter Hinsicht zweifelhaft; wenn auch die Leukoplakie meist ohne besondere Beschwerden verläuft und zuweilen spontan oder durch Kunsthilfe heilt, so gehören doch dauernde Heilungen zu den Ausnahmen. Die Prognose wird aber auch deshalb dubiös, weil die Affection in ganz auffallender Weise zu Carnicombildung an Lippen, Wange und Zunge disponirt. Nach Nedopil sind es nicht immer die hochgradigsten Fälle, bei denen eine solche Umwandlung stattfindet; nach Schuchardt gibt jeder chronische Reizzustand, mag er die äussere Haut oder eine Schleimhaut treffen, durch gesteigerte Vascularisation und Durchtritt von gelösten und ungelösten Blutbestandtheilen zu Krebsbildung Anlass. Das Carnicom entwickelt sich entweder diffus unter oder neben den verhornten Schleimhautpartien als flaches Infiltrat oder als Knoten, oder die Ränder und der Grund der Einrisse induriren sich, zerfallen und bilden Krebsgeschwüre; Lymphdrüsenschwellung tritt gewöhnlich schon sehr frühe auf. Der Verlauf solcher Plattenepithelcarcinome ist ebenso

ungünstig wie jener der andern, doch kann durch frühzeitige chirurgische Eingriffe Radicalheilung erzielt werden, obwohl Recidiven auch hier häufig sind. Dass die Umwandlung in Carcinom das nothwendige oder regelmässige Endstadium der Leukoplakie sei, kann jedoch durchaus nicht behauptet werden.

Bei der Behandlung hat man zuerst die Ursache zu berücksichtigen; darnach muss das unsinnige Rauchen unterlassen, der Gebrauch des Quecksilbers ausgesetzt, sowie jede Reizung der Mundhöhle vermieden werden. Die meisten Kranken machen selbst die Beobachtung, dass durch Aussetzen des Rauchens ihr Uebel sich bessert, durch Wiederaufnahme desselben sich verschlimmert. Dyspeptische Beschwerden, Anämie etc. müssen mit den entsprechenden Mitteln behoben werden. Eine antisyphilitische Behandlung ist nicht nur völlig unnütz, sondern sogar schädlich. Wenn wir auch kein Mittel besitzen, um die Bildung neuer Plaques zu verhindern oder die vorhandenen sicher und dauernd zu entfernen, so erweist sich doch die locale Behandlung zuweilen als vortheilhaft. Sie bezweckt vor Allem die Lockerung und Entfernung der verdickten Epithelschichten, was namentlich in den milderen Fällen durch alkalische Mundwässer, Natr. bicarb. 10·0 : 300·0 oder die alkalisch-muriatischen Quellen von Karlsbad, Ems etc. erreicht wird. Aetzungen mit Lapis in Substanz, Aetzkali, Chromsäure oder Mineralsäuren verschlimmern fast stets das Uebel; Joseph empfiehlt, wie schon früher Schiff, Abreibung der Flecken mit einem in concentrirte (20—80%) Milchsäurelösung getauchten Wattebausche, Beregszászy Bepinselungen mit Salicylsäure 1·0, Spir. vini rectif. 5·0, Glycerini 10·0. Einige rühmen Bepinselungen und Mundwässer von Sublimat oder 1% Chromsäure, wieder Andere Jodoform äusserlich und innerlich. Bei schmerzhafter Schrundenbildung ist die Application einer 10—20% Cocainlösung angezeigt; zur rascheren Ueberhäutung der Schrunden und ulcerirten Einrisse empfiehlt Schwimmer Bepinselungen mit 5% Papayotinlösung. Entfernung der Flecken mit scharfem Löffel, Excision, Thermocauter oder Galvanokaustik ist nur bei circumscripter Erkrankung oder bei Anwesenheit carcinomatöser oder sonstiger verdächtiger Producte angezeigt; krebsig indurirte Geschwüre oder Knoten müssen baldmöglichst bis tief in das gesunde Gewebe hinein excidirt werden.

Stomatitis phlegmonosa und parenchymatosa.

Seltener als die katarrhalische ist die phlegmonöse Entzündung der Mundhöhle.

Unter den Ursachen sind Verletzungen, besonders durch Fremdkörper, wohl die häufigsten; ferner Verätzungen und Verschorfungen in Folge des Genusses caustischer Alkalien und Säuren. Auch traumatische und andere Geschwüre, besonders diphtherische, syphi-

litische und tuberculöse, können zu circumscripter oder diffuser Phlegmone Anlass geben. Manchmal pflanzt sich das Gesichtserysipel auf die Mundschleimhaut fort und erzeugt ausser Phlegmone noch Blasenbildung; wahrscheinlich sind in allen Fällen pyogene Mikroorganismen die specielle Ursache.

Die diffuse phlegmonöse Stomatitis tritt theils als selbstständige Erkrankung auf, theils als secundäre bei schweren fieberhaften Processen, so besonders bei Typhus, Scharlach, aber auch in Begleitung von Kieferperiostitis. Sie hat besonders häufig ihren Sitz im submucösen Bindegewebe der Lippen und Wangen. Als erstes Symptom lässt sich neben hohem Fieber Schmerz beim Sprechen und Essen, vermehrte Salivation und eine brettartige Härte der befallenen Theile constatiren. Im weiteren Verlaufe können sich die Erscheinungen zurückbilden, oder es entstehen an zahlreichen Stellen kleinere und grössere Abscesse oder ausgebreitete Eiterinfiltrate, welche sich gegen die Mundhöhle zu öffnen und nach Zerstörung der Muskeln und Thrombosirung der Gefässe zu Gangrän und Sepsis führen können.

Relativ häufig wird die Zunge von phlegmonösen und parenchymatösen Entzündungen befallen. (Glossitis phlegmonosa seu suppurativa.)

In acuter Weise schwillt die Zunge an durch Verletzungen, so besonders durch Einspiessen von Fremdkörpern oder durch Fliegen-, Wespen-, Bienenstiche, durch Verbrennungen oder Infection mit septischen Stoffen, Milzbrand, Typhus, angeblich auch durch Erkältungen und sonstige nicht näher bekannte Ursachen. Da die Lymphgefässe der Zunge mit jenen des Rachens in Verbindung stehen, so geben zuweilen auch acute, namentlich suppurative, diphtheritische oder nekrotisirende Anginen zu Phlegmone oder Abscessbildung der Zunge Anlass. Verfasser hat selbst zwei derartige Fälle nach phlegmonöser Tonsillitis beobachtet. Zuweilen wird nur eine Hälfte der Zunge befallen (Hemiglossitis), weshalb die meisten Beobachter diese Affection auf nervösem Wege entstehen lassen. (Siehe: Hemiglossitis herpetica im Capitel Stomatitis exsudativa.)

Die Schwellung ist bedingt theils durch Oedem theils durch entzündliche Zellinfiltration des Parenchyms, welche resorbirt wird oder zur Eiterung gelangt. Zuweilen beschränkt sich die Phlegmone auf die Follikel der Zungenbasis, die in ähnlicher Weise vereitern, wie jene der Tonsillen (Glossitis follicularis).

Die Erscheinungen der acuten phlegmonösen Glossitis bestehen in kolossaler rapid zunehmender Vergrösserung einer oder beider Hälften der Zunge, die meist schon nach wenigen Stunden in der Mundhöhle keinen Platz mehr findet und zwischen den Lippen herausgestreckt oder gegen die hintere Rachenwand und den Kehlkopfeingang angedrückt wird, so dass hochgradigste Athemnoth eintreten kann. Fieber, beträchtliche bis zur Unmöglichkeit jeglicher Nahrungsaufnahme sich steigernde Schmerzen, Schluckbeschwerden, profuse Salivation, Foetor ex ore, Schlaflosigkeit, Prostration, Unverständlichkeit der Sprache sind die weiteren Begleiter dieser qualvollen

Affection. In den weniger acut verlaufenden Fällen kann das Fieber fehlen; ist der Zungengrund ergriffen, so ist der hintere untere Theil der Zunge beträchtlich vergrössert, die Sprache klosig, das Schlucken beträchtlich erschwert, ebenso das Hervorstrecken der Zunge; nicht selten ist in Folge Mitbetheiligung des Kehldeckels durch Oedem Athemnoth vorhanden; mit dem palpirenden Finger lässt sich sowohl von der Mundhöhle aus die vermehrte Resistenz und Schwellung der Zungensubstanz, als von aussen die brettartige Härte des Mundbodens sowie die Schwellung der Submaxillaris und Sublingualis nachweisen. Bei mehr circumscriptem Auftreten bilden sich harte Infiltrate, die nach längerem oder kürzerem Bestande verschwinden, oder zu bleibender Hypertrophie führen, oder sich in Abscesse umwandeln. Chronische Abscesse, die am häufigsten am Grunde oder an der Spitze der Zunge sowie an den Rändern vorkommen, können schmerzlos verlaufen und für Neubildungen gehalten werden.

Die Behandlung der acuten phlegmonösen Stomatitis und Glossitis muss eine energisch antiphlogistische sein. Eisumschläge, Auflegen von Eisstücken auf die infiltrirten Stellen und Zunge, Ausspülen mit Eiswasser, Bepinselungen mit verdünnter Jodtinctur, besonders aber mehrere der Länge der Infiltrate resp. des Zungenrückens nach vorzunehmende tiefe Scarificationen mit Blutenlassen der Schnittwunden, Ansetzen von Blutegeln in die Regio submaxillaris werden meist Abschwellung zur Folge haben. Bei Hemiglossitis sind Scarificationen meist unnöthig. Gelingt es nicht, die Athemnoth zu beheben, dann ist die Tracheotomie angezeigt. Wenn auch die innerliche Application von Medicamenten bei hohem Fieber oder pyämischen Erscheinungen meist recht schwierig ist, so dürfen doch die Antipyretica, eventuell per Clysma, nicht unversucht bleiben, ebenso wie Ableitungen auf den Darmcanal. Zeigen sich Erscheinungen von Abscedirung, dann sind warme Mundwässer zu verordnen und ist bei eintretender Fluctuation die Eröffnung mit dem Messer oder der Aspirationsnadel vorzunehmen; nachher empfehlen sich desinficirende Mundwässer. In der Tiefe der Zungenwurzel verborgene Abscesse können theils von der Mundhöhle aus durch einen in der Mitte der Zunge vor der Epiglottis zu machenden Einstich mit dem Lanzenmesser eröffnet werden, theils ist ihnen nur von aussen durch Eröffnung der Regio suprahyoidea und Durchtrennung des M. subcutaneus colli und der Mylohyoidei beizukommen; am ungefährlichsten ist das Vorschieben einer Kornzange durch die infiltrirten Gewebe. In den langsamer verlaufenden Fällen ist die exspectative Methode die beste; man suche durch häufige warme Inhalationen oder Spülungen das Infiltrat zu zertheilen, eventuell zu erweichen; nicht selten entleert sich dann der gebildete Eiter von selbst. Dass bei einer so schmerzhaften und die Nahrungsaufnahme so erschwerenden Affection nur flüssige, breiige Nahrung gereicht werden darf, ist selbstverständlich.

Entzündung des die Zunge umgebenden Zellgewebes, Periglossitis sublingualis, ist sehr selten und wurde einmal von Henoch beobachtet.

Die Schleimhaut des Mundbodens erschien hochgradig ödematös, teigig, das Sprechen und Schlucken war sehr schmerzhaft, Fieber und profuse Salivation vorhanden.

Die Therapie besteht anfangs in Eisumschlägen, Auflegen von Eisstücken unter die Zunge, später in der Application warmer Mundwässer und Bepinselungen mit verdünnter Jodtinctur.

Als chronische parenchymatöse Entzündung ist die Makroglossie, Prolapsus linguae, aufzufassen. Sie ist theils angeboren, theils erworben und besteht in einer Hypertrophie sämmtlicher die Zunge zusammensetzender Gewebe, so namentlich des Muskel-, Fett- und Bindegewebes; in andern Fällen tritt mehr die Erweiterung der Lymphgefässe in Form cystenartiger Hohlräume hervor. Die Makroglossie ist meist doppelseitig, kann aber auch halbseitig vorkommen. Für die acquirirte Makroglossie müssen häufige Entzündungen, Hemiglossitis, Stomatitis mercurialis, sowie Verletzungen der Zunge, Bisse, wie sie bei Epileptikern sehr gewöhnlich sind, verantwortlich gemacht werden.

Hypertrophie der Zunge, der Lippen und des weichen Gaumens hat man auch als Begleiterscheinung des Cretinismus, des Myxödems und der Cachexia strumipriva beobachtet. Das hervorstechendste Symptom bildet die oft ungeheure Vergrösserung der Zunge. Sie wird zwischen den Zähnen vorgestreckt und ist meist durch Vertrocknung an der Oberfläche mit Einrissen und Schrunden bedeckt. Die Alveolen der Zähne werden durch den beständigen Druck des hypertrophischen Organs nach aussen in eine mehr horizontale Lage gedrängt, das Zahnfleisch lockert sich, die Zähne fallen aus. Immer besteht reichliche Salivation, Schmerzen beim Essen und Sprechen und undeutliche lallende Sprache, bei Myxödem und Cachexia strumipriva ausserdem noch Nachlass der geistigen Fähigkeiten, cretinartiges Exterieur und Pachydermie.

Bei circumscripter chronischer parenchymatöser Glossitis, die dem Reize scharfer Zahnkanten, Cigarrenspitzen etc. ihre Entstehung verdankt, bilden sich kleinere oder grössere knotige Verdickungen, die weniger Schmerz als ein Gefühl von Schwere und Belästigung beim Sprechen verursachen und die durch fortwährende Reibung an den Zahnrändern oder andere Schädlichkeiten ulceriren und sich in Carcinom umwandeln können.

Die Behandlung der Makroglossie besteht in keilförmiger Excision in horizontaler und verticaler Richtung oder in galvanokaustischer Amputation oder in der multiplen Punction mittelst Fistelbrenner (Ignipunctur), wodurch zahlreiche sich contrahirende Narben und damit Verkleinerung des Organs erzeugt werden. Zur Verhütung allzustarker Reaction applicirt man nachher Eis. Compressivverbände haben meist keine Wirkung, da die Fixirung derselben zu grosse Schwierigkeiten bietet. Bei circumscripter Knotenbildung führt bisweilen methodische Bepinselung mit Jod oder Lapis zum Ziele.

Nicht selten ist die Zunge in besonders hochgradiger Weise nach verschiedenen Richtungen hin tief eingeschnitten (Glossitis

dissecans). Entstehen in diesen Furchen Schrunden und Einrisse, dann wird die Affection sehr schmerzhaft, namentlich bei der Nahrungsaufnahme, beim Rauchen und Sprechen. Ueber die Ursachen dieser Furchenbildung ist nichts Sicheres bekannt; die schmerzhaften Stellen können durch Ueberstreichen mit Boraxglycerin oder Lapis oder Papayotin in der Regel bald zur Heilung gebracht werden; palliativ empfiehlt sich das Cocain.

Auf der Grenze zwischen Entzündung und Neubildung steht die Glossitis syphilitica indurativa.

In der Schleimhaut, dem interstitiellen Bindegewebe und den Muskeln findet eine reichliche Proliferation von Zellen und Wucherung von Bindegewebe statt, wodurch die Zunge anschwillt und theils in toto theils an einzelnen Stellen grösser wird. Das Organ fühlt sich hart an, bei der circumscripten Form knotig, ist aber schmerzlos. Nach längerem Bestande schrumpft das Bindegewebe, wodurch die Zunge an der Oberfläche höckerig, gefurcht und eingezogen erscheint und atrophirt. Bei circumscriptem Auftreten der Bindegewebsneubildung entstehen durch die Einziehung nur einige wenige seichte Furchen an der Oberfläche der Zunge; localisirte sich der Process in der Tiefe, so werden die Einziehungen sehr tief und unter Umständen die ganze Dicke der Zunge betreffen. Nach diffuser Erkrankung entstehen zahlreiche Furchen, welche eine Lappung der Zunge zur Folge haben.

Die Behandlung besteht in der Verabreichung von Jod oder Quecksilber.

Zu den chronischen parenchymatösen Entzündungen der Mundhöhle muss auch die von Volkmann beschriebene Myxadenitis labialis oder Cheilitis glandularis apostematosa gerechnet werden. Sie manifestirt sich durch beträchtliche Schwellung der Unterlippe, deren Schleimdrüsen vergrössert erscheinen und zu kleinen Abscessen Veranlassung geben.

Die Schwellung der Lippe entwickelt sich allmählich ohne besondere Schmerzen; dieselbe wird hart und oft so voluminös, dass ihre Beweglichkeit erschwert, ja ganz aufgehoben wird. Gleichzeitig erscheinen die Schleimdrüsen in hirsekorngrosse, höckerige Geschwülstchen umgewandelt, ihr Ausführungsgang stark dilatirt, auf Druck entleert sich schleimig-eitriges Secret. Meistens bilden sich furunkulöse Entzündungen, die bald in die Mundhöhle bald nach aussen durchbrechen und oft monatelang noch Secret secerniren. Ein directer Zusammenhang mit Syphilis ist nicht nachweisbar.

Die Behandlung besteht nach Volkmann in der innerlichen Verabreichung von Jodkali, reinigenden Mundwässern, besonders von Kali chloricum, leichten Cauterisationen der Lippe, frühzeitiger Spaltung von Abscessen.

Nicht selten befinden sich die Papillen der Zunge in einem chronischen mit Hyperplasie verbundenen Entzündungszustande.

Die Papillae filiformes erscheinen verdickt, kolbig geschwellt oder durch Epithelwucherung in kleine, flache, harte, mit dem pal-

pirenden Finger fühlbare Excrescenzen umgewandelt. In andern Fällen findet die Hyperplasie in der Längsrichtung statt, die Papillae filif. erscheinen ungewöhnlich gross und gleichen Haaren, welche sich in die Höhe richten und glatt auf die Oberfläche der Zunge niederlegen lassen. Die Farbe dieser „haarförmigen Bildungen", wie sie W. Roth nennt, ist bald hell, resp. weiss, bald dunkel und schwarz. In letzterem Falle bezeichnet man die Erkrankung auch als „schwarze Zunge", Lingua nigra, oder Nigrities linguae.

Das Wesen der schwarzen Zunge besteht in einer excessiven Vergrösserung der Papillae filiformes, welche vollständig verhornen und durch Pigmentirung eine gelbe bis schwarzbraune Farbe annehmen. Man hielt früher — wie auch Verfasser in der ersten Auflage dieses Buches — die Affection für eine Mykose, da einzelne Beobachter, wie Dessois und Sell, einen eigenthümlichen Pilz (Glossophyton) zwischen den hypertrophischen Zungenpapillen in Form von eiförmigen stark lichtbrechenden Körperchen gefunden haben wollten. Die Schwarzfärbung soll den Epithelien durch Imbibition von den Pilzsporen mitgetheilt werden. W. Roth, der seine Fälle nicht mit der schwarzen Zunge identificirt, trotzdem in einem derselben die Papillen pigmentirt waren, lässt die haarförmigen Bildungen durch die gewöhnlichen Pilze der Mundhöhle entstehen (Keratomykose), welche massenhaft zwischen den Epithelien eingelagert seien. Verfasser kann sich jedoch dieser Ansicht weder in Bezug auf die haarförmigen Bildungen noch auf die schwarze Zunge anschliessen, da die Anwesenheit von grossen Mengen Micrococcen in und zwischen den Epithelien der normalen Papillen die Regel ist, und die enorm vergrösserten und verhornten Papillen in zwei vom Verfasser genau beobachteten Fällen von schwarzer Zunge theils ganz frei, theils sehr spärlich von Micrococcen besetzt gefunden wurden. Die harten verhornten Epithelien dürften für die die Feuchtigkeit liebenden Pilze der Mundhöhle eher einen ungünstigen Nährboden abgeben; wahrscheinlich ist es ein chemisches aus Zersetzungsvorgängen des Zungenbelags hervorgegangenes Agens oder das Rauchen, welches die Papillen zur Wucherung und Pigmentirung veranlasst.

Subjective Beschwerden macht die Affection in der Regel keine oder nur sehr geringe, weshalb sie meist zufällig entdeckt wird. Die Kranken von Roth klagten über Stumpf- und Pelzigsein der Zunge mit Verminderung des Tastgefühls und des Geschmackes, sowie über üblen Geruch aus dem Munde und morgendliches Würgen und Kitzeln im Halse.

Objectiv findet sich auf dem Rücken der zuweilen ungewöhnlich dick belegten Zunge unmittelbar vor den wallartigen Papillen beginnend und sich einseitig oder doppelseitig gegen die Zungenspitze fortsetzend, eine braunschwarze Verfärbung, in derem Bereich die Zungenoberfläche mit kleineren und grösseren Haaren vergleichbaren Fäden besetzt erscheint; streicht man von vorne nach hinten, so richten sich dieselben wie die Haare eines Seidenhutes in die Höhe, so dass die Oberfläche der gefärbten Stellen rauh erscheint, oder wie

Raynaud sich ausdrückt, einem vom Wind und Regen niedergeworfenen Kornfelde gleicht.

Aetiologisch beschuldigte man das Kauen und Rauchen von Tabak, sowie andere die Mundhöhle treffende Reize; wiederholt wurde die Affection bei sehr alten Leuten gefunden, doch kommt sie auch bei jüngeren Personen vor. Der eine von des Verfassers Kranken war ein in den besten Jahren stehender Künstler, welcher ungewöhnlich viel und stark rauchte; die andere Kranke, eine ältere Frau, hatte eine ausgesprochene Sclerodermie neben einem Klappenfehler und Lähmung des weichen Gaumens. In einem von Lédiard mitgetheilten Falle war Zungenkrebs vorhanden.

Die Diagnose stützt sich auf die obenerwähnten Veränderungen, welche mit Leichtigkeit gestatten, die Affection zu unterscheiden von gewöhnlichen durch Ingesta oder Medicamente bedingten Verfärbungen, oder von Pigmentirungen, wie sie zuweilen bei Morb. Addissonii oder Xanthelasma vorkommen.

Eine Behandlung ist, wenn die Affection keine Beschwerden macht, oder nur die Angst die Kranken zum Arzte treibt, kaum nöthig; allenfalls empfehlen sich erweichende alkalische Mundwässer oder die mechanische Entfernung der hypertrophischen Papillen. Roth machte von Bepinselungen mit 10% alkoholischer Salicylsäure und 10% Sublimatlösung Gebrauch.

Viel häufiger als die Papillae filiformes finden sich die Balgdrüsen an der Zungenwurzel in einem entzündlich hypertrophischen Zustande. Aetiologisch kommen häufige acute oder langanhaltende Entzündungen und Reizzustände der Mundhöhle, so namentlich solche im Bereiche des früher erwähnten lymphatischen Mundrachenringes, nach Swain zuweilen auch Erkältungen sowie tuberculöse Dyskrasie in Betracht.

Die Störungen, welche die Affection bei dem bevorzugten weiblichen Geschlecht oder bei Nervösen hervorruft, bestehen hauptsächlich in dem spontan oder beim Essen und Sprechen auftretenden Gefühle der Anwesenheit eines Fremdkörpers im Halse, in Drücken, schmerzhaftem Brennen, sowie leichter Ermüdung der Stimme bei anhaltendem lauten Sprechen oder Singen, vermehrtem Bedürfnisse zum Schlucken; man hat auch diese Beschwerden mit den bei Globus hystericus geklagten identificirt und behauptet, sie würden hervorgerufen durch den Druck, welchen die geschwellten Zungenbalgdrüsen auf die Epiglottis ausübten. Verfasser kann diese Ansicht in dieser Allgemeinheit nicht theilen, will aber nicht leugnen, dass bei einzelnen mit Globus Behafteten die hypertrophischen Zungenbalgdrüsen in der That der Sitz und die Ursache der abnormen Sensationen sind.

Die Diagnose stützt sich einestheils auf die Digitaluntersuchung, anderntheils auf den laryngoskopischen Befund, welcher eine mehr oder weniger ausgesprochene Ueberlagerung der Epiglottis und der Fossae glossoepigl. durch die vergrösserten Follikel erkennen lässt.

Die Prognose ist günstig, der Verlauf der Affection ein langwieriger.

Die Therapie besteht in fortgesetzten Bepinselungen mit Mandl'scher Jodlösung (Rp.: Jodi puri 0·1—0·3, Kali jodati 1·0 bis 2·0, Glycerini 20·0), eventuell in galvanokaustischer Zerstörung oder Aetzung mit Chromsäure, bei sehr beträchtlicher Grösse der Drüsen in Abtragen mittelst kalter oder heisser Schlinge.

Stomatitis exsudativa.

In der Mundhöhle kommen ebenso wie im Rachen und in der Nase zahlreiche Veränderungen vor, welche sich unter die bisher beschriebenen und noch zu beschreibenden Formen nicht gut einreihen lassen, die aber doch ihrer Häufigkeit wegen besprochen werden müssen. Es erschien dem Verfasser noch am ehesten zulässig, den Herpes, Pemphigus, die Variola, die Aphthen und einige andere Processe unter obigem Titel abzuhandeln, zumal auch vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus keine wesentliche Einsprache erhoben werden dürfte.

Bläschen und Blasen mit serösem Inhalte kommen hauptsächlich bei Herpes und Pemphigus, solche mit eitrigem Inhalte, Pusteln, vorzüglich bei Variola zur Beobachtung.

Herpeseruptionen sitzen mit besonderer Vorliebe auf den Lippen (Herpes labialis), dem harten Gaumen, seltener auf den Wangen und der Zunge.

Aetiologisch spielen rheumatisch-febrile Zustände die Hauptrolle, wofür das Auftreten derselben im Gefolge acuter Nasenkatarrhe, Influenza, Muskel- und Gelenkrheumatismen beweisend ist; bekannt ist auch sein häufiges Vorkommen bei gastrischen Störungen, sowie bei Pneumonie, und sein fast völliges Fehlen bei Typhus. Reize, welche die Lippen und die Mundhöhle treffen, besonders scharfe, gesalzene und gepfefferte Speisen, stark gebeizte Cigarren können unzweifelhaft den Ausbruch desselben provociren.

Mit besonderer Vorliebe sitzen die Herpesbläschen an der Uebergangsstelle der Haut in das Lippenroth. Bald auf der Oberlippe, bald auf der Unterlippe, bald auf beiden zugleich schiessen in kürzester Zeit mehrere meist in Gruppen beisammenstehende stecknadelkopf- bis erbsengrosse Bläschen auf, deren anfangs heller und durchsichtiger Inhalt sich nach einigen Tagen trübt und den Eruptionen ein grauweisses oder graubläuliches Colorit verleiht; manchmal wird der Inhalt derselben eitrig. Die Bläschen vertrocknen nun in den nächsten Tagen entweder von selbst oder ihr Inhalt entleert sich durch zufällige Verletzungen, besonders bei der Reinigung der Nase. Um die Bläschen herum findet sich meist ein rother Ring und entzündliche Infiltration des Gewebes.

Entwickelt sich der Herpes auf der Schleimhaut selbst, dann kommt man selten früh genug dazu, die charakteristischen Bläschen

zu sehen, da die emporgehobene Epithelialdecke in kürzester Zeit macerirt und abgestossen wird; man erblickt meist kleine, rundliche, oberflächliche, vereinzelt oder in Gruppen stehende Excoriationen mit weissem oder gelblichem Grund und gerötheter und geschwellter Umgebung, an deren Rändern zuweilen noch die Reste der abgehobenen Epithelialdecke in Form eines oder mehrerer Ringe wahrzunehmen sind.

Während Herpes der Lippen meist nur ein Gefühl von Hitze und Spannung oder Stechen bei Berührung zur Folge hat, verursacht der Herpes der Schleimhaut sehr beträchtliche besonders bei der Nahrungsaufnahme sich noch steigernde Schmerzen. Besonders intensiv wird zuweilen die Zunge, und zwar halbseitig, bei Männern öfters als bei Frauen, befallen (Hemiglossitis herpetica). Nach Güterbock befinden sich die Bläscheneruptionen stets im Gebiete des N. trigeminus, seltener der Chorda, niemals ist der Hypoglossus oder Glossopharyngeus betheiligt. Die Zunge ist mit kleineren und grösseren Gruppen von Bläschen besetzt, welche bald eintrocknen, aber auch tiefgehende parenchymatöse Entzündung und Abscedirung zur Folge haben können. Meist finden sich auch am Zahnfleisch, harten und weichen Gaumen sowie auf der Haut des Gesichtes und der Nase zosterartige Bläschen. Es ist unzweifelhaft, dass die Affection einer Erkrankung des Trigeminus ihre Entstehung verdankt; ob dieselbe aber centraler oder peripherer Natur sei, ist noch nicht entschieden.

Die Affection dauert in der Regel einige Tage, doch können bei Nachschüben 1—2 Wochen bis zum Verschwinden aller Erscheinungen verstreichen.

Grössere Blasen entstehen manchmal nach Verbrühungen sowie im Gefolge des Erysipel, das sich entweder von der äussern Haut oder vom Rachen aus auf die Mundhöhle fortsetzt, ferner bei Pemphigus und durch andere noch nicht genügend bekannte Ursachen. Hieher gehört auch ein von Sidlo beschriebener höchst merkwürdiger Fall von acuter Blasen- und Emphysembildung in der Mundhöhle und am weichen Gaumen, der aller Wahrscheinlichkeit nach einer Infection mit septischen oder putriden Stoffen seine Enstehung verdankte.

Nach Kaposi kommt es im Verlaufe der Urticaria, namentlich der selteneren Riesenurticaria, auf der Schleimhaut des Mundes, Rachens und des Kehldeckels zu plötzlich entstehenden flüchtigen ödematösen Schwellungen, durch welche die Uvula enorm vergrössert wird und die Epiglottis bis zur Suffocation anschwellen kann.

Entwickelt sich Variola auf der Mundschleimhaut, dann entstehen aus den zuerst auftretenden flachen Knötchen eitergefüllte Pusteln, welche platzen und sich in Geschwüre umwandeln. Die begleitende Stomatitis ist meist sehr heftig, auch schwellen bei beträchtlicherer Anzahl der Pusteln die Lymph- und Speicheldrüsen an und haben excessive Salivation zur Folge. Auch die Varicellen können die Lippen- und Mundschleimhaut occupiren und dort zuerst Bläschen, dann rundliche den herpetischen vollständig ähnliche Defecte erzeugen.

Eine andere hieher gehörige und namentlich bei Kindern im Alter von 9 Monaten bis 3 Jahren häufige Affection sind die Aphthen (Stomatitis aphthosa).

Während man früher mit dem Worte Aphthen höchst verschiedene Dinge bezeichnete, beschränkt man jetzt den Begriff auf kleine, flache, weisse oder weissgelbe Flecken, welche einen gutartigen Verlauf nehmen und niemals mit übelriechender Secretion einhergehen.

Noch nicht einig ist man über das Wesen der Aphthen. Während einzelne Beobachter dieselben aus Bläschen, andere aus vereiternden Schleimfollikeln oder aus Zelleninfiltraten des submucösen Bindegewebes entstehen lassen, will Bohn dieselben auf croupöse Exsudate zwischen Submucosa und Epithelschicht zurückführen. Verfasser sah dieselben bei Erwachsenen — namentlich bei Herzkranken — mehrmals aus kleinen (embolischen) Schleimhauthämorrhagien hervorgehen und glaubt, dass die Aphthen sehr verschiedenen Vorgängen, vermehrter Vascularisation und Exsudation sehr geringer Mengen von Flüssigkeit ihre Entstehung verdanken und dass das weissliche Aussehen derselben weniger in einer croupösen Exsudation als in einer Veränderung der Epitheldecke, so namentlich in Maceration und oberflächlicher Nekrose seinen Grund hat.

An verschiedenen Stellen der Mundhöhle, auf Lippen, Wangen, hartem und weichem Gaumen, besonders auch auf der Zunge, bilden sich nach vorheriger stärkerer Vascularisation und Röthung, jedoch meist sehr schnell und mit deutlichen Nachschüben, stecknadelkopf- bis linsengrosse, zuweilen in grösseren Plaques und gewundenen Figuren auftretende aus einer weissen, speckigen, über das Niveau deutlich hervorragenden Masse bestehende Flecke. Der weisse Belag haftet fest auf der Unterlage, lässt sich nur mit Gewalt und unter Blutung entfernen und ist von einem schmalen, rothen Saume umgeben; später wird er durch reichliche Secretion erweicht und in Folge mechanischer Einwirkung abgehoben, doch bleibt meist eine dicke, filzige, von Epithelfetzen umgebene Masse zurück. Bohn nennt dies offene Aphthen und protestirt gegen die Bezeichnung als Geschwüre, da man unter letzteren nur die eiterige Einschmelzung von Geweben verstehe und es bei vielen kleineren und mittleren Aphthen niemals zum Abgange des Epithels komme. Confluiren mehrere benachbarte Aphthen, dann entstehen ausgebreitete landkartenartige Verfärbungen, die zu verschiedenen Irrthümern Anlass geben können.

Mag man nun die aus capillären Blutungen hervorgegangenen Veränderungen als hämorrhagische Erosionen und damit als eine eigene Species bezeichnen, Thatsache ist, dass sie sich von den Aphthen in ihrer Erscheinung und ihrem Verlaufe in Nichts unterscheiden. Die Heilung findet stets in der Weise statt, dass die aphthöse Masse mehr und mehr eingeschnürt und abgestossen wird und dass die vom Belage befreiten Stellen sich schnell überhäuten.

Ob die Aphthen, wie behauptet wird, ansteckend sind, muss zweifelhaft erscheinen. Sicher ist, dass dieselben ausser bei Kindern beim weiblichen Geschlecht, namentlich zur Zeit der Menses, Gravi-

dität und Puerperiums besonders häufig vorkommen. Manche Frauen leiden bei jeder Menstruation an diesem lästigen Uebel, auch ist der Einfluss der Dentition, der Genuss der Milch von Kühen, welche an Maul- und Klauenseuche litten, sowie gastrischer Störungen auf die Entstehung derselben nicht zu verkennen.

Die subjectiven Beschwerden der Aphthen bestehen in Schmerzen und grosser Empfindlichkeit der Mundhöhle bei Nahrungsaufnahme, beim Kauen, Sprechen und Rauchen. Säuglinge und Kinder verweigern schreiend die Nahrung und können in ihrer Ernährung Schaden leiden.

Die Differentialdiagnose der verschiedenen Bläschen und Blasen und ähnlicher Vorgänge unterliegt in der Regel keinen grossen Schwierigkeiten. Am ehesten kann Herpes mit Aphthen und umgekehrt verwechselt werden, was aber weder in diagnostischer noch therapeutischer Hinsicht ein Unglück ist. Von den syphilitischen, tuberculösen und traumatischen Ulcerationen unterscheiden sich Herpes und Aphthen durch ihren meist acuten Verlauf. Varicellen, Variola, Rotz, Maul- und Klauenseuche befallen in der Regel auch noch andere Körpertheile und manifestiren sich dadurch nur als Localisation eines Allgemeinleidens.

Die Therapie hat bei allen Formen der exsudativen Stomatitis besonders auf passende Ernährung Rücksicht zu nehmen; indifferente Stoffe, wie laue oder kühle Milch, ungesalzene Fleischbrühe und Suppe, leichter chinesischer Thee, verdienen bei der oft ausserordentlichen Empfindlichkeit der Mundhöhle den Vorzug; dass Alcoholica und Tabak auf das Strengste verboten werden müssen, ist natürlich.

Die locale Behandlung beschränke sich, da fast alle Mundwässer den Schmerz eher steigern als lindern, auf Reinigung mit lauwarmem Wasser, Camillenthee oder einem anderen schleimigen Vehikel, eventuell mit Zusatz einiger Tropfen Opiumtinctur, oder auf Ausspülung mit 1—3% Borsäurelösung; Bepinselungen mit Boraxlösung 5 : 25 oder mit Tannoglycerin 1 : 30, bei grosser Schmerzhaftigkeit mit 10% Cocainlösung können gleichfalls empfohlen werden. Bei den durch Magendarmaffectionen hervorgerufenen Aphthen empfehlen sich Bitterstoffe, unter Umständen milde Laxantia, local Bepinselungen mit Lapislösung oder mit Aether. Gegenüber den die Menses begleitenden Aphthen ist in der Regel jede Therapie machtlos, doch müssen etwaige Anomalien der Sexualorgane beseitigt und hochgradige nervöse Aufregung mit Nervinis bekämpft, chlorotische Zustände mit Eisen, China, Landaufenthalt, Brunnencuren behandelt werden.

Stomatitis ulcerosa.

Finden sich ausser Röthung und Schwellung der Schleimhaut noch Abhebungen des Epithels, oberflächliche oder tiefgehende Substanzverluste, dann spricht man von Stomatitis ulcerosa.

Wenn auch nicht jeder Substanzverlust ein Geschwür zu nennen ist, so entwickelt sich das letztere doch constant aus dem ersteren; wenn deshalb mehrere mit Abhebung der epithelialen Decke einhergehende Affectionen in dem vorhergehenden Capitel besprochen wurden, während dieselben von Anderen zu den Geschwürsprocessen gerechnet werden, so war für uns in erster Linie der pathologisch-anatomische Gesichtspunkt, resp. der Grundprocess massgebend. Deshalb werden auch der Syphilis und Tuberculose der Mundhöhle eigene Capitel gewidmet werden.

Zu der Stomatitis ulcerosa rechnet man vorerst die sogenannten specifischen Mundentzündungen, die zwar nicht immer mit Ulcerationen combinirt sind, aber doch sehr häufig mit solchen verlaufen.

Unter diesen nimmt die **Stomatitis mercurialis** in praktischer Hinsicht die erste Stelle ein.

Wird dem Organismus Quecksilber längere Zeit oder auf einmal in grösseren Dosen einverleibt, gleichgiltig, ob dasselbe durch den Magen oder durch die Haut, den Conjunctivalsack, das subcutane Zellgewebe oder durch die Lunge in Form von Quecksilberdämpfen, letztere besonders bei Chemikern, Hutmachern, Spiegelbelegern oder Barometermachern, in den Körper gelangt, so kündigt sich die Hydrargyrose zuerst durch eine unangenehme metallische Geschmacksempfindung und Trockenheit im Munde an. Die Zähne scheinen stumpf und verlängert zu sein, das Erfassen und Zerkleinern der Speisen ist schmerzhaft und hat leicht Blutungen aus dem Zahnfleische zur Folge. Bald stellt sich Speichelfluss ein, die Schmerzen steigern sich, die Zunge schwillt und wird, da sie hinter den Zähnen keinen Platz hat, zur Mundöffnung herausgestreckt.

Bei der objectiven Untersuchung erscheint die Mundschleimhaut im Ganzen oder theilweise namentlich an den letzten Backzähnen geröthet und geschwellt, in besonders hohem Grade ist das Zahnfleisch der unteren Schneidezähne gewulstet und mit Ecchymosen besetzt.

Statt die Zähne enge zu umschliessen, liegt das Zahnfleisch denselben nicht direct auf, sondern steht mehr oder weniger weit ab, wodurch die Zähne sich lockern. Die Zunge und die Schleimhaut der Wangen, des Zahnfleisches ist mit einem schmierigen, schmutzigen, grünlichen Ueberzuge bedeckt, der einen intensiven Fötor verbreitet. Wird in diesem Stadium die weitere Einwirkung des Quecksilbers nicht verhindert und die Affection nicht zur Heilung gebracht, dann überzieht sich die Schleimhaut mit einem weisslichgrauen, diphtherieähnlichen Belage, nach dessen Abstossung unregelmässige, tiefgehende, leicht blutende Geschwüre zum Vorschein kommen. Die Salivation

erreicht den höchsten Grad, die Nahrungsaufnahme wird immer schmerzhafter, zuletzt ganz unmöglich, die Zähne fallen aus, die Ulcerationen greifen mehr und mehr in die Tiefe bis auf das Periost des Kiefers und können so Periostitis, Caries und Nekrose oder auch Gangrän der Lippen und Wangen zur Folge haben. Glücklicherweise gehören bei der heutigen Syphilistherapie derartige Fälle zu den Seltenheiten.

Bei längerer Einwirkung des Quecksilbers kommt es, nachdem eine Stomatitis mercurialis vorausgegangen, zu Epitheltrübungen und Epithelverdickungen der Mundrachen-Schleimhaut, welche von den durch die Frühsyphilis gesetzten Veränderungen oft schwer zu unterscheiden sind und die bereits in dem Capitel „Leukoplakie" erwähnt wurden.

Die von Schumacher und Sommerbrodt beobachteten einzeln oder herdweise auf oder zwischen den Balgdrüsen der Zunge, den Zungenkehldeckelfalten und der hintern Rachenwand sitzenden weissen, später graugelb sich verfärbenden Auflagerungen (Pharynxhydrargyrose), die der Stomatitis mercurialis zeitlich vorausgehen, nach Aussetzen des Quecksilbers ohne Narben heilen und nur mit dem Kehlkopfspiegel diagnosticirt werden können, verdanken einer oberflächlichen Nekrose der Schleimhaut durch Arrosion des hinabfliessenden mercurhaltigen Speichels ihre Entstehung.

Die Diagnose der mercuriellen Stomatitis stützt sich auf den Nachweis der Aufnahme des Metalles und seiner Salze. So leicht dieser in der Regel auch gelingt, so schwer ist derselbe doch manchmal zu erbringen und braucht deshalb nur an eine Beobachtung Bamberger's erinnert zu werden, welchem es in einem scheinbar unerklärlichen Falle gelang, als Ursache die zur Vertilgung der Wanzen in die Bettstelle eingestrichene graue Salbe zu ermitteln. Dem Verfasser ist ferner ein Fall bekannt von einem Arzte, der einige Stunden nach dem Amalgamiren der Zinkelemente einer Batterie und ein anderesmal nach der Einreibung einer minimalen Menge von Ung. ciner. an Stomatitis erkrankte.

Dass der Eine für die kleinsten Dosen von Mercur empfänglich ist, während der Andere die stärksten Schmiercuren ohne irgendwelche Intoxication durchmacht, ist individuell und schwer zu erklären. Sicher ist aber, dass durch die Anwesenheit epithelentblösster Stellen in der Mundhöhle, namentlich durch die Reibung cariöser Zähne oder durch Wulstung der Wangenschleimhaut, Läsion des den unteren Weisheitszahn bedeckenden Zahnfleisches der Ausbruch der Mercurialstomatitis begünstigt wird, wie von Bockhart auch experimentell nachgewiesen wurde.

Die Prognose ist, solange es noch nicht zu umfangreicheren Ulcerationen gekommen ist, eine günstige, sie wird aber ungünstig resp. zweifelhaft, wenn ausgebreitete oder gar schon gangränöse Geschwüre und Zerstörungen vorhanden sind. Die chronische leukoplakische Form gibt eine günstige Prognose, da dieselbe nach Aussetzen des Quecksilbers von selbst zurückgeht.

Die Behandlung muss in erster Linie darauf gerichtet sein, den Kranken auf den eventuellen Eintritt der Affection aufmerksam zu machen und dann sofort ausserhalb des Bereiches der schädlichen Potenz zu setzen und quecksilberhaltige Medicamente und alle Gegenstände, die damit imprägnirt sein können, zu beseitigen. Dazu gehört auch das Verlassen der Wohnung oder des Zimmers, in welchem die Inunctionen bisher vorgenommen worden waren und die gründliche Reinigung der Haut durch ein warmes Vollbad.

Die örtliche Behandlung ist, solange es sich nicht um Geschwüre handelt, identisch mit der bei Stomatitis catarrh. angegebenen; ist es zur Ulceration gekommen, dann verdienen die Desinficientia den Vorzug, so die Mundwässer mit Kali chloric., Acid boric, Aq. chlori, Thymol oder Extr. lign. Campech. (20 : aq. font. aq. Salv. āā. 400·0) oder einer Campheremulsion 3 : 300. Sehr wirksam sind Bepinselungen der Geschwüre mit Acid. tannicum oder verdünnter Salz- oder Bromwasserstoffsäure oder mit Tinctur. Ratanh. 50·0 Acid carbol 0·5. Bei grosser Schmerzhaftigkeit empfehlen sich Cocainbepinselungen unmittelbar vor der Nahrungsaufnahme. Manche Autoren geben dem innerlichen Gebrauche des Kali chloric. pro die 2—5 Gramm als Prophylacticum und als Heilmittel vor allen anderen den Vorzug. Die Wirkung des Schwefels ist nicht erwiesen, dagegen sollen sich kleine Dosen von metallischem Jod in alkoholisch-glyceriniger Lösung sowie die Salpetersäure und das Atropin zuweilen als wirksam erwiesen haben. Gegen die weissen Epithelverdickungen am Zungengrund und den hyoepiglottischen Falten erwiesen sich Schumacher Bepinselungen mit verdünnter Jodtinctur sowie Kali chloricum innerlich sehr vortheilhaft.

Als eine der vielen Localisationen des Scorbuts und der damit nahe verwandten Haemophilie, Morb. Werlhofii, jener chronischen allgemeinen Ernährungsstörung, die sich hauptsächlich durch Hämorrhagien in die verschiedensten Organe und fortschreitenden Zerfall der Kräfte manifestirt, ist die **Stomatitis scorbutica** zu betrachten.

Die Krankheit beginnt, nachdem meistens rheumatische Schmerzen im Rücken, den Extremitäten und den Gelenken, sowie allgemeine Abgeschlagenheit, Druck und Beklemmung auf der Brust, Herzklopfen sowie spontane Hämorrhagien der Haut der unteren Extremitäten vorausgegangen waren, mit Empfindlichkeit der Mundhöhle sowie mit Schmerzen beim Kauen und vermehrter Speichelsecretion. Das Zahnfleisch, das an seiner Peripherie mit einem blaurothen Saume eingefasst erscheint, nimmt an Volumen zu, seine Fortsätze zwischen den Zähnen schwellen zu dicken kolbenartigen Zapfen an, wuchern über das Niveau der Zähne hinüber und sind mit grösseren oder kleineren Blutextravasaten besetzt. Allmählich bilden sich Geschwüre, an deren unregelmässigen Rändern fungöse Excrescenzen aufschiessen und deren Grund schmutzigbraun oder mit frischem Blut bedeckt erscheint. Die zerfallene Schleimhaut, die manchmal in Fetzen herunterhängt, beschlägt sich mit einem diphtheritischen Exsudate und blutet bei der leisesten Berührung. Die Secretion ist eine äusserst profuse, der mit

blutigem Schleim vermischte Speichel äusserst übelriechend, ja aashaft. Die Zähne fallen theilweise aus, theilweise haften sie nur noch sehr lose, auf den Wangen, der Zunge und den Lippen, zuweilen auch im Rachen bilden sich weitere Blutextravasate, die gleichfalls zerfallen und sich in Geschwüre umwandeln. Die Blutungen sind oft so profus, dass die Kranken in relativ kurzer Zeit anämisch und hydropisch zu Grunde gehen.

Die Diagnose der Stomat. scorb. ist mit Rücksicht auf die übrigen Störungen nicht schwer, auch ist bei keiner andern Form der Stomatitis die Schwellung der Schleimhaut so intensiv; die gleich nachher zu besprechende Stomacace ist eine rein locale Affection und charakterisirt sich hauptsächlich durch den gelben Saum des Zahnfleisches, der bei Scorbut fehlt.

Die Prognose des Mundscorbutes ist an und für sich nicht ungünstig; sie ist aber zum mindesten zweifelhaft, wenn das Leiden schon einen höheren Grad erreicht hat oder Complicationen in anderen lebenswichtigen Organen vorhanden sind; doch können auch plötzliche profuse Blutungen die vorher günstige Prognose bedenklich trüben. Bei der Behandlung des Mundscorbutes müssen die Ernährungsverhältnisse geregelt und die sanitätswidrigen Verhältnisse der Kasernen, Gefängnisse oder Schiffe beseitigt werden. Da mangelhafte Ernährung in qualitativer und quantitativer Hinsicht, so besonders der Ausfall des Fettes, ferner Erschwerung der Magenverdauung in Folge grober oder einförmiger Kost als Ursachen des Scorbutes anzusehen sind, so muss auf möglichste Abwechselung und Mischung der Kost Rücksicht genommen werden. Als scorbutverhindernde Nahrungsmittel gelten noch jetzt frisches Obst, frische Gemüse, Citronensäure, Sauerkraut und Brunnenkresse, Bier und Alkohol. Bei ausgebrochenem Scorbut ist nach Neumann und Vogel der Genuss der Bierhefe 150—200·0 pro die allen andern Mitteln vorzuziehen. Zur Beseitigung der hämorrhagischen Diathese empfehlen sich Chinadecocte mit Acid sulfur. dilut., Gentiana, Calam. aromat. Tinct. Chinae 40·0 mit Tinct. Zingib. 20·0, Chinin, Ergotin und Eisen. Von Einigen wird auch Creosot und Aqua picis empfohlen.

Die locale Behandlung muss auf fleissigste Reinigung des Mundes mit den früher erwähnten Mitteln bedacht sein. Bei Neigung zu Blutungen zeigen sich Bepinselungen der Geschwüre mit verdünntem Liq. ferri sesquichl. oder Bestreuen mit Alaun sehr wirksam, bei grosser Schmerzhaftigkeit ist Cocain angezeigt.

Grosse Aehnlichkeit mit den beiden eben besprochenen Formen hat die **idiopathische Stomacace, die Mundfäule.**

Ihre Aetiologie ist noch nicht ganz aufgeklärt, doch kann als sicher angenommen werden, dass schlechte, feuchte Wohnungen, Ueberfüllung der Wohnräume, ungenügende oder ungeeignete Kost, abnorm heisse Sommer, Malaria, Rhachitis, Scrophulose und Tuberculose bei der Genese der Krankheit eine wichtige Rolle spielen. Wenn die Stomacace auch hauptsächlich eine Krankheit des Kindesalters ist, so werden doch auch Erwachsene nicht verschont, wie die

zahlreichen Epidemien bei dem Militär in Belgien, Frankreich, Portugal etc. beweisen. Da ihre Existenz von dem Vorhandensein des Zahnfleisches resp. der Zähne abhängt, so kommt die Affection bei zahnlosen Kindern oder Greisen nicht vor, dagegen stattet sie ungesunden, überfüllten Findelhäusern, Pflegeanstalten, Spitälern und Kasernen mit besonderer Vorliebe ihre Besuche ab. Sie tritt theils sporadisch, theils epidemisch auf, weshalb sie auch für contagiös gilt, zumal seit Bergeron an sich selbst einen positiven Impfversuch anstellte. Die Nichtcontagionisten dagegen stützen sich auf andere negative Impfversuche, sowie auf die Thatsache, dass die Officiere und Unterofficiere der befallenen Kasernen wenig oder gar nicht von der Krankheit ergriffen werden, und glauben, die Schädlichkeit sei weniger an den Menschen als an den Boden und die Localität gebunden. Bohn hält es für zweifellos, dass die Stomacace weder eine Krankheit specifischen Ursprunges ist, noch auf Infection beruht. Sie erklärt sich vielmehr aus einer durch allgemeine Ursachen hervorgerufenen oder begünstigten localen chronischen Entzündung und Widerstandslosigkeit des Zahnfleisches.

Die idiopathische Stomacace beginnt meist acut, selten in chronischer Weise unter den Erscheinungen der katarrhalischen Stomatitis des Zahnfleischrandes des Unterkiefers. Nach kurzer Zeit, in 2—3 Tagen, bei der chronischen Form nach Wochen, selbst Monaten, erweicht das geschwellte von den Zähnen abstehende Zahnfleisch und verwandelt sich in eine gelbliche, schmierige, stinkende Masse, nach deren Abstossung ein Geschwür zum Vorschein kommt, das sich längs des Zahnfleischrandes ausbreitet, bei der geringsten Berührung blutet und zur Folge hat, dass die Zähne im weiteren Verlauf ausfallen. Auch auf den dem Zahnfleisch gegenüberliegenden Theilen der Wangen und der Zunge bilden sich aus blaurothen gewulsteten Stellen tiefe Geschwüre, deren Grund mit einem graugelben sanguinolenten Eiter bedeckt ist. Meist lässt sich auch Schwellung der Lymphdrüsen am Unterkiefer constatiren. In dem schmierigen Belege der Ulcerationen finden sich neben Blut- und Eiterkörperchen, amorphen Massen eine Unzahl von Pilzen, besonders Lepthothrix buccalis, Spirochaeten und Monas Lens. Den höchsten Grad erreichen die Beschwerden, wenn das Kieferperiost befallen wird oder Gangrän auftritt. Das Allgemeinbefinden ist in der Regel wenig gestört, Fieber fehlt oder ist gering, der Appetit oft nur verringert, der Schmerz meist sehr hochgradig, der Geruch aus dem Munde pestartig.

Die Prognose der Stomacace ist im Allgemeinen günstig, besonders wenn die Kranken frühzeitig genug in Behandlung kommen. Die Geschwüre heilen meist ohne Narben, doch bleiben solche mit Functionsbehinderung zurück bei sehr tiefen oder gangränösen Substanzverlusten. In seltenen Fällen kommt es zu Kiefernekrose.

Die Diagnose stützt sich auf die Symptome, die Aetiologie und das öftere endemische Auftreten der Krankheit, doch ist es beim Beginne manchmal recht schwer, die idiopathische Stomacace vom Mercurialismus oder Scorbut zu unterscheiden. Bei letzterem ist in

der Regel das Zahnfleisch viel intensiver geschwellt, von blaurother livider Farbe, über die Zähne emporwuchernd, auch fehlt der gelbe Saum.

In der Therapie der Stomacace spielt das Kali chloricum die erste Rolle. Der äussern Anwendung als Mundwasser steht nur oft die übergrosse Empfindlichkeit der Mundhöhle sowie das kindliche Alter der Patienten entgegen; innerlich gibt man einem vierjährigen Kinde davon in Wasser oder Chinadecoct pro die 2·0, einem Erwachsenen 5·0. Nach Vogel verschwindet der Fötor schon nach 12 Stunden, das Zahnfleisch blutet nicht mehr, kurz überall macht sich Besserung bemerkbar. Nach Bohn heilen manche Fälle nur durch Extraction der Zähne im Bereiche des erkrankten Zahnfleisches.

Bei den meist anämischen und heruntergekommenen Patienten muss der Ernährung sowie der Verbringung in frischer Luft eine ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden; hat man die Kranken über das schlimmste Stadium mit flüssiger Nahrung hinweggebracht, dann empfehlen sich breiige und allmälig erst feste Substanzen, starke Weine, Bier, Eisen, China. Stets aber muss, so lange noch Spuren von Ulcerationen vorhanden sind, die Mundhöhle nach jeder Nahrungsaufnahme gereinigt und mit desinficirenden aromatischen Wässern ausgespült, bei Kindern ausgewischt werden. Dazu eignen sich besonders Tinct. Myrrhae, Tinct. Benzoes, Tinct. Ratanh., Tinct. Cochleariae, Tinct. Catechu; Ol. Terebinth. mit Chloroform und Tinct. opii āā, als Bepinselung ferner das Jodoform, Salol oder Jodol.

Nach Betrachtung der specifischen Mundentzündungen wenden wir uns zu den einzelnen mehr circumscripten Geschwürformen, von denen jene, welche mechanischen, chemischen oder thermischen Reizen ihre Entstehung verdanken, die sogenannten **traumatischen Geschwüre** wegen ihres alltäglichen Vorkommens zuerst berücksichtigt werden sollen.

Am bekanntesten sind die Ulcerationen an den Rändern und der Spitze der Zunge, den Lippen und Wangen in Folge von Biss, scharfen Zahnrändern und spitzigen Wurzelresten. An sie schliessen sich die Geschwüre des Zahnfleisches, entstanden durch den Reiz des Zahnsteines. Hieher gehören ferner auch die Geschwüre, die auf eingedrungene Fremdkörper, Knochenstücke, Nähnadeln, Fischgräten oder den unvorsichtigen Genuss starker Säuren und Alkalien, so besonders oft der Carbolsäure oder siedenden Wassers zurückzuführen sind; ferner das sogenannte Keuchhusten- und Dentitionsgeschwür der Kinder.

Das erstere verdankt den Frictionen der während der Hustenanfälle hervorgestreckten Zunge an den Kanten der Zähne seine Entstehung und sitzt gewöhnlich an dem Zungenbändchen oder neben demselben, seltener an der Spitze oder der oberen Fläche der Zunge. Das Dentitionsgeschwür ist verursacht durch das Hervorbrechen der unteren Schneidezähne, es erscheint meistens im Verlaufe des ersten Lebensjahres und sitzt constant an der unteren Fläche der Zungenspitze oder an der Insertion des Frenulum linguae; seine Ränder

sind meist etwas infiltrirt, der Grund speckig, bei Berührung sehr schmerzhaft, zuweilen wird das Frenulum ganz zerstört. Während es bei wohlgenährten Kindern meist schon nach einigen Tagen heilt, ist es bei schlechtgenährten oder an Verdauungsstörungen leidenden sehr hartnäckig.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass bei der laryngoskopischen Untersuchung gar nicht selten durch ungestümes Hervorziehen und Aufpressen der Zunge auf die Zähne Einrisse und Ulcerationen am Frenulum linguae erzeugt werden. Ob die bei Trigeminuslähmung entstehenden Geschwüre am Zahnfleisch, den Lippen und Wangen traumatischer oder trophoneurotischer Natur sind, ist noch nicht endgiltig entschieden.

Die Beschwerden, welche derartige Geschwüre verursachen, beschränken sich in der Regel auf Schmerzhaftigkeit und Empfindlichkeit beim Essen und Sprechen. Dass Kinder in der Ernährung sehr leiden, bedarf keiner weiteren Erklärung. In selteneren Fällen gesellen sich dazu mehr oder weniger ausgesprochene Salivation und Blutungen, die jedoch fast niemals bedenklicher Natur sind; endlich darf man nicht vergessen, dass solche Geschwüre krebsig werden können.

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache; so müssen z. B. scharfe Zähne abgefeilt oder extrahirt, Fremdkörper und Zahnstein entfernt werden. Local empfehlen sich die bei Stomatitis catarrhalis angeführten Mittel, eventuell Touchirung mit Lapis. Da das Dentitions- und Keuchhustengeschwür oft nur nach Verbesserung der Nutrition und Constitution heilt, so müssen diese wie allenfalls bestehende Verdauungsstörungen sorgfältigst behandelt werden.

Eine andere Art von Geschwüren, welche früher mit Aphthen identificirt wurden, sind die **Follikularverschwärungen** am harten Gaumen der Neugeborenen, auch Bednar'sche Aphthen genannt.

Nach Bohn finden sich auf der gelblichen injicirten Schleimhaut des Gaumengewölbes in und neben der Raphe sowie den neben den oberen Alveolarfortsätzen gelegenen Theilen des harten Gaumens hirsekorn- bis stecknadelkopfgrosse Knötchen von weisser, milchiger Farbe und rundlicher Gestalt, die bald wenig, bald stark über die Schleimhaut hervorragen und als verstopfte Schleimhautfollikel oder Epidermioidcysten von Epstein als Epithelperlen bezeichnet werden. Nach Epstein entstehen dieselben aus einer ungleichmässigen und stellenweisse unterbrochenen Vereinigung der Gaumenplatten, zwischen welchen kleine Hohlräume übrig bleiben, die durch fortgesetzte Zellenproliferation der Wände sich zu geschichteten Epithelkugeln entwickeln.

Ein Theil dieser Knötchen bleibt Wochen, selbst Monate lang unverändert, ein anderer Theil zerfällt eitrig und bildet plattenförmige Ulcerationen, welche durch die Raphe in zwei Hälften getheilt und von gewulsteter bläulicher Schleimhaut wallartig umschlossen werden. Die seitlich sitzenden Geschwüre an den hintern Winkeln des harten Gaumens — die Plaques pterygoidiennes — entstehen wohl durch

Läsion der über die Hamuli pterygoid. straff gespannten Schleimhaut beim Saugen, sie sind von Linsengrösse, scheibenförmig oder oval; manche von ihnen sind scharf abgegrenzt, wie mit einem Locheisen herausgeschlagen. Diese Geschwüre confluiren, können bei kachektischen Kindern die ganze Schleimhaut durchsetzen und sogar den Knochen blosslegen. Henoch leugnet ihre Entstehung aus den obenerwähnten Epithelperlen.

Die durch diese Ulcerationen erzeugten Beschwerden entgehen, da sie nur bei Säuglingen vorkommen, in der Regel der Beobachtung, ab und zu werden die Angehörigen oder der Arzt durch Schreien und erschwertes Saugen auf sie aufmerksam gemacht. Nach Bohn etablirt sich Soor, Diphtherie und Gangrän gern auf diesen Geschwürchen.

Die Diagnose stützt sich auf den stereotypen Sitz, das Aussehen und die Flüchtigkeit der Erkrankung. Verwechselungen mit syphilitischen Geschwüren sind bei einiger Aufmerksamkeit zu vermeiden.

Eine Behandlung ist bei der spontanen Rückbildung des Leidens meist nicht nöthig, im Uebrigen kann man dasselbe durch Pinselungen mit Zinc. sulf. 1 : 10 oder Arg. nitr. 1 : 15 rasch heilen.

Relativ noch wenig bekannt und deshalb mit anderen Processen verwechselt sind die **idiopathischen Schleimhautgeschwüre der Zunge.**

Man versteht darunter oberflächliche Substanzverluste oder Excoriationen, die auf kein dyskrasisches Leiden, namentlich nicht auf Syphilis zurückgeführt werden können. Aeusserst zahlreich sind die Namen, welche man für die in Rede stehende Affection vorgeschlagen hat.

Während die Einen nach dem Vorgange von Caspary dieselben als flüchtige, gutartige Plaques bezeichnen, nennen die Anderen mit Unna dieselben kreisfleckige Exfoliation der Zunge oder wandernden Ring, ringförmige Exfoliation oder Landkartenzunge, Andere wiederum oberflächliche Excorationen oder Epithelabschilferungen. Dieselben als idiopathische Schleimhautplaques zu bezeichnen, erscheint mit Rücksicht auf ein gleichfalls so benanntes schon beschriebenes anderes Leiden, die Leukoplakia, nicht empfehlenswerth.

Die gutartigen oberflächlichen, in Form rundlicher Flecken oder länglich gewundener Streifen oder sich durchschneidender Ringe auftretenden Excoriationen sitzen auf dem Rücken und den Rändern der Zunge und zwar häufiger auf dem vorderen Theile nahe der Spitze. Sie haben einen rothen, körnigen Grund und einen weissen, gold- oder schwefelgelben oder lehmfarbigen schmalen etwas erhabenen und scharf abgeschnittenen Rand; die Ränder der Zunge sind zuweilen facettirt, die Papillae filiformes verloren gegangen, die Papillae fungiformes geschwellt und geröthet oder ihres Epithels beraubt; der gelbe Rand besteht aus Epithelien und Pilzmasse sowie Papillenkuppen.

Die subjectiven Beschwerden können völlig fehlen, so dass das Leiden zufällig entdeckt wird; nicht selten jedoch besteht Em-

pfindlichkeit und geringe Schmerzhaftigkeit beim Genusse zu hoch oder zu niedrig temperirter oder gewürzter oder scharfer Speisen, sowie beim Rauchen. Jucken und Salivation, sowie heftiger in Paroxysmen auftretender Schmerz kommt fast nur bei sehr ausgebreiteten Epithelverlusten oder bei gleichzeitiger Mitbetheiligung des Nervensystems vor; man bezeichnet die mit materiellen Veränderungen an der Zunge einhergehenden Schmerzen auch als Glossodynia exfoliativa (Kaposi) im Gegensatz zu jener Form, bei welcher sich keine objectiven Veränderungen auffinden lassen (Glossodynia nervosa). Durch beständige Reizung der epithelberaubten Stellen durch die Zähne oder durch Rauchen kann es, wie Verfasser gesehen, zu Schwellung der benachbarten Lymphdrüsen kommen; bei Kindern gibt die Affection nicht selten zu Ernährungsstörungen Anlass. Zuweilen geht dem Eintritt der Menses eine Exacerbation des Uebels voraus, mit dem Erscheinen desselben lässt es wieder nach. Nach Schwimmer scheinen die gutartigen Exfoliationen manchmal dem Ausbruche der Leukoplakie vorauszugehen. Im Bereiche der ergriffenen Theile ist weder der Geschmack noch der Tastsinn in irgend einer Weise verändert.

Während Unna die idiopathischen Zungenerosionen als eine höchst chronisch verlaufende mit acuten Nachschüben einhergehende fast schmerzlose Epithelerkrankung hält und glaubt, dass dieselbe durch nervöse Reize unterhalten werde, halten andere die Affection für eine subacute Entzündung der Schleimhaut resp. der Papillen. Die deutschen Forscher stellen mit Bestimmtheit jeden Zusammenhang mit Syphilis in Abrede, welcher Ansicht sich auch Verfasser anschliesst, Parrot hingegen bringt die Affection mit Syphilis in Verbindung. Eine unstreitige Disposition zur Landkartenzunge gibt die Anämie, ferner Dyspepsie, Magenkatarrh und ganz besonders die Dentition, weshalb $^1/_2$—3jährige Kinder oft ergriffen werden. Auch die Heredität scheint eine Rolle zu spielen.

Nach Gautier können alle Veranlassungen, welche den Organismus herunterbringen, Gelegenheit zu der Entwicklung des Uebels geben, so besonders Excesse, hochgradige Ermüdung, gastrische Beschwerden und Helminthiasis. Die Syphilis wirkt nach Gautier nicht direct auf die Entstehung der Krankheit hin, sondern nur im Allgemeinen durch Schwächung des Organismus.

Die Diagnose stützt sich hauptsächlich auf die Flüchtigkeit, Oberflächlichkeit, sowie den chronischen und höchst wechselnden Verlauf der Erkrankung. Die aphthösen und herpetischen Geschwüre zeigen tiefere Substanzverluste und im Allgemeinen auch eine viel grössere Schmerzhaftigkeit und befallen noch andere Theile der Mundschleimhaut, so besonders Lippen, Gaumen, und verlaufen acut. Am häufigsten finden Verwechslungen mit syphilitischen Plaques statt. Während die syphilitischen Plaques ein milchweisses, bläuliches Aussehen haben, stets mit einer Infiltration der Basis einhergehen und niemals so schnell ihr Aussehen und ihren Standort wechseln, ferner auch an anderen Stellen der Mundhöhle, so besonders an den Lippen,

Wangen, am Zahnfleisch und im Rachen vorkommen, charakterisiren sich die gutartigen Exfoliationen durch gelbliche Farbe der Ränder und Röthe des Grundes, durch den Mangel eines Infiltrates, durch ausserordentliche Flüchtigkeit hinsichtlich der Form, Grösse und des Standortes und durch Beschränktsein auf die Zunge.

Die Prognose der idiopathischen Zungenplaques ist insoferne günstig, als die Affection keine Neigung hat, einen bösartigen Charakter anzunehmen, ungünstig aber wegen der Hartnäckigkeit und des chronischen Verlaufes.

Hinsichtlich der Therapie gehen die Ansichten sehr auseinander. Während die Einen die vollständige Nutzlosigkeit jeglicher localen Behandlung betonen, will Unna recht befriedigende Erfolge haben durch Mundwässer aus Flor. sulf. 10·0, Mixt. gummos. oder Emuls. amygd. 200·0 oder aus Natr. subsulfur. Glycerin āā 10·0, Aq. dest. 200·0. Am wirksamsten zeigte sich ihm aber folgende Mischung.

Rp. Aq. subsulfur. Aq. menth. pip. āā 100·0, Flor. sulf. Syr. simpl. āā 20·0, Gummi Tragac. 2·0. D. S. Mundwasser, gut umzuschütteln. Nach vorheriger Reinigung der Mundhöhle mit lauem oder kühlem Wasser wird ein Schluck dieser Mischung 5 Minuten lang im Munde behalten und nach allen Richtungen getrieben. In der Regel genügt eine dreimalige tägliche Spülung. Bei kleinen Kindern wird man sich auf Betupfen der Zunge mit Borax, Tannin begnügen müssen. Ausser der localen muss auch noch eine Allgemeinbehandlung platzgreifen bei Anomalie der Blutmischung, Affectionen des Magens und des Nervensystems oder der weiblichen Genitalien. Bei sehr heftigem Schmerz empfiehlt sich das Cocain, auch konnte Kaposi in einzelnen Fällen durch Bepinselungen mit Lapislösung Erfolge erzielen.

Stomatitis diphtheritica.

Die Diphtherie der Mundhöhle ist in der Regel eine secundäre Krankheit, d. h. vom Rachen fortgeleitet, und befällt so am häufigsten den harten Gaumen, die hinteren und seitlichen Theile der Zunge, die Schleimhaut des Mundbodens, der Wangen und des Zahnfleisches in der Umgebung der hinteren Backzähne. Im Verlaufe des Scharlachs kommt es an den Mundwinkeln, den Lippen und der Zunge zu grauweissen Plaques, die von den Meisten für diphtheritische gehalten, von Henoch jedoch für Producte einer nekrotisirenden Entzündung erklärt werden.

Primär etablirt sich die Diphtherie noch am ehesten auf schon länger bestehenden Schleimhautrissen und Geschwüren oder auf Wunden in Folge chirurgischer Eingriffe; sehr selten wird die völlig intacte Schleimhaut primär ergriffen; Verfasser beobachtete nur zwei derartige Fälle, den einen bei einem Oekonomiearbeiter, der unter gangränös-septischen Erscheinungen zu Grunde ging, den andern bei einem Herrn durch Infection mit einem Zahnschlüssel, welcher kurz

zuvor bei einem Diphtheriekranken in Anwendung gekommen und mangelhaft gereinigt worden war.

Die Beschwerden bestehen ausser in gastrischen und Allgemeinerscheinungen sowie Fieber, das aber ebenso wie bei Rachendiphtherie sehr unbedeutend sein oder auch ganz fehlen kann, in Schmerzen beim Oeffnen des Mundes, beim Kauen und Sprechen, in übler Exhalation, Blutungen, die zuweilen eine lebensbedenkliche Heftigkeit und Dauer annehmen. Die Pseudomembranen können in der Mundhöhle dieselbe Mächtigkeit wie im Rachen erreichen, aber auch dünne, schmierige Belege vorstellen, nach deren Abstossung die Schleimhaut, des Epithels beraubt, ecchymosirt und ulcerirt erscheint.

Der Verlauf ist ähnlich wie im Rachen; die Krankheit kann sich localisiren, aber ebensogut auch auf Rachen, Nase und Kehlkopf fortpflanzen und zu Allgemeininfection Anlass geben.

Die Prognose richtet sich nach der Intensität und dem Charakter der Erkrankung, dem Allgemeinbefinden des Kranken und allenfallsigen Complicationen mit Scharlach, Typhus, Cholera etc.

Die Therapie ist dieselbe wie bei der später zu besprechenden Rachendiphtherie.

Stomatitis gangraenosa.

Wenn die Gangrän der Mundhöhle gleichfalls unter den entzündlichen Processen eine Stelle findet, so hat dies insoferne Berechtigung, als derselben immer entzündliche Erscheinungen vorausgehen und die Gangrän nur einen der mannigfachen Ausgänge der Entzündung vorstellt.

Unter den veranlassenden resp. disponirenden Ursachen spielen Anomalien der Blutmischung, schlechte Ernährung, Scrophulose, Scorbut, sowie schwere Infectionskrankheiten, besonders Typhus, Scharlach, ferner parenchymatöse Exsudationen und Eiterinfiltrate die Hauptrolle.

Je hochgradiger die durch die Entzündung gesetzten Circulationsstörungen durch Embolie und Thrombose sind, je massenhafter die Exsudation von Blut und Eiterzellen oder Faserstoff stattgefunden hat, desto grösser ist die Gefahr des gangränösen Zerfalles. In der Mundhöhle geht dieselbe theils von der Schleimhaut aus, theils von den tieferliegenden Theilen und tritt bald circumscript bald diffus auf.

Wenn sich auch unter besonders ungünstigen Umständen zu jeder der im vorvorigen Capitel geschilderten Geschwürsformen Gangrän gesellen kann, so gehört ein solcher Ausgang doch immerhin zu den Seltenheiten. Noch am ehesten ist dies der Fall bei der diffusen phlegmonösen, der diphtheritischen, mercuriellen und scorbitischen Stomatitis sowie der idiopathischen Stomacace.

Mit besonderer Vorliebe entwickelt sich die Gangrän meist selbstständig ohne vorausgegangene Mundaffectionen an der Wange. Man hat diese Form des Brandes als Noma oder Wasserkrebs bezeich-

net und als selbstständige Krankheit beschrieben. Hiefür ist aber, wie Bamberger und andere Autoren mit Recht geltend machen, durchaus kein Grund vorhanden, zumal sich die Noma nur durch ihren Sitz, keineswegs aber durch ihr Wesen von den anderen Arten der Gangrän unterscheidet. Die feuchte Form des Brandes ist in der Mundhöhle die häufigere, doch kommt auch die trockene zur Beobachtung.

Als ätiologische Momente der Noma kommen insbesondere mangelhafte Ernährung, Wohnen in dumpfen, feuchten, überfüllten Räumen in Betracht. Doch darf man, wie Vogel hervorhebt, diesen Schädlichkeiten schon deshalb keine allzugrosse Bedeutung beimessen, weil die Krankheit unter dem massenhaften Proletariat der grossen Städte weit häufiger sein müsste. Sicher ist, dass Noma in niedrig gelegenen Orten, in Küstenstrichen und Malariagegenden, so besonders in Holland, häufiger vorkommt, als in höhergelegenen, dass die Jahreszeit ziemlich indifferent ist, dass von Geburt aus schwächliche oder durch acute Infectionskrankheiten, so besonders Typhus und Masern, Dysenterie oder chronische Darmkatarrhe geschwächte Kinder, besonders weiblichen Geschlechtes, vom 3.—7. Lebensjahre am häufigsten befallen werden, dass aber auch gesunde Erwachsene von der Krankheit ergriffen werden können. Nicht zu leugnen ist endlich, dass durch unvorsichtige Behandlung schwächlicher Kinder oder decrepider älterer Personen mit Quecksilberpräparaten während des Verlaufes acuter Infectionskrankheiten oder anderer schwerer Erkrankungen durch das Mittelglied der mercuriellen Stomatitis der Ausbruch der Noma begünstigt werden kann.

Die Noma schliesst sich entweder an schon bestehende locale Erkrankungen, so z. B. an die Stomatitis ulcerosa des Zahnfleisches oder der Wange an oder sie beginnt scheinbar primär als circumscripte harte kirschkern- bis haselnussgrosse Infiltration der Innenfläche einer, meist der linken Wange neben dem Mundwinkel, theils als blassrothes, mit trübem, braunem oder missfarbigem Inhalt gefülltes Bläschen. Zuweilen ist nicht zu entscheiden, welche dieser beiden Veränderungen zuerst vorhanden war, zumal die Kranken meist erst im Stadium der Ulceration in Behandlung kommen. Man findet dann ein oberflächliches Geschwür mit missfarbigem Grunde auf harter infiltrirter Basis, die auch von der Aussenfläche der Wange her fühlbar und auf Druck empfindlich ist. Die Zerstörung in der Mundhöhle schreitet täglich, ja stündlich weiter, so dass schon nach wenigen Tagen die Innenfläche der Wange, des Zahnfleisches und die Hälfte einer Lippe in eine fötide, schwarze oder schwarzbraune Masse umgewandelt ist. Gleichzeitig oder später schwillt die Haut der Wange und das untere Augenlid ödematös an, ihre Oberfläche zeigt einen fettigen, ölartigen Glanz und eine bläuliche marmorirte Färbung, die Lymphdrüsen intumesciren, die Wange erscheint gedunsen und heiss, in der Mitte bildet sich ein bläulicher, livider, von einem dunkeln Entzündungshofe umgebener Fleck, welcher in kurzer Zeit zu einem bräunlichen Schorfe vertrocknet und nach dessen Abstossung ein tiefes gangrä-

nöses Geschwür sichtbar wird. Ist die Wange durch fortschreitende Zerstörung von innen und aussen einmal durchbrochen, dann verbreitet sich die Gangrän nach allen Richtungen hin unaufhaltsam auf Lippen und Zunge, Nasenflügel, Augenlid bis zum Ohre, der Stirne und den Schläfen nach abwärts bis zu den Schlüsselbeinen der befallenen Seite. Die Kiefer, die Knorpel und Knochen der Nase, Theile des Wangenbeins werden nekrotisch, die Zähne fallen aus, die ganze Wange wird abgestossen und so das Aussehen der Kranken in furchtbarster Weise bis zur Unkenntlichkeit verändert.

Unter den subjectiven Erscheinungen der Noma ist im spätern Verlaufe die Apathie und tiefe Depression am auffallendsten, die Schmerzen sind oft gering, das Fieber fehlt im Anfange oder ist unbedeutend, der Puls beschleunigt, klein, Appetit anfangs oft normal, später verringert, Durst vermehrt, die Haut kühl, manchmal heiss. Die Secretion der Mundhöhle wird mit dem Fortschreiten des Processes immer profuser, blut- und jauchereicher, der Geruch von Tag zu Tag unerträglicher. Oedem der unteren Extremitäten, lobuläre Pneumonie, Lungengangrän oder profuse Diarrhöen beschleunigen den Kräfteverfall, so dass der tödtliche Ausgang schon nach einigen Tagen eintreten kann, bevor noch die örtlichen Erscheinungen eine besondere Höhe erreicht haben. In der Regel aber erfolgt der Tod 4—8 Tage nach der Perforation der Wange.

Die Symptome der übrigen Formen der Mundgangrän richten sich nach der Grundkrankheit, aus welcher sich dieselbe entwickelt. Der Zeitpunkt der Entwicklung der Gangrän ist höchst verschieden und hängt ab von dem Charakter und der Intensität der Entzündung. Die Schmerzen, die anfangs ausserordentlich heftig waren, können zwar nach dem Eintritte des Brandes noch fortdauern, werden aber meist gering oder können ganz schwinden. Die Speichelsecretion ist vermehrt, der Athem aashaft, manchmal treten durch Arrosion der meist thrombosirenden Gefässe profuse Blutungen ein. Die anfangs febrilen Erscheinungen machen später einer gewissen Gleichgiltigkeit und Depression Platz, die vorher heisse Haut wird kühl, die Züge verfallen, es treten Schüttelfröste auf und die Kranken gehen durch metastatische Entzündungen anderer Organe pyämisch oder septichämisch zu Grunde.

Die Prognose der Mundgangrän ist bei allen Formen eine höchst dubiöse; wenn auch bei sehr circumscriptem Auftreten und schneller energischer Behandlung noch die meisten Aussichten auf Heilung bestehen, so kann doch der Process plötzlich einen bösartigen Charakter annehmen. Sehr schlecht ist die Prognose bei allen diffusen Zerstörungen und der eigentlichen Noma, zumal, wenn die äusseren Verhältnisse ungünstig oder schon Complicationen in andern Organen eingetreten sind. Neigt sich der Process zur Heilung, so gibt sich dies durch einen Stillstand der Zerstörung kund; in der Umgebung des Brandschorfes entwickelt sich demarkirende Entzündung mit eitriger Secretion, durch welche die nekrotischen Schleimhautpartien als schwarze, stinkende Schorfe oder zunderartige, schwam-

mige Massen abgestossen werden, während auf dem Grunde des Geschwürs gutartige Eiterung und Granulation eintritt. Stets geschieht die Heilung mit Narbenbildung; je hochgradiger die Zerstörung war, desto schwerer sind auch die zurückbleibenden Functionsstörungen, unter denen Difformitäten des Gesichtes, Verwachsungen der Schleimhäute, Verengerung der Mundspalte und der Nasenöffnungen, Ectropien der Augenlider und narbige Kieferklemme besonders erwähnenswerth scheinen. Nach Bohn kann eine in Heilung begriffene oder schon geheilte Noma recidiviren, in welch' letzterem Falle auch das feste Narbengewebe der Zerstörung anheimfällt.

Da man in der Regel nicht im Stande ist, die Ursachen, welche die Stomatitis gangraenosa hervorrufen oder begünstigen, zu entfernen, so muss die Behandlung auf möglichste Erhaltung der Kräfte, sorgfältige Reinigung und Ventilation gerichtet sein. Haben sich Schorfe gebildet, so müssen dieselben mittelst Scheere oder Messer abgetragen und der Versuch gemacht werden, dem Weiterschreiten des Processes Einhalt zu thun. Man bedient sich zu diesem Zwecke der Mineralsäuren, des Eisenchlorids, des scharfen Löffels, des Thermocautère oder des Höllensteinstiftes, welcher etwas zugespitzt und tief in die gangränösen Stellen eingebohrt wird, bis man auf resistentes Gewebe stösst. Zur Reinigung und Desodificirung bedient man sich des Jodols, Jodoforms, Carbolsäure, Sublimats, Wasserstoffsuperoxyds, Salols, Thymols etc. Sehr günstige Resultate rühmt man neuerdings dem absoluten Alkohol nach, der nach Entfernung der gangränösen Theile mit dem scharfen Löffel auf die betreffenden Stellen eingepinselt und mittelst Verbandgaze, die damit imprägnirt ist, einige Stunden auf derselben belassen wird. Zur Beförderung der Granulationen empfiehlt sich die Application von Tinct. Myrrhae, von Tinct. Benzoes, Bals. Peruv. Ol. Terebinth. oder Vinum camphorat.

Hinsichtlich der Ernährung und Kräftigung der Kranken stösst man leider in der Regel auf die grössten Hindernisse. Bei dem Widerwillen gegen Speisen und Medicamente und dem beständigen Abfliessen des allenfalls mühsam Beigebrachten durch die Perforationsöffnung kann der Erfolg kein nennenswerther sein. Auch die Ernährung mittelst Schlundrohr oder Clysma ist oft schwer durchzuführen oder ungenügend. Immerhin sind Chinadecocte, Kampheremulsionen innerlich oder Klystiere von Chinin oder Chloral, subcutane Morphiuminjectionen zur Erleichterung des trostlosen Zustandes angezeigt. Der sofortigen Versetzung der Kranken in reine gute Landluft, welche nach Bohn die mächtigste Heilpotenz bildet, stehen leider nur zu oft sociale und andere Gründe entgegen.

Syphilis.

Die Mundhöhle wird von der Syphilis in ganz besonderer Weise bevorzugt.

Primäraffectionen, weiche und harte Schanker und nicht ulcerirte Sclerosen, Papeln an den Lippen, der Spitze der Zunge, den Wangen in Folge von unreinen Küssen und Berührungen oder des Gebrauches inficirter Gegenstände, so namentlich von Cigarrenspitzen, des im Orient sehr verbreiteten Nargileh, oder Tabakspfeifen, Glasbläserröhren, Gläsern, Löffeln, Trompeten etc. sind durchaus nicht so selten, als man gewöhnlich glaubt. Die Schwellung der Sublingualis, Submaxillaris und der am Mundboden und den oberen Halspartien liegenden Lymphdrüsen ist stets eine sehr ausgesprochene, zuweilen kommt es sogar zur Abscedirung. Die bald nachfolgenden Affectionen der allgemeinen Decke und das Aussehen der ergriffenen Stellen lassen in der Regel keinen Zweifel an der Diagnose aufkommen.

Unendlich häufig sind unter den Secundäraffectionen die syphilitischen Schleimhautpapeln (Plaques opalines). Zuerst zeigen sich auf der Schleimhaut kreisrunde, linsen- bis erbsengrosse, geröthete, etwas erhabene Flecke; später trübt sich das dieselben bedeckende Epithel milchig oder perlmutterartig; wird dasselbe abgestossen, so erscheint die Unterlage hochroth, wuchern die Papillen oder Schleimhautfollikel auf dem Grunde des Geschwürs weiter, so wird die Oberfläche derselben uneben und mit spitzigen Excrescenzen und moleculärem Detritus bedeckt. Sitzen die Plaques, wie z. B. auf der Lippe, theils auf der Schleimhaut, theils auf der Cutis, so vertrocknet der auf der letzteren sitzende Detritus zu einer schwarzbraunen Borke, während derselbe auf der Schleimhaut die grauweisse Farbe beibehält. Confluiren mehrere Papeln, dann entstehen ausgebreitete Geschwüre, welche zuweilen diphtheritischen täuschend ähnlich sehen. An den Mundwinkeln nehmen in Folge der hier stattfindenden Zerrung, Reibung und Verunreinigung die Papeln gerne die längliche Form an, es entstehen dadurch strichartige und gewundene Zerklüftungen und Schleimhautfissuren, die sogenannten Rhagaden, welche spontan sehr schwer heilen und schon deshalb den Verdacht einer verheimlichten oder nicht beachteten Syphilis erwecken müssen. Als Lieblingssitze der syphilitischen Schleimhautplaques müssen die Lippen, Mundwinkel und die Ränder der Zunge, sowie ihre untere Fläche bezeichnet werden, in zweiter Reihe die Schleimhaut der Wangen, das Zahnfleisch, der harte und weiche Gaumen. Wie an den Mundwinkeln so finden sich auch an der Zunge und den Wangen zerklüftete Schleimhautpapeln, namentlich wenn dieselben durch scharfe Zahnkanten gereizt und insultirt werden.

Der Verlauf der syphilitischen Plaques ist ein langsamer und chronischer; sie verschwinden theils spontan theils durch therapeutische Eingriffe oft sehr schnell, recidiviren aber auch nach kürzerer oder längerer Pause Jahre lang immer wieder und gehören so zu den hartnäckigsten Erscheinungen der Lues. Bei confluirenden Papeln

beginnt die Heilung in der Regel in der Mitte und schreitet von da gegen die Peripherie fort, indem sich die älteren Epithelschichten durch neue ersetzen. Narben bleiben fast nie zurück.

Die Beschwerden, welche durch zerfallende syphilitische Plaques erzeugt werden, bestehen in Schmerzen beim Essen, Trinken, Sprechen, Rauchen und Kauen; Rhagaden im Mundwinkel verhindern das stärkere Oeffnen des Mundes; wie bei jeder entzündlichen Reizung der Mundhöhle ist auch hier die Speichelsecretion öfters vermehrt, fötider Geruch aus dem Munde jedoch nur bei sehr intensiver Erkrankung vorhanden.

In den späteren Stadien der Syphilis sind es knotige und gummöse Neubildungen, welche durch ihren Zerfall sich in Geschwüre umwandeln. Verhältnissmässig selten entwickeln sich Gummata in der Schleimhaut der Wangen und dann noch am ehesten in der Nähe der Mundwinkel oder in den Lippen in Form circumscripter Knoten oder diffuser, harter, mit getrübtem Epithel überzogener Einlagerungen, am seltensten auf dem Boden der Mundhöhle. Auch in den Masseteren sowie an ihren Ansatzpunkten auf der äusseren Fläche des Unterkiefers hat Verfasser schon Gummata gesehen. Am häufigsten ist unstreitig das Syphilom der Zunge, das theils von der Schleimhaut, theils von der Muskelsubstanz, theils vom interstitiellen Bindegewebe ausgeht, Erbsen- bis Wallnussgrösse erreicht und meist im vordern Theile der Zunge, namentlich an den Rändern und in der Mitte seinen Sitz hat. Die Zungengummata entwickeln sich als derb elastische circumscripte Knoten, welche bei oberflächlichem Sitze nur die Schleimhaut occupiren oder unter derselben liegend dieselbe emporwölben. Zerfällt die Geschwulst von der Oberfläche aus, so entsteht ein verschieden grosses Flächengeschwür mit buchtigen, unterminirten Rändern und speckigem harten Grund. Beginnt der Zerfall in der Tiefe, so zeigen sich an der Oberfläche oft nur schmale Risse und Spalten, welche nach Auseinanderziehen der Ränder eine tiefe Geschwürshöhle zu Tage treten lassen.

Mit besonderer Vorliebe wird auch der harte Gaumen ergriffen. Meist in der Mittellinie, bald vorne, bald weiter hinten, besonders gerne aber an der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen bilden sich eine oder mehrere circumscripte lividrothe Stellen, welche allmählich die Schleimhaut emporwölben und so knotige Erhabenheiten vorstellen; nach längerem oder kürzerem Bestande, oft schon nach wenigen Tagen, zeigen sich in denselben gelbweisse Streifen und Punkte, welche mit Sicherheit beweisen, dass bereits ein Theil der Geschwulst eitrig geschmolzen ist; nicht selten findet sich bei ulceröser syphilitischer Caries des Nasenbodens die Raphe des harten Gaumens verfärbt, verdickt, leistenförmig hervorgewölbt oder gar schon ulcerirt. Durch den Zerfall solcher syphilitischer Knoten oder durch gummöse Ostitis und Periostitis entstehen rundliche oder längliche die ganze Schleimhaut und den Knochen durchsetzende Geschwüre, Perforationen und Communicationen mit der Nasenhöhle, die näselnde Sprache und Regurgitiren des Ingesta zur Folge haben.

Der Process kann mit der Perforation des harten und weichen Gaumens ein Ende nehmen, aber auch nach Unterminirung des Septum narium zur Zerstörung der Nasenmuscheln etc. führen.

Die Beschwerden, welche nicht ulcerirte Gummata verursachen, sind im Allgemeinen gering; sitzen sie in der Zunge, so fühlen die Kranken eine gewisse Schwerbeweglichkeit beim Sprechen und Essen, bei grossen Infiltraten wird die Sprache undeutlich; sitzen sie im Mundwinkel, dann ist das Oeffnen des Mundes erschwert und mit einem Gefühle von Spannung und Zerrung verbunden. Schmerz tritt meist erst beim Zerfall ein und kann sehr heftig sein, wenn die Geschwüre an den Rändern der Zunge oder an Stellen sitzen, wo sie mechanisch gereizt werden. Die unangenehmsten Folgeerscheinungen perforirende Geschwüre des harten und weichen Gaumens haben wir bereits erwähnt.

Die Diagnose der syphilitischen Schleimhautplaques ergibt sich aus dem objectiven Befunde und dem meist gleichzeitigen Vorhandensein anderweitiger Aeusserungen der Syphilis. Am nächsten liegt eine Verwechselung mit Aphthen und Herpes. Während die letzteren Affectionen aber gleich beim ersten acuten Beginn äusserst schmerzhaft sind, schmerzen die syphilitischen Plaques erst nach längerem Bestande, d. h. nach Abhebung ihrer Epitheldecke. Während Herpes stets mit der Bildung von Bläschen beginnt, stellen die syphilitischen Plaques im Anfange linsen- bis erbsengrosse rothe Flecken vor, die erst nach einiger Zeit sich mit einer weissen Epitheldecke bekleiden, während endlich die aphthösen und herpetischen Substanzverluste von der Peripherie zum Centrum heilen, heilen die Papeln meist vom Centrum gegen die Peripherie. Verwechselungen mit chronischer Hydrargyrose und Leukoplakie sind bei genauer Beachtung des in den betreffenden Capiteln Gesagten ziemlich leicht zu vermeiden. Die Diagnose der Gummata der Mundhöhle ist manchmal recht schwierig, besonders wenn dieselben, wie so häufig, als einzige Aeusserungen veralteter oder längst geheilt geglaubter Syphilis auftreten. Die sicherste Diagnose gestatten Gummata und die aus ihnen hervorgegangenen Geschwüre des harten Gaumens, die nur noch bei Phosphornekrose, perforirten Empyemen der Kieferhöhle, bösartigen Neubildungen, Carcinom oder Lupus vorkommen; doch herrscht bei letzteren mehr der Charakter der Neubildung vor. Gleichzeitige Narben auf der Haut und im Rachen, Defecte des Kehldeckels, des Septum narium, Substanzverluste der Stirnbeine, Tophi der Schienbeine, sprechen mit Sicherheit für Syphilis. Die grösste Schwierigkeit bietet die Differentialdiagnose des Gumma und des Carcinoms der Zunge. Wenn es auch richtig ist, dass der Krebs nicht erst bei seinem Zerfalle, sondern schon im allerersten Beginn mit Schmerzen einhergeht, dass ferner Lymphdrüsenschwellung bei Zungensyphilis seltener und weniger ausgesprochen ist als bei Krebs, dass ferner das Gumma mehr circumscript, die krebsige Infiltration mehr diffus auftritt, so sind doch alle diese Unterscheidungsmerkmale zu unzuverlässig; in vielen Fällen kann nur die mikroskopische Untersuchung

herausgenommener Gewebstheile oder der therapeutische Versuch entscheiden; es gibt kaum ein Gumma, das durch Jodkali oder Quecksilber nicht schon nach wenigen Wochen gebessert oder geheilt werden könnte, während Carcinom oder Tuberculose durch diese Mittel nicht beeinflusst werden.

Die Prognose der Mundsyphilis ist günstig, wenn auch die Schleimhautpapeln grosse Neigung zu Recidiven haben und manchmal nach Heilung zerfallener Gummata irreparable Störungen, zerrende Narben, Kieferklemme, Verwachsungen und Perforationen mit Alteration der Sprache zurückbleiben.

Bei der Behandlung der Mundsyphilis hat man zuerst zu berücksichtigen, welcher Periode dieselbe angehört. Handelt es sich um Schleimhautplaques, dann ist eine Mercurialcur nöthig, namentlich bei solchen Kranken, welche noch keiner oder keiner gründlichen Cur unterworfen waren oder bei Recidiven, die schon längere Zeit nicht mehr antisyphilitisch behandelt wurden oder endlich bei solchen, bei denen die Mundaffection sehr ausgebreitet und mit anderen Erscheinungen der Lues combinirt ist. Gegen vereinzelte Plaques immer wieder neue Mercurialcuren zu verordnen, ist unnöthig. Bei der ausserordentlichen Infectiosität der zerfallenden Papeln ist die grösste Vorsicht in der Benützung der Ess- und Trinkgeschirre, Tabakspfeifen etc. nöthig und muss jeder intimere Verkehr zwischen Eheleuten, sowie das Küssen der Kinder und Angehörigen strengstens vermieden werden. Mit syphilitischen Rhagaden behaftete Dienstboten, namentlich Kindermädchen und Köchinnen, sollen auf jeden Fall sofort aus der Familie entfernt und in einem Krankenhause energisch behandelt werden.

Da bei vielen Kranken die Heilung durch Tabakrauchen und Alcoholica verzögert wird, so ist das Verbot derselben unbedingt nöthig. Auf welche Weise das Quecksilber einverleibt wird, richtet sich nach dem speciellen Falle, stets aber dringe man auf peinlichste Pflege der Mundhöhle. Ueberstreichen mit Lapis in Substanz oder Jodglycerinlösung, Sublimat 0·1 : 10·0 bringt die Plaques meist auch ohne Allgemeinbehandlung zur Heilung. Ausserdem empfehlen sich Mundwässer aus Kali chloricum, Tinct. Ratanh., Acid. tann., Borsäure, Jodkali 5 : 300, Sublimat 0·1 : 500. Für die gummösen Processe ist Jodkali das specifische Heilmittel; man beginne mit einer täglichen Dosis von 1 Gramm, bei Kindern mit $^1/_4$ Gramm und steige langsam bis zu 2·0 pro die. In seltenen hartnäckigen Fällen wechsele man mit dem Quecksilber oder dem Zittmann'schen Decocte. Local empfiehlt sich die Bepinselung der Geschwüre mit der Mandl'schen Solution (Rp.: Kali jod. 3·0, Jodi puri 0·5. Glycerin 50·0, Acid. carb. 0·5) oder das Bestreuen mit Jodoform. Hypertrophische Geschwürsränder cauterisire man mit Lapis, papillomatöse Excrescenzen trage man ab. Die durch umfangreichere Perforationen des harten Gaumens erzeugte Sprachstörung kann durch passende Obturatoren beseitigt oder wenigstens verbessert werden.

Tuberculose, Lupus, Lepra, Rotz.

Die **Tuberculose** des Mundes tritt sowohl primär als secundär auf; häufig ist sie fortgeleitet vom weichen Gaumen oder Kehlkopf, namentlich der Epiglottis und befällt dann mehr die hinteren Partien der Mundhöhle, so besonders die Zungenwurzel, die Wangen und den harten Gaumen.

Isolirt erkrankt am häufigsten die Zunge, an der die Tuberculose in zwei Formen zur Beobachtung gelangt, in Gestalt circumscripter Tumoren und als diffuse Miliartuberculose.

Bei der ersten Form bilden sich unmittelbar unter der Schleimhaut oder in der Tiefe der Zunge allmählich an die Oberfläche vordringende isolirte oder multiple Knoten von Erbsen- bis Haselnussgrösse, welche besonders an den Rändern, dem Rücken und dem Grunde der Zunge, aber auch an ihrer unteren Fläche ihren Sitz aufschlagen. Die Schleimhaut über diesen Knoten ulcerirt zuweilen erst nach sehr langem Bestande, wodurch charakteristisch geformte Geschwüre entstehen mit schlitzförmiger Oeffnung und wenig klaffenden, öfters mit weissen Knötchen besetzten Rändern; zieht man die letzteren auseinander, so bemerkt man, dass die Zerstörung in der Tiefe viel weiter um sich gegriffen hat als an der Oberfläche.

Anders verläuft die disseminirte Tuberculose. An den Rändern der Zunge und an anderen Stellen der Mundhöhle, so besonders an Lippen, Wangen, dem Frenulum labiorum bereits lungenphthisischer Personen aber auch primär sieht man hirsekorn- bis stecknadelkopfgrosse, prominirende, vereinzelte oder in Gruppen stehende Knötchen, welche durch die kaum veränderte Epithelschicht graugelb hindurchschimmern. Im weiteren Verlaufe hebt sich das Epithel über den miliaren Eruptionen ab, der käsige, gelbliche Inhalt wird entfernt und zurück bleiben oberflächliche linsenförmige oder auch ausgedehntere, tiefe folliculäre, buchtige, ausgenagte Geschwüre, die mit einem graugelblichen oft fötiden dünnen Eiter bedeckt sind und öfters lebhaft oder blassrothe Granulationen in sich schliessen. Diese Geschwüre behalten während ihres ganzen Verlaufes ihren atonischen Charakter bei, vergrössern sich dadurch, dass an den Rändern immer wieder neue miliare Eruptionen aufschiessen und haben keine oder eine wenig infiltrirte Basis; auch die Lymphdrüsen werden fast nie in stärkere Mitleidenschaft gezogen.

Nicht gar selten localisirt sich die Mundtuberculose auf den Lippen und den Wangen. So sah Verfasser einigemale rhagadenförmige Geschwüre an den Mundwinkeln neben tiefen Ulcerationen der Wange und Larynxtuberculose. Sehr selten hingegen ist die Tuberculose am Zahnfleisch. Verfasser sah dieselbe bis jetzt nur im Endstadium der Lungentuberculose. Das Zahnfleisch schwillt an einer oder an mehreren Stellen unter blassrother Färbung zu einer schwammig-knolligen Masse an, welche theils von der Peripherie theils vom Centrum aus allmählich zerfällt und zu Fistelbildung, Ulceration, Lockerung und Ausfallen der Zähne Anlass gibt. Der

Fötor ist äusserst widerwärtig, das Kauen schwierig und zuweilen äusserst schmerzhaft.

Am harten Gaumen kann die Tuberculose auch als Ostitis oder Periostitis beginnen und dann erst auf die Schleimhaut übergreifen und ähnliche Zerstörungen verursachen wie die Syphilis.

In Betreff der Aetiologie sei erwähnt, dass die schon früher aufgestellte Ansicht, tuberculöse Geschwüre entständen durch Verletzungen, insoferne nicht unberechtigt ist, als ursprünglich gutartige Erosionen und Geschwüre durch Infection mit Tuberkelbacillen sich in tuberculöse umwandeln können; auch für die primäre Tuberculose der Mundrachenhöhle, des Larynx und der Nase ist es wahrscheinlich, dass die Aufnahme der Tuberkelbacillen in kleine dem Auge nicht erkennbare Verletzungen und Abschilferungen des Epithels verantwortlich gemacht werden muss.

Der Verlauf ist sehr verschieden. Während die miliare Form so gut wie niemals heilt oder Stillstand erfährt und nach Wochen oder Monaten unter anderweitigen phthisischen Erscheinungen zum Tode führt, verläuft die knotig-ulceröse Form sehr chronisch; manchmal heilen die aus ihr hervorgegangenen Geschwüre spontan oder durch Kunsthilfe mit Hinterlassung von Narben vollständig, manchmal nur theil- und zeitweise, manche bleiben stationär, bessern und verschlimmern sich abwechselnd. Meist verläuft aber auch diese Form durch spätere Mitbetheiligung der Lunge, des Gehirns, Darms, Kehlkopfes letal.

Unter den Symptomen sind die functionellen Störungen die wichtigsten. Während bei der knotigen Form die Schmerzhaftigkeit so gut wie ganz fehlen kann und nur eine gewisse Schwerbeweglichkeit der Zunge beim Sprechen und Kauen besteht, verursachen die aus miliären Eruptionen hervorgegangenen Geschwüre meist sehr beträchtliche Schmerzen, perverse Geschmacksempfindungen, Salivation, Foetor ex ore etc.

Die Diagnose der disseminirten Tuberculose ist bei dem typischen Aussehen der Geschwüre nicht schwer, zumal wenn noch andere Organe, besonders die Lungen, miterkrankt sind. Sind diese letzteren aber nebst anderen Organen frei, dann liegt eine Verwechslung mit gutartigen oberflächlichen Excoriationen oder mit traumatischen, aphthösen, herpetischen Geschwüren sehr nahe. Von den gutartigen Exfoliationen unterscheiden sich die tuberculösen durch ihren langsamen chronischen Verlauf und ihre äusserst geringe Tendenz zur Heilung, von den traumatischen durch ihr Vorkommen an Stellen, an denen eine Reibung durch Zahnkanten unmöglich ist, von den aphthösen und herpetischen durch den Mangel des rothen Entzündungshofes, hauptsächlich aber durch das Auftreten miliarer Knötchen an den Geschwürsrändern und den chronischen Verlauf.

Die Tuberkelknoten der Zunge geben am öftesten Anlass zu Verwechselungen mit Syphilis und Carcinom. Während die Gummata und die aus ihnen hervorgegangenen Substanzverluste durch Jodkali und Mercur in auffälliger Weise beeinflusst werden, zeigen die tuber-

culösen nicht die geringste Reaction; während das Zungencarcinom oft schon sehr früh mit heftigen lancinirenden Schmerzen und hochgradiger Lymphdrüsenschwellung einhergeht, sind die tuberculösen Tumoren sehr wenig oder gar nicht schmerzhaft, die Lymphadenitis ist viel geringer oder gar nicht vorhanden.

Am schwierigsten ist die Diagnose der tuberculösen Ulcerationen an den Lippen, den Wangen oder am Gaumen; sie können durch ihr schlechtes Aussehen, ihre harte, infiltrirte Basis, ihre zerfressenen Ränder, ihre übelriechende Secretion gleichfalls zu Verwechslungen mit Syphilis oder Carcinom Anlass geben, zumal wenn die Kranken keine Erscheinungen von Tuberculose in anderen Organen, speciell in dem Kehlkopf und in den Lungen darbieten. In solchen Fällen gibt einzig und allein die mikroskopische Untersuchung der Geschwürssecrete oder der exstirpirten Schleimhaut- und Geschwulsttheile, d. h. die Anwesenheit von Tuberkeln mit Riesenzellen und Bacillen den Ausschlag.

Sehr schwer ist die Diagnose der Mischformen von Syphilis und Tuberculose. Verfasser stimmt mit Nedopil darin überein, dass eine antisyphilitische Behandlung anfangs von entschiedenem Nutzen ist, im weiteren Verlaufe aber völlig wirkungslos wird und dass die Geschwüre immer mehr den tuberculösen Charakter annehmen.

Die Behandlung der Mundtuberculose muss eine allgemeine und eine locale sein. Da wir uns aber mit der Phthisiotherapie hier nicht weiter beschäftigen können, so wenden wir uns zur localen Behandlung.

Am empfehlenswerthesten erscheint die Milchsäure, welche in 20—80% Lösung energisch auf die Geschwüre eingepinselt wird und von der Verfasser einigemale sehr gute Erfolge sah. Bei localisirter Mundtuberculose empfiehlt sich ferner das Auskratzen der Knoten und Geschwüre mit dem scharfen Löffel oder die Zerstörung mit dem Thermocautère oder der Galvanokaustik. Jodoformeinstäubungen sowie desinficirende Mundwässer mit Kali chloricum, Borsäure, Carbolsäure, Thymol, Salol beseitigen am besten den unangenehmen Geruch und reinigen die Geschwüre, während Bepinselungen mit Cocain am sichersten den Schmerz coupiren. Primäre Tuberkelknoten sowie primäre tuberculöse Geschwüre müssen umsomehr möglichst bald unschädlich gemacht werden, als das Fortbestehen derselben eine permanente Gefahr für den Organismus abgibt.

Lupus befällt theils primär theils secundär besonders gerne die Lippen und setzt sich von da auf das Zahnfleisch und den harten Gaumen fort. Das Zahnfleisch erscheint aufgelockert, gewuchert, blutet leicht, die Zähne fallen aus; greift die Affection auf den weichen Gaumen über, dann entstehen Ulcerationen, durch welche das Velum zerstört, oder wenn Schrumpfung eintritt, narbig verkürzt wird. Lupus der Zunge scheint ausserordentlich selten zu sein, Butlin beschreibt nur einen von Clarke und einen von ihm selbst beobachteten Fall. Nach Kaposi sind Lupusknötchen auf der Mund-

rachenschleimhaut selten als stecknadelkopfgrosse, braunrothe, leicht blutende, derbe Prominenzen erkennbar; später confluiren sie zu grösseren Plaques mit rauher Oberfläche, mattgrauem Epithelbelag oder tiefen schmerzhaften Einrissen oder rothen, feinkörnigen, wunden Flächen; schliesslich kommt es zu narbiger Schrumpfung.

Die Diagnose stützt sich theils auf das Vorhandensein frischer Lupusknötchen, theils auf den Charakter der Geschwüre, als deren Hauptmerkmale ihre Indolenz, Schlaffheit der Ränder, üppige Granulationsbildung, geringe Schmerzhaftigkeit und Nichtreagiren auf Jod und Quecksilber gegenüber den syphilitischen angeführt werden.

Die Behandlung kann nur eine locale sein und besteht in sorgfältiger Zerstörung der Eruptionen mit Lapis in Substanz, Chromsäure, Aetzkali, Auskratzen mit dem scharfen Löffel, Galvanokaustik.

Lepra befällt am häufigsten die Lippen, Wangen und das Kinn; die Lippen werden unförmig knotig verdickt, wulstig und aufgeworfen, die Unterlippe hängt als fingerdicker Körper auf das Kinn herab, auch in der Mundhöhle bilden sich Knoten, wodurch die Zunge hypertrophirt und rissig wird.

Die Diagnose stützt sich auf das Vorhandensein anderweitiger ähnlicher Knoten und Geschwüre an den Augenbrauen, Ohrläppchen, Fingern, sowie die Anästhesie an verschiedenen Körperstellen.

Die Therapie muss dieselbe sein wie beim Lupus.

In seltenen Fällen localisiren sich auch in Folge des Genusses von Milch kranker Kühe die **Maul- und Klauenseuche** und der **Rotz** auf der Schleimhaut des Mundes und des Rachens.

Nach Bollinger schiessen bei der Maul- und Klauenseuche unter Fiebererscheinungen Kopfschmerzen, Hitze und Trockenheit im Munde, Bläschen an den Lippen und der Zunge, seltener auch am harten und weichen Gaumen auf, die sich bis zur Grösse einer Erbse entwickeln und nach einigen Tagen dunkelrothe oberflächliche Geschwüre und Erosionen zurücklassen. Schmerzen im Munde beim Kauen und Sprechen mit diffuser Röthung der Schleimhaut, ferner Schlingbeschwerden bei Mitbetheiligung des Rachens sind die gewöhnlichen Symptome. Bei Rotzinfection kommt es gleichzeitig oder nach der Eruption in der Nase zu kleineren und grösseren Knoten, welche erweichen und sich zu Ulcerationen umwandeln, die leicht bluten und übeln Geruch sowie Schwellung der Submaxillardrüsen zur Folge haben. Bekanntlich hat man in den Rotzknoten Bacillen gefunden, welche nach Weichselbaum den Tuberkelbacillen ähnlich, doch breiter sind und grössere Sporen besitzen, auch eine andere Tinctionsfähigkeit und ein anderes Verhalten der Culturen zeigen. Die Behandlung kann nur eine locale auf die Zerstörung der Bläschen und Knoten und Heilung der aus ihnen hervorgegangenen Geschwüre mittelst Glüheisen, Chlorzink, Lapis gerichtete sein, ausserdem sind stark desinficirende Mundwässer zu verordnen.

Mykosen.

Eine eigene nahezu exempte Stellung unter den Krankheiten des Mundes nehmen die Mykosen, die durch Parasiten verursachten Erkrankungen ein.

Unter ihnen ist die bekannteste der Soor, das Schwämmchen, welcher hauptsächlich bei Kindern, seltener bei Erwachsenen vorkommt, in Form von weissen Flecken und Membranen auftritt und der massenhaften Wucherung des Soorpilzes, des Oidium albicans, seine Entstehung verdankt.

Die Art und Weise, wie der Soorpilz auf den Menschen gelangt, ist verschieden, entweder geschieht die Uebertragung durch die Luft, oder während des Geburtsactes durch den Contact des Kindes mit der soorbedeckten Vagina, oder was die gewöhnlichste ist, durch Gegenstände, an welchen der Pilz haftet.

Der Soorpilz knüpft seine Existenz hauptsächlich an das Vorhandensein des Pflasterepithels, welches durch seine weichen geschichteten Lagen für seine Ansiedlung besonders geeignet erscheint; deshalb sind auch der Mund, Rachen, Aditus laryngis, Oesophagus bis hinab an die Cardia, ferner die Vulva und Vagina, sowie die Analöffnung die bevorzugten Localitäten. Auf Schleimhäuten mit Cylinderepithel nistet sich der Pilz selten ein, doch kommt er auch ausnahmsweise in der Nase, dem Kehlkopfe, Trachea und Bronchien vor.

Eine ganz hervorragende Disposition zum Soor zeigt das kindliche Alter.

Die Gründe liegen theils in den vielfachen antihygienischen Verhältnissen der Kinderstube, in der grösseren Ruhe der Mundhöhle, welche das Haften und Einnisten des Pilzes begünstigt, vor allen Dingen aber in der Ernährungsweise mit der leicht gährenden Milch, mit zuckerhaltigen Substanzen und Amylaceen. Während Brustkinder bei gehöriger Reinlichkeit auffallend wenig befallen werden, stellen die künstlich aufgepäppelten das grösste Contingent. Ein weiterer Grund liegt in der mangelhaften Pflege des Mundes, wodurch das Liegenbleiben und die saure Gährung der Ingesta förmlich grossgezogen wird. Dass das leider noch so vielfach angewendete Beruhigungsmittel, der ekelhafte mit Brod, Milch und Zucker gefüllte Lutschbeutel vulgo Schnuller, der Haupturheber und Verbreiter des Soors ist, bedarf keiner weiteren Discussion. Schwächliche Constitution der Kinder muss gleichfalls als prädisponirendes Moment bezeichnet werden, zumal kräftige Kinder nur höchst selten von der Krankheit ergriffen werden. Nicht nothwendig ist, dass die Mundschleimhaut sich in katarrhalischem Zustande befinde und so einen besseren Nährboden für den Pilz abgebe; nöthig ist nur, dass der Pilz bei seiner Invasion ein gährungsfähiges Material vorfinde, auf welchem er sich niederlassen und fortwachsen kann.

Bei Erwachsenen wird der Soor nur im Gefolge schwerer, die Blutmischung und Ernährung schädigender Krankheiten, so besonders bei Typhus, Tuberculose, Pneumonie, Diabetes mellitus, Car-

BOSTON MEDICAL LIBRARY SEP 1 1919

cinom etc. beobachtet. Die Ursachen liegen auch hier in der Aufnahme und Zersetzung leicht gährender Substanzen, in der geringeren Ergiebigkeit der Kaubewegungen und der durch das schwere Darniederliegen der Kräfte theilweise entschuldbaren weniger sorgfältigen Reinhaltung der Mundhöhle.

Bei der Leichtigkeit der Uebertragung des Soorpilzes ist es nicht zu verwundern, wenn der Soor in Kinderspitälern, Findelhäusern, Gebäranstalten massenhaft, d. h. endemisch vorkommt.

Betrachten wir die objectiven Erscheinungen des Soors bei Kindern, so manifestirt sich derselbe im allerersten Beginne durch das Auftreten kleiner hirsekorngrosser, in Gruppen oder zerstreut stehender weisslicher Punkte und Tüpfelchen auf normaler oder entzündeter Schleimhaut. Zunge, Wangen und Lippen werden stets zuerst ergriffen. Solche vereinzelte Soorflecke, die selbst bei aufmerksamster Pflege und grösster Reinlichkeit bei gesunden Brustkindern zuweilen über Nacht auftreten, machen, wenn sie baldigst entfernt werden, keine Beschwerden. Bleiben sie aber unbemerkt, dann vergrössern sich die Flecken durch Bildung neuer Eruptionen und durch Confluiren mehrerer benachbarter Herde, so dass schon nach einigen Tagen grosse Strecken, ja die ganze Schleimhaut mit einer zusammenhängenden weisslichen Masse bedeckt sein kann. Diese Soormembranen haben eine unebene körnige Fläche und bilden eine feste, zähe Masse, die durch Ingesta oder sonstige Farbstoffe eine gelbliche, bräunliche, selbst schwärzliche Farbe annimmt. Versucht man einen solchen Soorfleck zu entfernen, so gelingt es, trotz des oberflächlichen Sitzes desselben auf dem Epithel, nur schwer und unter leichter Blutung; sowohl die künstlich entfernten wie die im weiteren Verlaufe sich selbst abstossenden Membranen erneuern sich mit ausserordentlicher Schnelligkeit. Die darunterliegende Schleimhaut ist mehr oder weniger geröthet, geschwellt und empfindlich; in seltenen Fällen kommt es zu Abhebung des Epithel, zu Erosionen und Geschwüren.

Unter den subjectiven Beschwerden beherrscht der Schmerz beim Saugen und Essen die Situation. Kinder verweigern die Saugflasche, wollen die Brust nicht mehr nehmen oder lassen dieselbe unter kläglichem Wimmern sofort wieder los. Auch Erwachsene klagen über Brennen und Empfindlichkeit bei der Nahrungsaufnahme; allerdings sind dieselben mehr auf Rechnung der bereits vorher vorhanden gewesenen oder sich erst zum Soor hinzugesellenden Stomatitis zu setzen. Fehlt diese oder ist sie gering, so kann die Affection mehrere Tage unbemerkt bestehen, weshalb Mütter nie versäumen sollten, täglich die Mundhöhle ihrer Kinder genau zu untersuchen. In der Regel gesellt sich zu der localen Affection des Mundes ein Magendarmkatarrh, der theils eine zufällige schon vor dem Ausbruche des Soors vorhandene Complication bildet, theils direct durch das Verschlucken des sauern mit Pilzmasse vermischten Mundspeichels hervorgerufen wird. Durch profuse Diarrhöen wird die Aftermündung geröthet und excoriirt und ebenfalls vom Soor occupirt. Die grösste Gefahr besteht, wenn der Soor sich in den Rachen und Oesophagus

fortsetzt; in letzterem kann derselbe so massenhaft werden, dass das Lumen der Speiseröhre vollständig aufgehoben wird. Die Nahrungsaufnahme wird dann immer schwieriger, zuletzt ganz unmöglich, da alles Genossene sofort wieder regurgitirt. Greift die Pilzwucherung auf den Kehlkopf über, so entsteht Heiserkeit, unter Umständen Athemnoth; durch Aspiration von Soormassen kann Bronchitis und Fremdkörperpneumonie entstehen. Verschleppung des Soorpilzes in das Gehirn (Soorembolie) gehört zu den grössten Seltenheiten.

Die Prognose des Soor bei Kindern ist zum mindesten eine dubiöse. Selbst in den leichteren Fällen wird durch denselben das Gedeihen der Kinder für einige Zeit unterbrochen; der ohne Durchfall verlaufende Soor der Brustkinder heilt in der Regel schon nach einigen Tagen. Gesellt er sich aber zu einer schon bestehenden anderweitigen Affection, so kann dieselbe dadurch in bedenklichster Weise verschlimmert werden. Die Prognose ist im Allgemeinen um so ungünstiger, je jünger das Kind, je hochgradiger der begleitende Darmkatarrh und je ausgebreiteter die Mundaffection ist. Sehr schlecht ist die Prognose beim Uebergreifen auf Rachen und Oesophagus, Kehlkopf oder Lunge; durch Abstossung grosser zusammenhängender Soormembranen können die Beschwerden zwar plötzlich schwinden, doch liegt die Gefahr der Regeneration sehr nahe.

Der Soor der Erwachsenen muss in der Regel deshalb als eine sehr ungünstige Erscheinung betrachtet werden, weil er nur bei höchst bedenklichem Kräftezustand vorkommt; die Prognose ist relativ noch am besten bei Typhus und Pneumonie oder anderen acuten Krankheiten, schlecht bei Diabetes, Tuberculose etc.

Die Diagnose gründet sich einestheils auf die soeben geschilderten subjectiven und objectiven Erscheinungen, anderntheils auf den Nachweis des Soorpilzes.

Entfernt man mit einem geeigneten Instrumente einen Theil der weissen Flecken und Punkte, so sieht man unter dem Mikroskope ausser Epithelzellen und Schizomyceten der verschiedensten Art zahlreiche Pilzfäden, die ungleich gegliedert und mit seitlichen Aesten und Knospen versehen sind. Diese letzteren sind von den Hauptfäden durch Einkerbungen oder Scheidewände getrennt; der Hauptfaden selbst ist verschieden lang, gerade oder gekrümmt, farblos, mit scharfen, dunkeln Rändern und zeigt violette mit Körnchen erfüllte Hohlräume; das Ende der Fäden ist abgerundet, manchmal kolbenförmig angeschwollen oder mit bläschenartigen Gebilden besetzt. Ausserdem finden sich meist in der nächsten Umgebung der Fäden runde, ovale, stark lichtbrechende Fruchtkapseln, Gonidien, den Hefezellen sehr ähnlich, dunkel gerandet und einzeln oder in Colonien zusammenstehend. Eine Verwechslung des Soors mit Aphthen und Herpes ist möglich, doch schützt das Fehlen der Thallusfäden sowie der Umstand, dass aphthöse und herpetische Belege sich nicht wegwischen lassen, vor Irrthum. Bei ganz oberflächlicher Betrachtung kann ferner eine Verwechslung mit zerstreuten in der Mundhöhle zurückgebliebenen Milchflecken stattfinden. Von den früher erwähnten Follikulargeschwü-

ren unterscheidet sich Soor durch die grosse Ausbreitung, während die ersteren durch ihren stereotypen Sitz am harten Gaumen charakterisirt sind.

Die Behandlung des Soor sei hauptsächlich eine prophylaktische. Unreine, verdorbene Luft, sowie das Aufbewahren leicht gährender und schimmelnder Substanzen in den Kinderstuben muss strengstens verboten werden. Mit besonderer Strenge dringe man auf sorgfältige Reinigung der Mundhöhle, die nach jeder Nahrungsaufnahme vorgenommen werden soll. Ist der Soor einmal ausgebrochen, dann muss die Pflege des Mundes noch viel peinlicher gehandhabt werden; auch nach jedem etwa auftretenden Erbrechen muss der Mund an allen Orten, besonders an den Uebergangsfalten der Wangen mit einem in reines Wasser getauchten Leinwandlappen gesäubert und die Pilzmasse durch energischen Druck weggewischt werden. Unter den Medicamenten eignen sich besonders zu diesem Zwecke die Alkalien, Lösungen von Natron oder Kali carbon., ferner von 2—4% Borsäure, Natr. borac. 1 : 30 — 1 : 10 ohne Syrupzusatz, der die ganze Behandlung illusorich machen würde. In schweren Fällen empfiehlt sich 3% Carbolsäure, sehr verdünnte Jodtinctur, Thymol, sowie das Argent. nitr. 0·1 : 20·0 — 50·0, der Sublimat 0·1 : 100·0, mit welchem nach Reinigung der Schleimhaut mittelst kalten Wassers die Mundhöhle stündlich ausgepinselt oder gewischt wird. Der Magendarmkatarrh ist je nach dem Alter des Kindes durch Medicamente und entsprechende Diät zu bekämpfen. Bei Verdacht auf Soor im Oesophagus errege man zuerst auf reflectorischem Wege durch den Finger oder eine Federspule Erbrechen, dann durch Cupr. sulf., Ipecacuanha oder wenn das Schlucken ganz unmöglich ist, durch subcutane Injection von Apomorphin.

Tritt der in der Mundhöhle lebende sonst sehr harmlose Leptothrix buccalis in grösseren Massen auf, dann gibt derselbe zur Bildung weisser oder weissgelber, weicher, manchmal gestielter Knötchen und Flächen Anlass. Mit besonderer Vorliebe wird der Zungengrund befallen und zwar die Gegend zwischen den Papill. circumvall. und dem Kehldeckel. Meist sind auch die Tonsillen mitergriffen, weshalb man die Affection auch als Pharyngomykosis benigna (B. Fränkel) oder leptothricica (Hering) bezeichnet hat. Die Details werden bei den Mykosen des Rachens geschildert werden.

Als eine weitere hiehergehörige Affection ist die Stomatomykosis sarcinica zu erwähnen.

Friedreich fand bei vielen marantischen Processen, bei protrahirtem Typhus, Phthisis, auf der Schleimhaut des Mundes besonders der Zunge und des weichen Gaumens ausgebreitete weissliche, reifähnliche Anflüge und Beläge, welche aus zahlreichen kleinzelligen Sarcinepilzen bestanden. Spärliche Sarcinebildung im Mund und Rachen ist nach H. Fischer bei völlig Gesunden sowie an leichter Stomatitis und Pharyngitis Erkrankten sehr häufig. Besondere Beschwerden veranlasst die Affection nicht, doch kann einer Verwechs-

lung mit Soor nur durch die mikroskopische Untersuchung vorgebeugt werden.

Auch der Strahlenpilz befällt die Mundhöhle gar nicht selten (Actinomykosis).

Nach Israel begünstigen krankhafte Veränderungen der Schleimhaut mit Substanzverlusten und Geschwüren, namentlich aber cariöse Zähne, Kieferfisteln, entzündliche und ulceröse Processe des Pharynx, so namentlich auch die Krypten der Tonsillen das Eindringen des Pilzes in die Gewebsmaschen. Hacker beobachtete Actinomykose der Zungenspitze, Partsch der Wangen, Magnussen sah mehrere Fälle mit Schwellung der Zunge und des Mundbodens auf die Gegend zwischen Kehlkopf und Kieferrand übergehen und unter Fieber, Schlingbeschwerden und Ohrenschmerz den Abscess in den Rachen perforiren. Besonders häufig finden sich actinomykotische Processe im Unterkiefer central oder im Periost in der Submaxillar- und Submentalgegend.

Die Erkrankung beginnt meist langsam und torpid mit der Bildung einer harten mit normaler Haut bedeckten Geschwulst, welche mehrere Monate unverändert und kaum schmerzhaft bestehen kann; allmählich erweicht die Geschwulst und zeigt Fluctuation; ihr Inhalt ist dünnflüssig, mit Pilzkörnern vermengt; sie bricht meist nicht von selbst auf; zuweilen bleiben Fisteln zurück oder es tritt Heilung durch Schrumpfung ein oder ein Theil heilt, ein anderer schreitet weiter, auch stellt sich manchmal Kieferklemme ein. Seltener tritt die Actinomykose acut in Form einer acuten Phlegmone der Weichtheile in der Gegend der Submaxillaris auf, wie die neuerdings von Roser und Kapper mitgetheilten Fälle beweisen.

Die Prognose ist bei localisirtem Auftreten der Krankheit nicht ungünstig, wird aber infaust, je mehr und je lebenswichtigere Organe, Gehirn, Pleura, praevertebrales Bindegewebe etc. befallen werden.

Die Therapie kann nur eine chirurgische sein und muss in Eröffnung, sorgfältigster Auskratzung der Herde, Sublimatinjectionen, Tamponade mit Carbol- oder Jodoformgaze bestehen.

Von andern Parasiten, welche zuweilen in der Zunge beobachtet werden, sind zu erwähnen: Cysticercus cellulosae, Echinococcus, welche beide in der Zunge mehr oder weniger grosse blasenartige Geschwülste hervorrufen, ferner die Trichine und der Guineawurm (Filaria medinensis).

Blutungen.

Blutungen unter und auf der Schleimhaut kommen bei den verschiedensten Krankheitszuständen zur Beobachtung. Die Blutergüsse unter der Schleimhaut markiren sich als verschieden grosse, rothe oder blauschwarze Flecken, Ecchymosen, als Knoten und umfangreichere Blutsäcke. Beträchtlichere freie Blutungen sind nicht sehr häufig.

Aetiologisch kommen in Betracht hauptsächlich Verletzungen, Bisse in die Zunge und Lippen in Folge clonischer und tonischer Krämpfe, Extractionen von Zähnen, ferner Anomalien der Blutmischung. Bei Erwachsenen spielt die Hämophilie sowie die mit derselben nahe verwandte Leukämie, Pseudoleukämie, Purpura rheumatica, Scorbut, sowie Diabetes, Carcinom und anderweitige blutreiche Neubildungen eine Hauptrolle. Varicöse Venen am Zungengrunde können nach Schäffer gleichfalls zu profusen Blutungen Anlass geben. Das Auftreten von Blutungen auf der Schleimhaut der Lippen, Wangen, des Zahnfleisches, der Zunge, des Rachens bei Herzkranken spricht für die embolische Entstehung (septische oder mykotische Endocarditis); nicht selten verwandeln sich, wie bereits erwähnt, diese in der Mitte etwas farblosen Blutaustritte in oberflächliche Geschwüre resp. aphthöse Belege. Bei Kindern sind besonders Follikularverschwärungen des harten Gaumens, katarrhalische Stomatitis, Stomacace, Soor, Noma, Diphtherie, sowie Verletzungen und abnorme Spannung der Gefässe während der Keuchhustenanfälle für schwächere oder stärkere Blutungen verantwortlich zu machen. Nach Ritter und Epstein kommt bei Neugeborenen eine temporäre Disposition zu Hämorrhagien vor, welche sich durch multiple, parenchymatöse, innere und äussere Blutungen an verschiedenen Orten manifestirt und mit jeder folgenden Lebenswoche abnimmt. Wie es scheint, kommt diese Affection nur bei schwächlichen, syphilitischen, anämischen Kindern in Findelhäusern vor. Sehr profus sind die Blutungen meist bei dem Carcinom der Zunge durch Arrosion des Stammes oder namhafterer Aeste der Art. lingualis.

Die Prognose richtet sich einestheils nach der Intensität der Blutung, anderntheils nach deren Ursache; sie ist sehr ungünstig bei Hämophilie und Carcinom, weil eine Wiederholung derselben so gut wie sicher erscheint.

Die Behandlung besteht ausser in adstringirenden Mundwässern in Touchirungen mit Lapis und andern hämostatischen Mitteln, namentlich mit Liq. ferri sesquichl.; blutende Zahnalveolen müssen energisch mit Eisenchloridwatte tamponirt und dann comprimirt, Verletzungen der Zunge durch die Naht vereinigt werden; bei stärkeren arteriellen Blutungen kann das Leben nur durch Unterbindung der das betreffende Organ versorgenden Hauptarterie, so namentlich der Maxillaris oder Lingualis gerettet werden.

Neubildungen und Geschwülste.

Wenn auch Neubildungen und Geschwülste so ziemlich an allen Stellen der Mundhöhle beobachtet werden, so kommen dieselben doch erfahrungsgemäss mit Vorliebe an den Lippen, dem Zahnfleische und der Zunge vor.

An den Lippen und Wangen finden sich polypoide Degenerationen der Schleimdrüsen, Schleimcysten, besonders auf der inneren Lippenfläche und dem Frenulum der Oberlippe, ferner Angiome, Papillome und Carcinome; letztere mit Vorliebe an der Unterlippe.

Unter den Neubildungen des Zahnfleisches ist die bekannteste die Epulis. Ihrem histologischen Baue nach ist sie theils Granulationswucherung, theils Fibrom und Sarcom, theils Carcinom. Häufig sind ferner Zahncysten und Odontome.

Vom Periost der Kiefer gehen aus und ragen mehr oder weniger in die Mundhöhle hinein die Fibroide, Myxome, Enchondrome, Osteome, Sarcome und Carcinome, sowie Echinococcus- und Actinomykosegeschwülste.

Als Retentionsgeschwulst zu bezeichnen ist die von W. Roth beobachtete Verstopfung der Zungenbalgdrüsen, deren Inhalt sich zu fettigen, schmierigen Pfröpfen umwandeln und durch Zersetzung Foetor ex ore verursachen kann. Ausdrücken des Inhalts beseitigt rasch die Erscheinungen. Verkalkt der Inhalt dieser Drüsen oder der Papillae circumvall., so entstehen die sogenannten Zungensteine, welche zeitweise Schmerzen beim Kauen und Schlucken verursachen und am besten mit der Löffelsonde entfernt werden.

Am harten Gaumen kommen Neubildungen sehr selten vor und sind zu erwähnen: Angiome, Lipome, Myxome, Sarcome, Fibrome, Aneurysmen der Art. palatina, Knochencysten, die zuweilen heterotyp und heterochron entwickelte Zähne enthalten, Enchondrome, Adenome, Angiosarcome und Carcinome.

Unter den Geschwülsten der Zunge sind besonders zu nennen hypertrophische und ectatische Follikel, Schleimcysten, Angiome, Papillome, Lipome, Adenome, Fibrome, amyloide Tumoren, Lymphosarcome (Albert), Fibromyome, Enchondrome, Echinococcusblasen. Geschwülste der Zungenbasis können durch Contact mit der Epiglottis zu Fremdkörpergefühlen, Husten, Würgen und Dyspnoe Anlass geben.

Unter den bösartigen Neubildungen der Zunge verdient das Carcinom eine eingehendere Besprechung.

Da dasselbe beim männlichen Geschlecht viel häufiger ist, so hat man den Tabak und Alkohol, Butlin Aetzungen der Zunge mit Lapis etc. als besondere prädisponirende Ursachen angesehen. Dass andauernde Reizungen der Mundhöhle zu Carcinom führen, ist sicher erwiesen; entwickelt sich doch der Krebs oft genug aus Erosionen und ursprünglich gutartigen Geschwüren und deren Narben; auf die Umwandlung leukoplakischer Producte in Carcinom wurde bereits früher hingewiesen.

Die Entwicklung des Zungencarcinoms findet auf zweifache Weise statt. Es entsteht entweder ein primärer Knoten oder Infiltrat auf oder unter der Schleimhaut, die tief in die Muskulatur hineindringen und nach längerem Bestande erweichen und zerfallen, oder was viel häufiger ist, die Basis und Ränder von ursprünglich gutartigen Schrunden, Erosionen und Geschwüren induriren sich, zerfallen und nehmen immer grössere Strecken des Organs in Beschlag. Die Epithelwucherung geht in der Regel von der Schleimhaut aus und bildet wuchernde Zapfen und Epithelnester, aus welchen sich die sogenannten Epithelpfröpfe auspressen lassen; manchmal ist die Geschwürsfläche mit papillomatösen Excrescenzen besetzt. Schon sehr frühzeitig entwickeln sich sympathische Schwellungen der Drüsen am Boden der Mundhöhle, im Unterkieferwinkel und am Halse. Die Neubildung kann zwar auf die Zunge beschränkt bleiben, wuchert aber erfahrungsgemäss meistens auf den Boden der Mundhöhle, den Gaumen und gegen den Kehlkopf zu weiter.

Die subjectiven Beschwerden des Zungencarcinoms bestehen, so lange der Tumor noch nicht ulcerirt ist, in einem Gefühle von Dicke oder Schwerbeweglichkeit des Organes beim Sprechen und Essen. Schmerz kann zwar anfangs fehlen, tritt aber meist schon sehr frühzeitig auf. Ganz constant aber und ausserordentlich heftig in das Ohr, die Kiefer oder den Kehlkopf ausstrahlend ist derselbe bei erfolgtem Zerfalle. Die Sprache wird undeutlich, lallend, die Bewegung der Zunge immer schwerer, festere Substanzen zu kauen wird ängstlich vermieden. Die Speichelsecretion ist vermehrt, der Geruch aus dem Munde fötid, zuweilen stellen sich bedenkliche, das Leben gefährdende Blutungen ein. Verfall der Kräfte, kachektisches Aussehen, Verminderung des Appetits, erschwerte Aufnahme der Nahrungsmittel, Schlaflosigkeit bleiben nicht lange aus und nach 1—3 Jahren tritt das letale Ende ein oft unter hydropischen Erscheinungen oder durch metastatische Pneumonie, acute Blutung.

Hinsichtlich der Differentialdiagnose muss auf das bereits im Capitel Syphilis Gesagte hingewiesen werden.

Die Prognose des Zungencarcinoms ist sehr schlecht. Selbst bei frühzeitiger Exstirpation treten in der Regel Recidiven ein, zumal wenn nicht sehr grosse Stücke scheinbar gesunden Gewebes und die benachbarten Lymphdrüsen mit herausgenommen werden. Ist nochmalige Operation möglich, dann ist sie hier sicher angezeigt; ausserdem beschränke man sich auf Erhaltung der Kräfte, Reinigung der Mundhöhle mit Desinfecientien, Stillung profuser Blutung durch Eis, Ligatur oder Ferrum candens und hauptsächlich dreiste Gaben schmerzstillender Mittel, local Cocain.

Am Schlusse dieses Capitels seien noch erwähnt die Geschwülste am Boden der Mundhöhle; abgesehen von den äusserst seltenen Riesenzellensarcomen, wie ein solches Schindler bei einem 12jährigen Mädchen beobachtete, stellen dieselben theils Atherome und Dermoidcysten, theils Retentionsgeschwülste oder sublinguale Cysten vor.

Am bekanntesten und häufigsten ist die Ranula, die Frösch-leingeschwulst. Sie ist meist einseitig, kann aber auch doppelseitig auftreten. Sie stellt eine bald langsam bald in wenigen Tagen sich entwickelnde; verschieden grosse und verschieden geformte, blasenförmige, grauweisse, elastische, fluctuirende Geschwulst vor, welche am Boden der Mundhöhle unter der Zunge rechts oder links vom Frenulum ihren Sitz hat und sich bei weiterem Wachsthum gegen die Zungenspitze resp. zwischen Zunge und Unterkiefer hervordrängt, so dass in hochgradigen Fällen der Boden der Mundhöhle und die zwischen den Unterkieferästen befindliche Haut bis zu Faustgrösse hervorgewölbt wird. Schmerzen sind in der Regel nicht vorhanden, doch wird die Sprache undeutlich, lallend, das Kauen erschwert. Bei sehr beträchtlicher Grösse wird die Zunge an den Gaumen angedrückt und so Schlingschmerz und Athemnoth erzeugt.

Ueber das Wesen der Ranula sind die Ansichten immer noch getheilt. Während die Einen dieselbe auf eine Verstopfung des Wharton'schen Ganges oder cystenartige Degeneration der Sublingualis zurückführen, Andere in ihr ein Hygrom eines an der Aussenseite des M. genioglossus liegenden Schleimbeutels erblicken, lassen Recklinghausen und Sonnenburg dieselbe von der im vordern Theil der Zunge liegenden Blandin-Nuhn'schen Drüse ausgehen. Neumann hingegen führt, diese letztere Ansicht verwerfend, die Ranula auf eine Erweiterung der Bochdalek'schen Drüsenschläuche der Zungenwurzel zurück und stützt seine Ansicht auf das Vorkommen von Flimmerzellen auf der innern Fläche der Ranulawand und auf die Thatsache, dass Flimmerzellen in der Zunge nur in den Bochdalek'schen Drüsenschläuchen vorkommen.

Die Prognose der Ranula ist insoferne ungünstig, als dieselbe grosse Neigung zu Recidiven zeigt.

Die Behandlung muss eine operative sein. Die mildeste Methode ist das von Billroth empfohlene Durchziehen eines Seidenfadens, welcher über der Geschwulst leicht geknüpft wird. Da sich aber nach dieser Methode sowie nach einfacher Incision mit oder ohne nachfolgende Jodinjection die Geschwulst leicht wieder füllt, so suche man nach vorheriger Fixation des Tumors mittelst zweier feiner Haken durch einen breiten Schnitt den Inhalt der Geschwulst zu entleeren; dann excidire man mit der Scheere ein Stück des Balges und vereinige die Wände der Cyste mittelst einiger Nähte mit der Schleimhaut; die Nachbehandlung besteht in antiseptischen Mundwässern, die Nähte können am vierten Tage entfernt werden.

Die Behandlung der übrigen oben aufgeführten Neubildungen und Geschwülste möge man nach den in den Lehrbüchern der Chirurgie angegebenen Regeln leiten.

Nervenkrankheiten.

Zu den constantesten Begleiterscheinungen der verschiedenen Mundkrankheiten gehören die Störungen der Sensibilität, und zwar sowohl im Bereiche des Tastsinnes, als auch der Geschmacksempfindung.

Verminderung oder vollständiger Verlust der Empfindlichkeit der Mundhöhle (Anästhesie) findet sich ausser in schweren Fällen von Hysterie fast nur bei Erkrankungen des Gehirns oder bei peripheren Lähmungen des zweiten und dritten Astes des Trigeminus. Sie ist meist einseitig wie bei Herderkrankungen oder bei Hemianaestesia hysterica oder bei Mittelohreiterung in Folge von Uebergreifen der Entzündung auf den Plex. tympanicus, und erstreckt sich auf die Schleimhaut der einen Wange oder die Hälfte der Zunge und Lippen. Bei diffusen Gehirnerkrankungen sowie Rückenmarksaffectionen oder nach anhaltender Einwirkung kalter Luft kann die Anästhesie doppelseitig auftreten. Ist die Zunge mitbefallen, dann treten gleichzeitig Störungen des Geschmackes auf; so sah Verfasser einmal beträchtliche Herabsetzung des Sensibilität der linken Zungenhälfte mit verringerter und verspäteter Geschmacksempfindung neben diphtheritischer Accomodations- und Gaumensegellähmung. Bei halbseitiger totaler Anästhesie können auf der betroffenen Seite die in den Mund gebrachten Speisen weder hinsichtlich ihrer Temperatur noch ihrer physikalischen Eigenschaften unterschieden werden; ein an den Mund gesetztes Glas hinterlässt den Eindruck, als ob es abgebrochen wäre, zwischen Wange und Zahnfleisch angesammelte Speisereste bleiben unbemerkt liegen. Die Zunge erscheint auf der anästhetischen Seite dick belegt, mit Einrissen, Bissen und Geschwüren versehen, welche sich die Kranken unbewusst über die jeweilige Lage ihrer Zunge beigebracht hatten, zumal wenn auch die motorische Portion des Trigeminus miterkrankt ist.

Die Hyperästhesie und Neuralgie der Mundhöhle kann zwar als Begleiterin centraler Erkrankungen oder von Hysterie, oder als Reflexerscheinung im Gefolge anderer Neurosen, z. B. der Stenocardie, auftreten, ist aber in der Regel durch Trigeminusneuralgie bedingt. Sie erstreckt sich auf Gaumen, Wangen, Lippen, Zahnfleisch, Zunge, den Boden der Mundhöhle, die vorderen Gaumenbögen. Die Schmerzen tragen meist den neuralgischen Charakter d. h. sie treten plötzlich in Anfällen auf, verschwinden nach wenigen Minuten, um zu bestimmter Zeit wiederzukehren. Die Speichelsecretion ist in der Regel während der Anfälle vermehrt, die Zunge belegt, das Sprechen und Kauen erschwert oder unmöglich.

Auf die Zunge localisirte Schmerzen bezeichnet man als Glossodynie, Glossalgie.

Dieselbe kann anfallweise mit Schmerzpunkten auftreten, aber auch ohne solche continuirlich Tage, Wochen, Monate, sogar Jahre fortdauern. Die Aetiologie ist sehr dunkel; zuweilen finden sich vielleicht in Folge allzu energischer Reinigung der Zunge oder aus

anderen Ursachen unbedeutende Veränderungen der Schleimhaut, wie Schwellung einzelner Papillen und Follikel, Epithelabschilferungen oder Excoriationen, Risse und Schrunden; in den ganz reinen Fällen ist die Schleimhaut völlig normal. Man muss wohl in allen Fällen eine Neurose der Zungennerven, so namentlich des Trigeminus und Glossopharyngeus, auf neuropathischer Basis als Ursache annehmen. Kaposi sah Glossodynie mehr bei Weibern, die an Anämie, Chlorose, Dyspepsie, Dysmenorrhoe und Hysterie litten, Schwimmer hingegen fast nur bei Männern, die weder an Constitutionsanomalien noch an Nervosität litten; Verfasser hat gleichfalls mehr Männer als Frauen an dieser Affection behandelt; zuweilen scheint auch eine rheumatische Ursche nicht ausgeschlossen.

Der Sitz des Schmerzes ist meist in der Zungenspitze und in dem vordern Theil der Zunge, seltener an dem Zungengrunde oder an den Rändern der Zunge, so namentlich auf der Papilla foliata, die bei Berührung äusserst empfindlich erscheint, und wenn sie abnorm stark entwickelt ist, für ein Papillom und demnach auch für die Ursache der Glossodynie gehalten werden kann, wie dies in der That von Albert geschehen ist. Nicht selten ist das Herausstrecken der Zunge wegen allzugrosser Schmerzhaftigkeit unmöglich und das Sprechen und Kauen erschwert; die meisten Kranken treibt die Furcht vor dem Zungenkrebs zum Arzte.

Die Prognose der Glossodynie ist in Bezug auf rasche und völlige Heilung ungünstig, doch kann die Affection sich spontan verlieren.

Die Behandlung muss eine causale sein; bei rheumatischer Grundlage empfiehlt sich Chinin, Salicylsäure, Natr. salicylicum und das Dampf- und Schwitzbad, bei Verdauungsstörungen Soda, Magnesia, Magist. Bismuthi, Rheum, Karlsbad; bei neurasthenisch-hysterischer Basis Arsen, Bromkali, Valeriana, bei Anämie Arsen, Eisen, Franzensbad, Marienbad, sowie Seebäder. Selbst unbedeutende Schleimhautläsionen sind local zu behandeln; palliativ während der Anfälle empfiehlt sich Chloral, Morphium, Bepinselung der schmerzhaften Stellen mit 20% Cocainlösung, oder der inducirte oder galvanische Strom. In sehr hartnäckigen Fällen ist die Dehnung oder Resection der Zungennerven angezeigt.

Der Parästhesie liegen in der Regel dieselben ätiologischen Momente zu Grunde. Bald klagen die Kranken über ein Gefühl von Ameisenlaufen, Jucken, Pelzigsein in den Wangen, bald über Eingeschlafensein und Prickeln an der Zungenspitze, über Hitze und Kälte am Zahnfleische und harten Gaumen. Die Parästhesie ist sehr oft der Vorläufer oder Begleiter motorischer oder sensibler Lähmungen oder combinirt mit Glossodynie.

Häufiger als die Anomalieen des Tastsinnes sind die Störungen im Bereiche des Geschmackes.

Anästhesie der Geschmacksnerven, Anästhesia gustatoria, Ageusia, kann auf rein mechanischem Wege durch erschwerte Einwirkung der Geschmackstoffe auf die peripheren Nervenenden erzeugt

werden, so z. B. durch abnorme Trockenheit der Schleimhaut, dicken Zungenbelag, abnorm hoch oder niedrig temperirte Speisen, zweitens aber auch durch centrale und periphere Leitungsstörungen im Trigeminus, Lingualis, Chorda tympani, Facialis, Glossopharyngeus oder durch Amputation der Zunge. Das Geschmacksvermügen kann einseitig oder doppelseitig, vollständig oder theilweise für alle oder nur für einige Geschmacksempfindungen herabgesetzt oder aufgehoben sein. In den leichteren Fällen findet sich eine Verlangsamung der Geschmacksempfindung, Störungen im Bereiche des Trigeminus, Lingualis, der Chorda, wie z. B. nach Exstirpation von Ohrpolypen, sowie des Facialis beeinträchtigen hauptsächlich das Geschmacksvermögen in den vorderen Zweidrittheilen der Zunge und in der Zungenspitze und deren Rändern; Affectionen des Glossopharyngeus haben nach übereinstimmenden Beobachtungen Alienation des Geschmacksvermögens der Wurzel der Zunge, des Gaumens und der hinteren Pharynxwand zur Folge. Auffallend häufig finden sich Verlust oder Abnahme des Geschmackes mit oder ohne Verminderung des Tastgefühles bei chronischen Mittelohreiterungen (Läsion der Chorda und des Plexus tympanicus). Eine centrale Ursache darf angenommen werden, wenn Glossopharyngeus und Lingualis gleichzeitig befallen sind und Hautanästhesie besteht; auch Affectionen des hinteren Abschnittes der inneren Kapsel haben Geschmacksstörungen zur Folge. Totalexstirpation der Zunge hat, wie Thiery an einem Zungenlosen beobachtete, den Verlust der Geschmacksempfindung am harten Gaumen, Lippen, Wangen und Zahnfleisch zur Folge, während dem weichen Gaumen und den Gaumenbögen die Geschmacksfähigkeit erhalten bleibt.

Die Hyperaesthesia gustatoria ist öfters eine physiologische Erscheinung. Gleichwie es Menschen mit abnormer Sehschärfe, mit ausgeprägtestem Geruchsinn und Gehör gibt, so gibt es auch solche mit ausserordentlicher Feinheit des Geschmackes, besonders wenn der letztere von Jugend auf geschärft wird, wie man dies häufig bei Weinhändlern, Thee-, Tabak-, Kaffeeverkäufern, Gourmands findet, die im Stande sind, den Jahrgang oder die Herkunft des Weines, die Sorte des Thees, Tabaks, Spuren von Gewürzen zu bestimmen.

Die pathologische Hyperästhesie der Geschmacksnerven (Hypergeusie) kommt relativ am öftesten bei hysterischen oder nervösen Personen vor, die die geringsten Mengen von Salz oder Gewürzen schmecken, welche von Gesunden nicht mehr percipirt werden können. Verfasser beobachtete einmal einen Fall von periodischer Hypergeusie bei einem jungen, gesunden Manne, dem ganz salzfreie Speisen zeitweise ausserordentlich scharf und ungeniessbar erschienen.

Sehr häufig sind perverse Wahrnehmungen des Geschmackes, Paraesthesia gustatoria auch Allotriogeusia genannt. Sie ist ganz gewöhnlich bei fieberhaften Krankheiten, bei Affectionen des Magendarmcanals, kurz bei allen jenen Processen, bei denen die Zunge belegt und die Schleimhaut der Mundhöhle in irgend einer Weise verändert ist. Auch Kranke mit rheumatischer Facialparalyse klagen öfters über faden, säuerlichen oder bitteren Geschmack, ebenso ent-

stehen bei Kranken mit Mittelohreiterungen beim Ausspritzen, Insufflíren, Sondiren oder bei der Entfernung von Polypen theils abnorm starke theils perverse Geschmacks- und Gefühlsempfindungen auf der Zungenhälfte der befallenen Seite. Lieblingsspeisen haben in der Regel einen unangenehmen metallischen oder fauligen Geschmack. Zucker erscheint bitter, Salz süss, Kaffee schmeckt nach Cichorie, die Cigarre nach verbranntem Stroh etc. Hieher gehört auch die Vorliebe so vieler Chlorotischer, Hysterischer oder Schwangerer für ungewöhnliche, schlecht schmeckende, ja widerliche Dinge, als da sind: gebrannte Kaffeebohnen, Hanfkörner, Kalk, Zwiebeln, Asa foetida, Castoreum etc. Manche dieser Anomalien sind direct als Geschmackshallucinationen und Illusionen zu bezeichnen und als Theilerscheinungen psychischer Störungen zu betrachten.

Zur Diagnose der Geschmackstörungen bedient man sich verschiedener schmeckender Substanzen, welche in kleinen Mengen oder in Lösung mit einem Pinsel oder Glasstab auf die zu prüfenden Theile aufgetragen werden. Am besten eignet sich zur Prüfung des bitteren Geschmackes Chininlösung oder Tinct. Strychni, des sauren Salzsäure oder Essigsäure, des süssen Zuckerwasser, des salzigen Kochsalzlösung oder die Anode eines constanten Stromes.

Die Behandlung dieser verschiedenen Zustände verspricht nur Erfolg bei sorgfältiger Berücksichtigung der Aetiologie; da aber eine eingehende Besprechung dieser äusserst zahlreichen Affectionen die Grenzen dieses Buches weit überschreiten müsste, so sei hier nur auf die günstige Wirkung der Elektricität aufmerksam gemacht; in der Regel erweist sich der constante Strom wirksamer als der inducirte. Dass die durch centrale Affectionen verursachten Störungen fast stets aussichtlos sind, ist leicht einzusehen.

Als Angioneurose ist das namentlich an den Lippen, den Augenlidern, den Wangen, den Seitentheilen der Nase, ferner im Rachen und im Kehlkopfe sowie an den Extremitäten auftretende acute Oedem zu betrachten. Als Ursachen sind zu nennen Erkältungen, Traumen, operative Eingriffe in der Nase, Heredität. Ein constanter Begleiter dieser oft nur einige Stunden oder Tage aber auch Wochen anhaltenden Affection sind Verdauungsbeschwerden, namentlich Erbrechen, (Quincke, Strübing).

Die Störungen der Motilität äussern sich als Krampf und Lähmung.

Krämpfe kommen hauptsächlich in der Zunge vor; sie sind meistens Theilerscheinungen allgemeiner Nervenkrankheiten, Athetose, Chorea, Eclampsie, Epilepsie, Hysterie, und sind bald clonischer bald tonischer Natur.

Idiopathische auf die Zunge, ja sogar nur auf eine Hälfte derselben beschränkte Krämpfe sind äusserst selten und theils bei vollblütigen (Hoffmann), theils bei anämischen oder Excesse in Baccho et Venere geschwächten (Bernhardt), sowie neuropathisch belasteten Personen (Erlenmayer) oder nach Gemüthsbewegungen, einmal sogar nach Tonsillotomie (Fleury) beobachtet worden. Zu-

weilen treten sie coordinatorisch beim Sprechen, Kauen oder Clarinettblasen (Strümpell) auf, zuweilen spontan.

Beim clonischen Krampf wird die sich steif anfühlende Zunge stossweise nach vorne oder hinten gezogen oder nach verschiedenen Richtungen hin- und hergeworfen; beim tonischen Krampf wird sie gegen den harten Gaumen angedrückt gehalten; während der Anfälle ist das Sprechen, Kauen und Essen erschwert oder unmöglich.

Krämpfe der Lippen sind meist Theilerscheinungen schwerer Neurosen, so hauptsächlich der Trigeminusneuralgie, der Eclampsie, Epilepsie, Chorea oder des Tetanus.

Nicht gar selten sind Krämpfe im Orbicularis oris; sie sind bald tonische wie bei Tetanus, bald clonische wie beim mimischen Gesichtskrampf oder bei acuter und chronischer Hirnreizung; fibrilläre Zuckungen sind besonders häufig bei Bulbärparalyse und Gehirnhämorrhagien.

Relativ selten sind ferner tonische und clonische Krämpfe der Kaumuskeln. Die ersteren, auch als Trismus oder myogene Kieferklemme bezeichnet, sind meist doppelseitig.

Der Unterkiefer wird so fest an den Oberkiefer angepresst, dass weder die Zähne von einander entfernt noch die Mundhöhle geöffnet werden kann; die Muskeln sind von einer brettartigen Härte und sehr schmerzhaft. Sind alle Kaumuskeln nicht gleichmässig oder nur einseitig befallen, so kommt es zu Verschiebungen des Unterkiefers, wie in einem Falle von Leube, wo bei einseitigem Krampf der Pterygoidei der Unterkiefer auf der befallenen Seite über den Oberkiefer hervorragte.

Bei der clonischen Form wird der Unterkiefer rasch gegen den Oberkiefer geschnellt, wodurch bei verticaler Richtung des Stosses Zähneklappern, bei horizontaler Verschiebung Zähneknirschen erzeugt wird. Dass es durch diese unwillkürlichen heftigen Bewegungen zu Bissen in die Zunge, Lippen und Wangen und zu Verletzungen des Zahnfleisches und der Zähne kommen muss, ist leicht einzusehen.

Als Ursachen der Kaumuskelkrämpfe müssen Meningitis, Gehirntumoren, Epilepsie, Hysterie, Encephalitis, besonders aber die verschiedenen Formen von Tetanus, Tetanie, sowie schwere Infectionskrankheiten, Typhus, angesehen werden; sehr selten sind dieselben durch periphere Reizungen im Gebiete des Trigeminus in Folge von Affectionen des Kieferknochen, schlechten Zähnen oder auch durch Gemüthsbewegungen, Schreck, bedingt. Bei Gumma oder Myositis gummosa befindet sich nicht selten der ganze Temporalis oder Masseter im Zustande tonischer Contractur.

Die Prognose ist bei cerebraler Ursache sowie bei Tetanus äusserst ungünstig, günstig bei peripheren Ursachen.

Die Behandlung muss zuerst darauf bedacht sein, die Ursache der Krämpfe zu beseitigen, was nur theilweise möglich ist. Bei Tetanus empfehlen sich grosse Gaben von Narcoticis, besonders Morphium subcutan, Chloroforminhalationen, Nervina, warme protrahirte Bäder. Bei rheumatischer Ursache sind Schwitzcuren, Natr. salicyl.,

bei Neurasthenie und Anämie Bromkali und Eisen, bei Syphilis Mercur und Jod anzuwenden. Bei Krämpfen des Orbicul. oris und der Zunge ist ausser den genannten Mitteln die Galvanisation des N. facialis resp. hypoglossus, sowie der Medulla oblongata zu versuchen.

Ungleich wichtiger als die bisher besprochenen Neurosen sind die Lähmungen, welche die verschiedenen die Mundhöhle zusammensetzenden Organe befallen.

Die Lähmung der Lippen resp. des Orbicul. oris ist eine nahezu constante Begleiterin centraler oder peripherer Facialislähmung; sie ist in der Regel einseitig, betrifft bald nur die Oberlippe, bald nur die Unterlippe, bald beide, was bei progressiver Bulbärparalyse und amyotrophischer Lateralsclerose die Regel ist. Der völligen Lähmung geht meistens ein Gefühl von Spannung und Starrheit voraus. Die Articulation wird durch die partielle oder complete Unfähigkeit, die Lippenlaute zu bilden, undeutlich, das Pfeifen, Ausblasen eines Lichtes unmöglich, zumal wenn, wie so häufig, auch die Muskulatur der Wangen mitergriffen ist. Bei totaler Lähmung kann der Mund nicht geschlossen werden, die Speisen fallen zum Theile wieder aus dem Munde heraus und fliesst der Speichel fortwährend über Lippen und Kinn herab. Schliesslich werden die Lippen atrophisch, ihre Ränder scharf, die sie bedeckende Haut runzlig, sehr oft sind auf der gelähmten Seite fibrilläre Zuckungen bemerkbar.

Die Lähmung der Kaumuskeln ist meist centralen Ursprungs, d. h. Theilerscheinung entzündlicher, degenerativer oder neoplastischer Erkrankung des Pons, der Medulla oblongata, vorzüglich der Bulbärparalyse; relativ am häufigsten findet sie sich bei Erkrankungen der Schädelbasis, wobei die motorische Portion des Trigeminus comprimirt wird. Aeusserst selten ist sie durch periphere Compression der Nerven bedingt, dagegen ist fast constant Lähmung und Atrophie der Kaumuskeln, der einen Hälfte der Zunge und des weichen Gaumens bei Hemiatrophia facialis vorhanden.

Zu den frühesten subjectiven Erscheinungen gehört die Schwierigkeit, feste Substanzen zu kauen; die Kranken klagen meist selbst über die Kraftlosigkeit ihrer Kaumuskeln. Objectiv lässt sich eine Anenergie der Muskeln oder ein Schlaffbleiben bei Kaubewegungen constatiren. Das Kauen wird allmählich immer schwieriger, zuletzt ganz unmöglich, der Unterkiefer hängt, falls die Erkrankung doppelseitig ist, schlaff herab, die Muskeln atrophiren oder verfallen zuweilen in Contractur, öfters bestehen gleichzeitige Sensibilitätsstörungen.

In besonders deutlicher Weise äussert sich die Lähmung der Zunge.

Aetiologisch spielen Erkrankungen des Gehirns und der Medulla oblongata, so besonders Gehirntumoren, progressive Muskelatrophie, Bulbärparalyse, essentielle Kinderlähmung, amyotrophische Lateralsclerose, Apoplexie und Embolie der Gehirnarterien die Hauptrolle, während periphere Lähmungen des Hypoglossus durch Bleiintoxication, geschwellte Lymphdrüsen, Syphilis und andere Ursachen äusserst selten sind.

Ist die Lähmung einseitig, dann weicht die Spitze der herausgestreckten Zunge nach der gelähmten Seite hin ab, was darin seinen Grund hat, dass der nicht gelähmte Genioglossus der anderen Seite die Zungenspitze nach der entgegengesetzten Seite über die Unterkiefer hinauszieht, weil sein gelähmter Gegenpart keinen Widerstand entgegensetzt. In hochgradigen älteren Fällen ist Atrophie der gelähmten Zungenhälfte vorhanden.

Ist die Lähmung doppelseitig, wie dies im letzten Stadium der progressiven Bulbärparalyse oder in seltenen Fällen von Tabes der Fall ist, so kann die Zunge nicht zum Munde oft nicht einmal bis zu den Zähnen hervorgestreckt werden, sie liegt als todte atrophische Masse, hie und da noch fibrilläre Zuckungen zeigend, in der Mundhöhle. Ist die Lähmung unvollständig (Parese), dann kann die Zungenspitze nicht so weit und so schnell hervorgestreckt und so prompt nach den verschiedenen Richtungen hin gebracht werden, wie dies unter normalen Verhältnissen der Fall ist.

Die durch Glossoplegie erzeugten Störungen beziehen sich einestheils auf die Function des Kauens, anderentheils auf die Articulation der Sprache.

Während unter normalen Verhältnissen die Bissen von der Zunge zwischen die beiden Zahnreihen zum Zerkleinern geschoben und dann nach hinten in den Schlund gebracht werden, bleiben bei der Zungenlähmung die Speisen auf dem Rücken der Zunge liegen und werden, selbst wenn sie in den Pharynx gelangen, leicht wieder in die Mundhöhle zurückgeschoben, weil der Abschluss zwischen Mund- und Rachenhöhle fehlt oder unvollkommen ist. Die Störungen der Articulation beziehen sich bei einseitiger Lähmung auf undeutliche Aussprache der Zungenlaute, bei doppelseitiger Lähmung so besonders bei Bulbärparalyse ist die Sprache hochgradig lallend und nahezu unverständlich.

Die Prognose der Zungenlähmungen richtet sich nach der Ursache und dem Grade des Uebels. Bei peripherer Compression des Hypoglossus kann unter Umständen durch einen chirurgischen Eingriff, Exstirpation einer Geschwulst oder Extraction eines steckengebliebenen Geschosses oder sonstigen Fremdkörpers oder bei syphilitischer Basis durch eine antiluetische Behandlung die Lähmung behoben werden; die durch Apoplexien oder Embolien des Gehirns entstandenen Lähmungen geben insoferne eine nicht ungünstige Prognose, als sie sich mit der Zeit zurückbilden können; absolut infaust ist die Prognose bei nichtsyphilitischen Hirntumoren, encephalitischen Herden, Bulbärparalyse und bulbären Hämorrhagien.

Die Therapie der Zungen-, Lippen- und Kaumuskellähmungen besteht neben gleichzeitiger Behandlung des Grundleidens in der elektrischen Reizung des N. hypoglossus oder der Muskeln der Zunge und der Wange von der Mundhöhle aus. Bei Bulbärparalyse und der nahe verwandten progressiven Muskelatrophie und amyotr. Lateralsclerose wird man höchstens Stillstand, kaum eine Besserung oder gar Heilung erzielen, wenn auch Tommasi durch Faradisation und Benedikt durch Galvanisation des Sympathicus gute Resultate erhalten haben wollen.

Die

Krankheiten der Speicheldrüsen.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen.

Es gibt dreierlei Speicheldrüsen, die Parotis, die Glandula submaxillaris und die sublingualis.

Die grösste und wichtigste ist die paarige Ohrspeicheldrüse, die Parotis.

Sie liegt vor und unter dem Ohre in dem Winkel, welcher zwischen dem Gelenkaste des Unterkiefers, dem Warzenfortsatz und dem äusseren Gehörgange übrig gelassen wird und schiebt sich von hier über die äussere Fläche des Masseter bis zum unteren Rande des Jochbogens vor. Nach innen dringt sie bis zum Proc. styloid. ein; sie hat ein gelapptes Aussehen und besteht aus rundlichen Körnern, Acini, welche durch Bindegewebe in einen gemeinschaftlichen Körper zusammengefasst sind. Ihr Ausführungsgang Ductus Stenonianus, der sich durch die Dicke seiner Wand und die Enge seines Lumens auszeichnet, tritt am oberen Drittheile des vorderen Randes der Drüse hervor. Er entsteht durch successive Vereinigung der kleinen Ausführungsgänge der Acini, läuft mit dem Jochbogen parallel und unter ihm an der Aussenfläche des Masseter nach vorne, senkt sich am vordern Rand desselben durch das Fettlager der Backe zum Musc. buccinator herab, welchen er in seinem Mittelpunkte durchbohrt, um an der inneren Oberfläche der Backe dem ersten oder zweiten obern Mahlzahn gegenüber auszumünden. Am Lebenden erkennt man die Mündung des Speichelganges bei abgezogener Wange als ein kleines nadelstichgrosses, schwarzes Pünktchen oder längliches Grübchen, in das man eine feine Knopfsonde oder Canüle einführen kann. Manchmal ist die Mündung durch eine kleine knopfähnliche Erhabenheit verdeckt. Nicht selten liegt vor der Parotis oder auf ihrem Ausführungsgange noch eine kleinere Nebendrüse, Parotis accessoria, die ihren Ausführungsgang in den Duct. Stenon. münden lässt; rings um

die Einpflanzungsstelle des letzteren in dem Buccinator lagert eine Gruppe hanfkorngrosser acinöser Glandulae buccales.

Die Unterkieferspeicheldrüse, die Gland. submaxillaris, ist etwa um die Hälfte kleiner als die Parotis, liegt unter dem M. mylohyoideus zwischen dem hoch- und tiefliegenden Blatt der Fascia colli, in dem dreieckigen Raume, der von dem unteren Rande des Unterkiefers und den beiden Bäuchen des M. biventer begrenzt wird. Ihr Ausführungsgang, Ductus Whartonianus, längs welchem sich noch eine Reihe von Läppchen als dünner Fortsatz der Drüse hinzieht, geht über die obere Fläche des Mylohyoid. zwischen ihr und der Gland. subling. nach innen und vorne und mündet an der stumpfen Spitze einer zu beiden Seiten des Zungenbändchens befindlichen Papille (Caruncula sublingualis).

Die Unterzungenspeicheldrüse, Gland. sublingualis, ist die kleinste und liegt auf der Oberfläche des Mylohyoid., nur von der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle bedeckt, welche sie etwas hervorwölbt; ihr hinteres Ende stösst an das vordere der Gland. submaxill.; ihre feinen Ausführungsgänge, 8—12 an der Zahl, Ductus Rivini genannt, münden entweder hinter der Caruncula subling. in die Mundhöhle oder vereinigen sich nach Art der übrigen Speicheldrüsen zu einem gemeinschaftlichen Gange, dem Ductus Bartholini, welcher ebenso häufig eine besondere Endmündung der Caruncula besitzt, als er mit dem Duct. Wharton. zusammenfliesst.

Ob die im Spitzentheile der Zunge liegende Nuhn-Blandin'sche Drüse unter die Speichel- oder Schleimdrüsen zu rechnen sei, ist zur Zeit noch unentschieden.

Das von den Speicheldrüsen gelieferte Secret, der Mundspeichel, hat die Function, die Mundhöhle feucht zu erhalten, die Nahrungsmittel zu durchtränken und dadurch schluckbarer zu machen, sowie das Amylum in Dextrin und Zucker zu verwandeln. Dass die Speichelsecretion in ausserordentlicher Weise vom Nervensystem, Facialis und Sympathicus beeinflusst wird, ist bekannt, ebenso dass das Secret der Parotis Rhodankalium enthält, während das der Submaxillaris davon frei ist.

Vermehrung der Speichelsecretion, Speichelfluss.

Vermehrte Speichelsecretion (Salivation, Sialorrhoe, Ptyalismus) ist die constante Begleiterin der meisten Mundrachenaffectionen. Besonders häufig und hochgradig ist dieselbe im Kindesalter beim Durchbruch der Zähne, sowie bei Stomatitis mercurialis, Stomacace und den in dem Capitel Stomatitis exsudativa abgehandelten Processen. Auch die Untersuchung der Mundhöhle, des Rachens und des Kehlkopfes, sowie die Einverleibung pikanter Ingesta und gewisser Medicamente, so besonders des Blei, Curare, Herba Jaborandi, Pilocarpin, Jod, Kupfer, Nicotin, Physostygmin und Quecksilber haben ebenso

wie operative Eingriffe an den Zähnen, im Rachen und Kehlkopf gesteigerte Speichelsecretion, oft mit ruckweisem, strahlenförmigem Ergusse zur Folge. Ausser bei den Krankheiten der Mundhöhle findet sich Salivation besonders häufig bei acuten und chronischen Magendarm- und Uterinaffectionen, selbst schon bei Dyspepsie und Uebligkeit; auch die Anwesenheit von Entozoen im Darmcanale kann auf reflectorischem Wege Salivation zur Folge haben, ebenso Mittelohrkatarrhe, Anomalien der Blutmischung, Anämie, Chlorose, Schwangerschaft, Tuberculose. Am merkwürdigsten ist die Salivation bei hysterischen oder sonst nervösen Personen weiblichen und männlichen Geschlechts oder in Folge von Gemüthsbewegungen, Gesichts-, Zahn- oder Ohrschmerz; sie bestätigt die Thatsache, dass die Speichelsecretion in hohem Grade vom Nervensystem, speciell von der Reizung des Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus und Sympathicus abhängig ist. Ob die bei diphtheritischer Schlundlähmung sowie bei manchen chronischen Gehirnkrankheiten, so besonders der Bulbärparalyse, der Paralysis agitans und der Mikrocephalie vorkommende Salivation (paralytischer Speichelfluss) nervöser Natur ist und wirklich auf vermehrter Secretion beruht oder nur auf behindertem Abfluss, ist noch nicht endgiltig entschieden, doch spricht die meistens ausserordentliche Zähigkeit des Speichels mehr für eine Secretionsanomalie.

Der Ausbruch der Salivation ist öfters von einem unangenehmen, ziehenden, spannenden Gefühle in der Gegend der Parotis und des Unterkieferwinkels, nie von eigentlichen Schmerzen, wohl aber oft von einem faden metallischen Geschmacke begleitet. Die Quantität des ergossenen Speichels ist oft eine ungeheure und schwankt zwischen 1—5 Litern im Tag. Es ist natürlich, dass die Mundhöhle solche Quantitäten nicht zu verarbeiten im Stande ist; ein Theil derselben wird verschluckt und kann namentlich bei Kindern Magendarmkatarrhe, Diarrhöen erzeugen, ein anderer Theil fliesst aus dem Munde ab und nöthigt die Kranken zu beständigem Ausspucken und Vorhalten des Taschentuches mit Störung der Nachtruhe, Husten etc. Bei der grossen Sensibilität der Haut, namentlich bei Kindern, entwickelt sich Röthung und Erosion des Halses und des Kinnes, ebenso kann nach Vogel durch die anhaltende Durchnässung der Kleidungsstücke und die dadurch bedingte Abkühlung des Thorax Bronchialkatarrh entstehen.

Eine Folge der vermehrten Ausscheidung des Speichels ist die verminderte Ausscheidung des Harns, sowie die abnorme Trockenheit der Fäces, zuweilen kommt es zu Abmagerung, welche wohl auf Rechnung des Appetitmangels in Folge der Verdünnung des Magensaftes und der beschränkten Verdauung der Amylaceen zu setzen ist.

Die Farbe des Speichels ist fast immer durch Beimengung von Epithelien trübe und opalisirend; bald ist er mehr zähe und fadenziehend, bald dünn und wässerig; bei Stomatitis hat er einen faden, ja üblen Geruch.

Das specifische Gewicht des Speichels ist im Anfange sehr beträchtlich (bis zu 1059) erhöht, sinkt aber allmälig immer mehr

unter die Norm und beträgt oft nur 1001. Seine Reaction ist verschieden, bald normal, bald alkalisch oder sauer, selbst neutral. Der Gehalt an Rhodankalium ist meist beträchtlich vermindert; bei Mercurialptyalismus lässt sich nach Bamberger auf galvanischem Wege Quecksilber nachweisen.

Die Dauer der Affection ist sehr verschieden und schwankt von wenigen Minuten, Stunden und Tagen bis zu mehreren Monaten, selbst Jahren, je nach der Grundkrankheit. Der nervöse Ptyalismus ist sehr oft intermittirend, d. h. er tritt in grösseren und kleineren Intervallen auf.

Die Prognose ist in der Regel günstig, wenn auch, wie bereits erwähnt, bei sehr langer Dauer desselben Ernährungsstörungen beobachtet werden. Die Heilung erfolgt selten plötzlich, fast immer allmälig.

Die Therapie der Salivation kann nur selten, so namentlich bei der durch Mercur oder Jod etc. verursachten eine prophylaktische sein; dass man mit der Darreichung des immer noch als Laxans so sehr beliebten Calomel im Verlaufe acuter Krankheiten vorsichtig sein muss, wurde bereits gelegentlich der Besprechung der Stomacace und der Noma erwähnt. Selbstverständlich muss bei den ersten Symptomen der Salivation das betreffende Medicament sofort und vollständig ausgesetzt werden. Krankheiten des Mundes, des Magendarmcanals, der Genitalien, des Rachens und der Nase sind in entsprechender Weise zu behandeln, schlechte Zähne zu extrahiren. Schwierig ist die Behandlung jener Fälle, bei denen sich die Ursache nicht nachweisen lässt. Zuweilen gelingt es durch Anregung der Secretion der Haut, des Darmes oder der Nieren, durch Douchen, Dampfbäder, Frottirungen und sonstige Hautreize, durch milde Laxantia, sowie durch reichliches Wassertrinken Besserung zu erzielen.

Am hartnäckigsten ist der nervöse Ptyalismus, sowie jener der Schwangeren; noch am ehesten weicht derselbe dem Opium, Chloral, Morphium, Bromkalium, dem Arsenik oder der Tinct. Valer. Andere haben von Atropin, Plumb. acet. und Jodkali, sowie subcutaner Injection von Cocain oder Pilocarpin 0·005—0·02 (innerlich und subcutan) Erfolge gesehen.

Local, besonders bei gleichzeitiger Entzündung der Mundschleimhaut, empfehlen sich adstringirende Mundwässer.

Dass auch auf passende Ernährung, namentlich auf möglichste Beschränkung der Amylaceen Rücksicht zu nehmen, ist natürlich.

Verminderung der Speichelsecretion.

Sie tritt auf nach Einverleibung gewisser Gifte, so namentlich von Atropin, Cicutin, Daturin, Jodäthylstrychnin und Nicotin in Folge der Lähmung der speichelsecernirenden Nerven; auch Arsenik, Alkalien

und diluirte Säuren sowie das Cocain sollen eine Abnahme der Speichelsecretion zur Folge haben. Bei Facialislähmung wird zuweilen eine Verminderung der Speichelsecretion auf der gelähmten Seite beobachtet, ebenso bei Sympathicuslähmung. Verringerung, selbst völlige Sistirung der Speichelsecretion beobachtet man ferner bei Verschluss der Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, bei hohem Fieber, bei vermehrter Diurese (Diabetes mellitus und insipidus, Schrumpfniere), bei gesteigerter Diaphorese und profusen Diarrhöen (Cholera). Auch bei Hypochondern und Hysterischen sowie im höheren Alter beobachtet man nicht selten in Folge von Verminderung der Speichelsecretion äusserst lästige Trockenheit der Mundrachenhöhle; man wird umsoweniger fehlgehen, die senile Speichelverminderung auf Atrophie der Speicheldrüsen zurückzuführen, als alle Versuche, die Speichelsecretion auf reflectorischem Wege durch Kauen reizender Mittel, Rheum, Tinct. Spilanthis, Tinct. Pyrethri etc. anzuregen, sich völlig nutzlos erweisen.

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache; bei fieberhaften Krankheiten ist häufige Befeuchtung der Mundhöhle mit säuerlichen Getränken angezeigt, bei den übrigen Formen versuche man die Secretion auf reflectorischem Wege durch Bittermittel etc. anzuregen; auch der constante Strom und Pilocarpin 0·005—0·02 innerlich werden empfohlen.

Parotitis epidemica.

Unter den Speicheldrüsen wird unstreitig die Parotis am häufigsten von Entzündungsprocessen befallen.

Die Parotitis kann eine primäre oder idiopathische und eine secundäre oder metastatische sein. Die letztere Form wird auch, da sie häufig mit Eiterung einhergeht, Parotitis suppurativa genannt.

In der Aetiologie der primären idiopathischen Parotitis spielen Affectionen der Mundhöhle, Verletzungen, Fremdkörper und Concretionen des Duct. Stęnon., sowie Entzündungsprocesse der Nachbarschaft, Erkältungen und Intoxicationen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Noch am ehesten können Kiefercaries sowie Mittelohreiterungen mit Uebergehung des äusseren Gehörganges durch die Fissura Glasseri Parotitis und Pharyngitis zur Folge haben. Die idiopathische Parotitis ist meistens eine Infectionskrankheit und tritt demgemäss auch meist epidemisch auf. Wenn wir auch zur Zeit über die Beschaffenheit des Giftes noch im Unklaren sind, so lassen sich doch die verschiedenen Symptome nur aus der Annahme einer Infection erklären. Die Parotitis epidemica ist eine rein contagiöse Erkrankung, welche nur durch Vermittelung des specifischen, von einem Parotiskranken herstammenden Giftes mikroparasitischer Natur, meist durch directen Verkehr, aber auch durch dritte gesunde Personen verbreitet wird. Ob der Infectionsstoff zuerst ins Blut oder

von der Mundhöhle aus durch den Ausführungsgang in die Drüse gelangt, ist noch unentschieden. Die Parotitis epidemica ist keine locale Infectionskrankheit, sondern eine infectiöse Allgemeinerkrankung mit primärer Localisation in den Speicheldrüsen. Sie befällt mit Vorliebe Kinder vom 2.—15. Lebensjahre, doch ist auch das Jünglingsalter noch ziemlich stark betheiligt und bleibt auch das Mannesalter nicht verschont, während das Säuglings- und Greisenalter eine auffallende Immunität zeigt; das männliche Geschlecht prädisponirt ganz besonders, auch kommt die Krankheit zur kälteren Jahreszeit, namentlich im Herbst und Frühjahr häufiger vor. Sie beschränkt sich manchmal auf die Wohnung einer Familie, auf eine Erziehungsanstalt, ein Waisenhaus, ein Cadettencorps, eine Kaserne, einen Krankensaal, verbreitet sich aber auch auf alle Stockwerke eines Hauses, auf ein ganzes Dorf, eine Stadt, eine Provinz. Die Ausbreitung der Krankheit geht in der Regel langsam von statten, doch besitzt das Gift eine ausserordentliche und wie es scheint auch durch hohe Hitzegrade nicht zu vernichtende Tenacität. Die Dauer der Incubation schwankt nach den Angaben der verschiedenen Autoren zwischen 3—22 Tagen. Roth fixirte auf Grund einiger sehr beweiskräftiger Beobachtungen neuerdings die Incubationszeit auf 18 Tage, Lühe auf 20—22 Tage.

Das anatomische Substrat der epidemischen Parotitis bildet einestheils der Katarrh der Speicheldrüsengänge und fluxionäre Hyperämie der Drüsenzellen, anderntheils die Schwellung des interacinösen und periglandulären Bindegewebes. Von Manchen, wie z. B. Gerhardt, Lebert, wird die Bezeichnung Periparotitis für passender erachtet, zumal die Function der Drüse während der Entzündung nicht wesentlich gehemmt ist.

Die Krankheit beginnt mit einem zuweilen deutlichen, zuweilen wenig ausgesprochenen Prodromalstadium, mit Allgemeinerscheinungen, Schüttelfrost, leichtem Frieren, Müdigkeit, Appetitmangel, Schlaflosigkeit, sowie mit flüchtigen Stichen vor dem Ohre, oder einem Gefühle von Spannung beim Oeffnen des Mundes. Nach 2—3 Tagen, zuweilen schon früher, treten die Erscheinungen von Seite der Parotis mehr in den Vordergrund; das Oeffnen des Mundes sowie das Kauen ist schmerzhaft, die Gegend vor und unter .dem Ohre oder der Raum zwischen dem Unterkieferwinkel und Proc. mastoideus ist geschwellt; die Schwellung erstreckt sich allmählich nach allen Richtungen hin, so dass das Ohrläppchen und die Ohrmuschel nach aussen gedrängt und abgehoben, die Gegend vor dem äusseren Gehörgang und am Proc. zygomaticus vorgewölbt erscheint; meist setzt sich die Schwellung auf die Wange und Lippe sowie die obere seitliche Halsgegend einerseits und die Augenlider und Orbita andererseits fort und erzeugt eine komische Verbreiterung und Entstellung des Gesichtes, welcher Umstand der Krankheit die Bezeichnung Tölpel, Bauernwetzel, Ziegenpeter, Mumps eintrug. Bald tritt die Affection halbseitig auf, bald doppelseitig. An der Schwellung der Parotis betheiligen sich noch anderweitige Drüsen, in erster Linie die Submaxillaris und Sublingualis, welche zuweilen allein oder wenigstens früher und stärker befallen

werden als die Parotis; ferner schwellen die Cervical-, Jugular- und Axillarlymphdrüsen sowie die Milz, worauf Gerhardt zuerst aufmerksam machte.

Bleibt auch meist die Schwellung der Parotis in Folge des Widerstandes der Fascia colli prof. und buccopharyngea eine oberflächliche, so kann dieselbe doch auch in die Tiefe dringend die seitliche Rachenwand und den Isthmus faucium mehr oder weniger bei Seite schieben, wodurch Schlingbeschwerden, anginöse Sprache, sogar Heiserkeit und Dyspnoe entstehen. Die Schlingbeschwerden sind theils bedingt durch directen Druck auf den Pharynx und die Zungenwurzel, theils durch die behinderte Function der Halsmuskeln in Folge des Druckes der vergrösserten Submaxillar- und Lymphdrüsen, oder durch die zuweilen sehr stark ausgebildete Stomatitis und Pharyngitis. Die Kranken vermeiden ängstlich das Oeffnen des Mundes sowie das Kauen, halten den Kopf gerade und steif, klagen über Stechen, Sausen und Schwerhörigkeit. Kinder sind unruhig, missmuthig, apathisch, greifen beständig in die Gegend des Ohres, haben keinen Appetit und Schlaf. Die Haut über der Geschwulst ist gespannt, blass oder geröthet, ödematös und glänzend. Constant ist Fieber vorhanden, das zuweilen kaum bemerkbar, zuweilen deutlich ausgesprochen ist. Der Typus desselben ist ziemlich unregelmässig, doch sind meist abendliche Exacerbationen und Morgenremissionen zu constatiren. Das Fieber hält sich zuweilen oft mehrere Tage in der Höhe von 39·5—40·0 und kann sogar in seltenen Fällen den Charakter des typhösen mit Apathie, Delirium, Somnolenz annehmen.

Ausser den Lymphdrüsen und der Milz betheiligen sich auffallenderweise besonders gerne die Genitalorgane. Die männlichen sind besonders bevorzugt, namentlich zur Zeit der Pubertät, dagegen selten afficirt bei Knaben oder Greisen. Die Orchitis parotidea befällt häufig nur einen und dann hauptsächlich den rechten, seltener beide Hoden; bald ist der Hoden allein ergriffen, bald der Nebenhode, bald beide, auch gesellt sich zuweilen acutes Oedem der Scrotalhaut und Hydrocele hinzu. Das Auftreten dieser Complication kündigt sich in der Regel durch erneutes oder erhöhtes Fieber sowie durch ziehende und drückende Schmerzen im Hodensacke, der Leistengegend, den Oberschenkeln an. Meist geht die Orchitis in Zertheilung über, zuweilen bleibt Atrophie des Hodens mit Impotenz zurück, ab und zu gesellt sich zu ihr eine Entzündung des Samenstranges und Cystitis und Urethralblennorrhoe.

Bei dem weiblichen Geschlecht, zuweilen auch beim männlichen beobachtet man Schwellung der Brustdrüsen, ferner Entzündungen der Vulva, der Vagina, der Eierstöcke mit mehr oder weniger beträchtlichen Schmerzen.

Ueber die Bedeutung dieser Complicationen war man von jeher getheilter Meinung. Während die Einen in denselben Metastasen erblicken, halten die Andern dieselben für secundäre Localisationen des specifischen Giftes der Parotitis, wie bei Masern die Bronchitis, bei Scharlach die Rachen-, Nieren- und Gelenkaffection. Dass zwischen

der Parotis und den Geschlechtstheilen ein Zusammenhang besteht, der sich allerdings noch nicht befriedigend erklären lässt, ergibt sich sowohl aus dem namentlich von Kocher beobachteten gehäuften Vorkommen von Hodenentzündungen ohne Erkrankung der Parotis im Verlaufe von Mumpsepidemien, als auch aus dem in der neuern Zeit, hauptsächlich von Möricke und amerikanischen Aerzten mehrfach constatirten Auftreten der Parotitis nach Ovariotomien, Hysterotomien und andern Operationen an den weiblichen Geschlechtstheilen.

v. Preuschen verweist auf einige Thierversuche von Paulow, der fand, dass die Eröffnung der Leibeshöhle und das Hervorziehen der Darmschlingen mehrere Male eine Verminderung selbst Sistirung der Speichelsecretion zur Folge hatte und meint, die verminderte Speichelsecretion einestheils, die durch absolute Diät nach der Operation bedingte Ruhe und Trockenheit der Mundhöhle anderntheils begünstigten wahrscheinlich das Hineingerathen von Entzündungserregern in den Ausführungsgang der Parotis. Bumm, der die bisher publicirten 17 Fälle um einen neuen vermehrte, fand sowohl in der Mundhöhle wie in dem vereiterten Drüsengewebe den Streptococcus aureus und erklärt das relativ häufige Vorkommen von Parotitis nach Ovariotomie ebenfalls aus einem noch nicht näher erforschten sympathischen Zusammenhang zwischen Genitalorganen und Parotis. Das Manipuliren am Darm und Peritoneum könne kaum den erwähnten Einfluss haben, es müssten sonst auch bei andern Bauchoperationen, Herniotomien, sowie Verletzungen des Bauchfells, Parotitis doch häufiger vorkommen; auch von einem pyämischen Charakter der Parotitis könne keine Rede sein.

Die Parotitis der Ovariotomirten ist bald einseitig bald doppelseitig, bald auf derselben Seite, wo das Ovarium entfernt wurde, bald auf der entgegengesetzten. Sie hat eine grosse Neigung, phlegmonös zu werden und kann so eine lebensgefährliche Complication abgeben.

Ueber Complicationen der Parotitis simplex mit Affectionen des Gehirns, Meningitis, Hemiplegie, Aphasie, Sprachfehlern, Anästhesie, liegen aus der neuern Zeit so besonders von Lannois und Lemoine beglaubigte Beobachtungen vor.

Die Dauer der Krankheit ist je nach dem Charakter der Epidemie sehr verschieden. Leichte Fälle gehen meist schon nach 3 bis 5 Tagen in Zertheilung über, schwerere besonders solche mit Tendenz zur Abscedirung oder mit Complicationen in den Geschlechtsorganen dauern meist 2—4 Wochen; noch langwieriger wird der Verlauf, wenn wie wiederholt beobachtet wurde, Recidive eintritt; sie erfolgt dann meist 8—14 Tage, seltener, wie in einem von Gerhardt mitgetheilten Falle, 19 Tage nach völliger Rückbildung der ersten Attaque.

Die Prognose der epidemischen Form ist günstig, indem die Affection fast stets mit Zertheilung endet und nur ausnahmsweise in Abscedirung übergeht; bei bösartigen Epidemien kann immerhin durch die Höhe des Fiebers, Behinderung der Respiration und umfangreiche Drüsenvereiterung, Entzündung des Halszellgewebes und andere Com-

plicationen das Leben in Gefahr kommen; auch sah man wiederholt acute Nephritis, Hämaturie auftreten, sowie Lähmung der Facialis, Sehstörungen, hochgradige Schwerhörigkeit und unheilbare Taubheit zurückbleiben, die nach Kipp in Embolien des Labyrinthes oder der Schnecke ihren Grund haben soll.

Die Diagnose ist bei Berücksichtigung der subjectiven und objectiven Erscheinungen, wenn es bereits zur Entstellung des Gesichtes gekommen, ausserordentlich leicht, zumal Verwechselungen mit Schwellung der Halslymphdrüsen nur bei völliger Unkenntniss der Anatomie möglich sind; schwieriger ist die Diagnose, wenn die Affection nicht die Parotis sondern die Submaxillaris oder Sublingualis befällt, doch führt die bald sich anschliessende Mitbetheiligung der Parotis sowie die vorausgegangene oder gleichzeitige Erkrankung eines oder mehrerer Familienmitglieder, das Herrschen einer Epidemie, auf die richtige Spur.

Die Behandlung kann in leichten Fällen eine exspectative sein; in schwereren Fällen, besonders bei hohem Fieber, gebe man Antifebrin, Chinin, Natr. salicyl., sorge für offenen Stuhl, aber nicht mittelst Calomel, sondern mittelst Natr. sulfur., Rheum, Ol. Ricini. Einige wollen von Brechmitteln im Beginne der Krankheit wesentliche Erleichterung gesehen haben; Andere erblicken in dem Pilocarpin insoferne ein Specificum, als schon nach 3 Stunden, selbst in schweren Fällen, Fieber und Geschwulst auffallend zurückgehen sollen. Local empfehlen sich Einreibungen mit Fett, Olivenöl oder Vaselin, sowie Bedecken mit Watte. Bei zögernder Rückbildung oder Induration empfehlen sich Bepinselungen mit Jodtinctur oder Jodoformcollodium 1 : 15. Die Orchitis behandle man mit passender Lagerung und kalten Umschlägen oder Eisbeutel. Bei Erkrankung der weiblichen Genitalien sind lauwarme Einspritzungen, warme Umschläge und Sitzbäder indicirt. Bei Dysphagie setze man Blutegel und lasse Eis gurgeln oder scarificire die ödematösen Stellen. Abscesse müssen gezeitigt und bald eröffnet werden. Bei zögernder Rückbildung resp. chronischer Hyperplasie empfiehlt sich die Massage sowie das Ansetzen von Blutegeln.

Parotitis suppurativa.

Eine ungleich schwerere Erkrankung ist die suppurative oder metastatische Parotitis.

Sie schliesst sich meist an Infectionskrankheiten, so namentlich Abdominal- — exanthematischen — oder Rückfalltyphus, sowie an Scharlach an, wird aber auch zuweilen bei Masern, Variola, Puerperalfieber, Erysipel, Pyämie, Pneumonie, Cholera, Tuberkulose und Carcinose sowie bei Ovariotomirten angetroffen.

Ueber die Ursache der typhösen Parotitis waren die Ansichten früher sehr getheilt. Während die Einen dieselbe durch Eindringen von Entzündungserregern in den Duct. Stenon. von der entzündeten

und mangelhaft gereinigten Mundhöhle aus entstehen liessen, hielten Andere, wie Hoffmann, die durch die Temperatursteigerung erzeugte parenchymatöse Degeneration des Drüsengewebes für die Ursache. Neuestens kam Dunin zu dem Resultate, dass die eiterigen Entzündungen im Verlaufe des Typhus, also auch die Parotitis, nicht durch specifische Typhusbacillen sondern durch Eitermikrococcen bedingt sind. Diese letzteren kommen durch das Blut in die Speicheldrüsen; in das Blut gelangen sie aber vom Darme aus, und zwar zu der Zeit, in welcher sich die Schorfe im Darme abstossen.

Die subjectiven Erscheinungen der secundären meist suppurirenden Parotitis sind im Anfange mit denen der idiopathischen identisch. Bei dem meist schweren Darniederliegen der Kranken und der oft gestörten Gehirnfunction sind die Klagen über Schmerzen im Ohre oder beim Oeffnen des Mundes etc. nicht sehr ausgesprochen. Die Schwellung ist meist sehr beträchtlich, mit der Bildung des Eiters röthet sich die Haut, es zeigt sich Fluctuation und die Reifung ist meist in wenigen Tagen, in protrahirten Fällen aber erst nach Wochen vollendet. Meist macht sich eine nicht unbeträchtliche Temperaturerhöhung bemerkbar. Der Zerfall localisirt sich nicht nur auf die Parotis, sondern schreitet auf die Nachbarschaft weiter und führt zu Venenthrombose, Vereiterung der Kaumuskeln und Caries der Gesichts- und Schädelknochen, zu Gangrän, Pyämie oder Meningitis. Der Durchbruch des Eiters erfolgt entweder nach dem äussern Gehörgang zu oder durch die Haut über der Parotis; sehr grosse Gefahr besteht auch bei Senkung des Eiters zwischen die Blätter der Halsfascie. Läsion des Facialis hat öfters Lähmung einzelner Gesichtsmuskeln zur Folge.

Die Parotitis suppurativa tritt meist erst in der dritten oder vierten Woche und fast nur bei sehr schweren Typhen auf und muss als eine sehr schlimme Complication betrachtet werden, weil sie durch neues Fieber dem Kräfteverfall Vorschub leistet oder direct durch Pyämie das Leben bedroht.

Die Prognose ist um so ungünstiger, je frühzeitiger die Affection im Verlaufe der obengenannten Krankheiten auftritt und je geschwächter das befallene Individuum ist; immerhin ist ein glücklicher Ausgang nicht ausgeschlossen.

Als eine höchst merkwürdige Erscheinung muss die nach Heilung mancher Parotisabscesse zurückbleibende Ephidrosis parotidea bezeichnet werden. Ueber der Haut der Parotis wird beim Kauen eine klare Flüssigkeit ausgeschwitzt, während in der Ruhezeit zwischen den Mahlzeiten nichts zu bemerken ist.

Die Behandlung hat sich, wenn es nicht gelingt, die Entzündung durch Antiphlogose niederzuhalten, die möglichst frühzeitige Entfernung des Eiters zur Hauptaufgabe zu stellen. Da zuweilen die Duct. Stenon. verlegt sind, so empfiehlt es sich, durch Einführen von Canülen sowie durch Druck auf die Parotis und Ausstreichen der Ausführungsgänge allenfallsige Hindernisse zu beseitigen und den Eiter zu entleeren. Gelingt dies nicht, so schreite man nach vor-

heriger Cataplasmirung zur Eröffnung mit dem Messer; der Schnitt soll entweder ausserhalb des Bereiches der Blutgefässe und des N. facialis gelegt werden, oder wenn nöthig parallel mit denselben gehen und die Fascia parotidea durchdringen; antiseptischer Verband sowie Drainage ist unbedingt nöthig. Dass bei heruntergekommenen Kranken auf roborirende Diät, Alcoholica und Chinin ein Hauptaugenmerk zu richten ist, ist selbstverständlich.

Sialodochitis.

Ganz ähnliche Erscheinungen wie die Parotitis macht die Verstopfung ihres Ausführungsganges durch chronische fibrinös-eitrige Entzündung desselben (Sialodochitis fibrinosa chronica Stenoniana). Kussmaul beobachtete eine periodisch gewöhnlich beim Essen auftretende, mit beträchtlichen Schmerzen einhergehende Schwellung der Parotis mit Röthung der Haut. Bei Druck entleerte sich ein länglicher, fadenförmiger, fibrinöser Pfropf, dann folgte Speichel nach, worauf die Geschwulst abnahm und der Schmerz verschwand. Es kann in solchen Fällen weniger von einer Entzündung als von Fluxion und Oedem der Drüse und ihrer Nachbarschaft die Rede sein.

Denselben Process mit demselben Verlaufe beobachtete Ipscher in der Submaxillaris resp. dem Duct. Warthon. (Sialodochitis fibrinosa Warthon). Bei Druck auf die geschwellte rechte Unterkiefergegend entleerte sich ebenfalls ein fibrinöser Pfropf und eine ansehnliche Quantität Speichel, worauf Schwellung und Schmerz sofort verschwanden.

Erkrankungen der Submaxillaris und Sublingualis.

Dieselben Krankheiten, welche die Parotis treffen, spielen sich auch in den andern Speicheldrüsen ab. Am häufigsten geben entzündliche, namentlich ulceröse Processe der Mundrachenhöhle sowie maligne Neubildungen zu sympathischen Schwellungen Anlass.

Primär erkrankt ziemlich häufig die Submaxillaris entweder allein oder in Verbindung mit der Parotis. Selbstständige Affectionen der Submaxillaris oder Sublingualis ohne Mitbetheiligung der Parotis während des Verlaufes von Mumpsepidemieen wurden wiederholt unter Andern von Penzoldt und Soltmann beobachtet; auch Henoch erwähnt einen solchen Fall bei einem Erwachsenen, dem im Verlaufe der Erkrankung der rechte Hoden anschwoll. Acute Infectionskrankheiten, namentlich Scharlach, Diphtherie, Typhus, phlegmonöse Angina, ulceröse Stomatitis, Periostitis des Unterkiefers, Scrophulose, Tuberculose führen nicht selten zu suppurativer Entzündung. Auch die Syphilis spielt eine Rolle; abgesehen von der

häufigen indolenten Schwellung bei Primäraffecten der Mundrachenhöhle sind gummöse Geschwülste mit oder ohne Zerfall in der Parotis, Submaxillaris und Sublingualis sicher constatirt.

Bei der phlegmonösen Form entsteht in der Regel einseitig, selten doppelseitig, an dem innern untern Rande des Unterkiefers mit oder ohne Fieber unter Schmerz und Spannung sowie Unmöglichkeit, den Mund weit zu öffnen und zu kauen, eine pralle, derbe Geschwulst, welche bald langsam bald schnell sowohl nach hinten gegen das Ohr als auch gegen das Kinn zu sich vergrössert. Betrifft die Entzündung die Sublingualis, so entwickelt sich die Geschwulst in der Mitte zwischen den Unterkieferästen und wölbt die Haut unter und hinter dem Kinne vor sich her. Zuweilen erfolgt der Durchbruch des Eiters nach der Mundhöhle zu spontan und unerwartet; meist jedoch wird die Haut über der Geschwulst mit der letzteren verlöthet, sie röthet sich und zeigt Fluctuation; nicht selten erfolgt Perforation gleichzeitig nach innen und nach aussen, der entleerte Eiter ist sehr übelriechend und mit Fibrin- und Gewebsfetzen untermischt.

Die Diagnose ist bei Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse nicht schwer; nehmen, wie dies öfters vorkommt, die benachbarten Lymphdrüsen an der Entzündung theil, so ist es oft unmöglich, zu bestimmen, von wo die Krankheit ihren Ausgang nahm. Schliesslich ist auch nicht zu vergessen, dass die Actinomykose unter dem Bilde einer acuten Phlegmone der Submaxillargegend auftreten kann.

Die Behandlung muss im Anfange bestrebt sein, durch resorbirende Mittel, Einpinselungen von Jod und Jodoformcollodium oder Einreibung von Ung. ciner., feuchtwarme Umschläge, die Geschwulst zurückzubilden. Gelingt dies nicht, so schreite man zur Cataplasmirung; zeigt sich Fluctuation, so incidire man sofort und schaffe dem Eiter durch Einlegen von Drainröhren Abfluss. Bei Perforation in die Mundhöhle verordne man desinficirende Mundwässer.

Angina Ludovici.

Mit diesem Namen oder als Cynanche cellularis maligna bezeichnet man eine entzündliche Infiltration des Mundbodens und der obern seitlichen oder mittleren Halsgegend, welche von einer Entzündung der Submaxillaris und des dieselbe umgebenden Bindegewebes ihren Ausgang nimmt.

Von der im vorigen Capitel beschriebenen Phlegmone der Submaxillaris unterscheidet sich die Angina Ludovici — nach dem Württemberger Arzte Ludwig (1836), ihrem ersten Beschreiber, so genannt — nicht nur durch die Mitbetheiligung des die Submaxillaris umgebenden Bindegewebes, sondern auch durch ihre weite Ausbreitung hinter der Fascie zwischen Unterkiefer, Zungenbein, Mylohyoideus und der Sehne des Digastricus. Dass die Affection, wie einige fran-

zösische Autoren behaupten, mit der Submaxillaris gar nichts zu thun habe, sondern eine eigengeartete infectiöse Krankheit vorstelle, ist unrichtig. Dass die letzte feinere Ursache aber in der Einwanderung von Mikroorganismen, Streptococcus, Staphylococcus zu suchen sei, ist höchst wahrscheinlich.

Aetiologisch spielen Verletzungen, Fall oder Stoss auf den Mundboden, ganz besonders aber acute Infectionskrankheiten, Scharlach, Masern, Typhus, Diphtherie, Variola, wahrscheinlich auch Scrophulose, Tuberculose und Syphilis die Hauptrolle. In zweiter Linie stehen jene Krankheiten, welche sympathische Schwellungen der Submaxillaris und der ihr benachbarten Lymphdrüsen zur Folge haben können. Dazu gehören phlegmonöse, erysipelatöse, diphtheritische, gangränöse Anginen und ulceröse Processe der Mundhöhle, ferner bei Kindern Eczeme des Ohres und Gesichtes. Anderweitige Infiltrate des Mundbodens, wie z. B. nach Caries des Unterkiefers, Erkrankungen der Zähne etc. gehören jedoch nicht hieher.

Die Angina Ludovici ist häufiger einseitig und kommt in jedem Lebensalter vor; so sah Verfasser dieselbe mehrmals bei Säuglingen und einmal auch bei einem 73jährigen Greise im Anschlusse an eine phlegmonöse Amygdalitis. Die Krankheit beginnt meist fieberlos oder mit geringer Temperaturerhöhung mit einem Gefühle von Spannung in der Gegend des Unterkieferwinkels beim Mundöffnen und Schlucken.

Der palpirende Finger entdeckt etwas nach vorne und innen vom Unterkieferwinkel eine circumscripte harte Schwellung, welche anfangs wenig schmerzt, allmählich aber schmerzhafter und immer grösser wird, die Mittellinie überschreitet und bald den ganzen Raum zwischen den Aesten des Unterkiefers ausfüllt. Die das brettharte Infiltrat überkleidende Haut ist anfangs normal, röthet sich aber später im Ganzen oder an einzelnen Stellen oder wird ödematös. Das Oeffnen des Mundes und das Schlucken wird immer schwieriger, die Sprache undeutlich, weil die Zunge durch das Infiltrat am Mundboden an den Gaumen oder gegen den Larynx angedrückt und das Hervorstrecken der Zunge unmöglich wird. In hochgradigen Fällen kommt es theils durch Oedem der Schleimhaut des Larynx, theils durch Compression der Trachea durch das sich mehr und mehr ausdehnende Infiltrat zu Dyspnoe und Asphyxie, durch Compression der Jugularvenen zu Cyanose des Gesichts, Schwindelanfällen, Ohnmacht, oder bei Thrombosirung zu Meningitis. In den gewöhnlichen Fällen spitzt sich die das Infiltrat überziehende Haut zu oder sie wird an einer Stelle ödematös und dann gangränös, es tritt Fluctuation ein und es entleert sich künstlich oder spontan ein übelriechender, jauchiger, mit brandigen Gewebsfetzen vermischter Eiter; nicht selten werden grössere Hautstrecken gangränös oder es bleiben eiternde Fistelgänge und entstellende die Bewegungen der Halsmuskeln beeinträchtigende Narben zurück. In sehr schweren Fällen gesellen sich zu den localen Erscheinungen Symptome der Pyämie, heftiges Fieber mit Schüttelfrösten, icterische Färbung der Haut, Delirien, Adynamie, Schweisse, Diarrhöen, Affectionen der Gelenke und Albuminurie.

Die Prognose ist im Allgemeinen nicht so schlecht, als sie von manchen Autoren gestellt wird; Roser betont mit Recht, dass sie um so günstiger ist, je energischer und frühzeitiger eingegriffen wird; dass sehr schwere Fälle durch Mitbetheiligung des Kehlkopfes, durch Pyämie und Sepsis oder durch Blutung, Senkung des Eiters ins Mediastinum, Venenthrombose des Gehirns etc. eine sehr ungünstige Prognose geben, ist verständlich; immerhin kann aber auch in solchen verzweifelten Fällen noch Genesung eintreten, wie Verfasser bei einem 6jährigen Knaben beobachtete, bei dem die Affection nach Scharlach aufgetreten war und bei dem sich bereits das volle Bild der Sepsis, Petechien der Haut, Darmblutungen und Nierenblutungen entwickelt hatten. Die Rückbildung des Infiltrates ohne Abscedirung ist der günstigste aber auch seltenste Ausgang.

Die Therapie muss im Anfange eine antiphlogistische sein; man versuche durch Eisumschläge, Einpinselungen von Jod, Jodoformcollodium, Einreibungen von Ung. ciner., die Ausbreitung des Infiltrates zu verhindern; auch von parenchymatösen Injectionen von 2% Carbollösung wollen Einige Erfolge gesehen haben. Später empfehlen sich feuchtwarme Umschläge und vor Allem möglichst frühzeitige Incision. Roser empfiehlt, nur den Hautschnitt mit dem Messer zu machen, den Eiter aber mit einer vorsichtig vorgeschobenen Kornzange hinter der Halsfascie aufzusuchen. Fieber bekämpfe man mit Chinin, Antipyrin, Antifebrin, Adynamie mit Stimulantien, Erstickungsgefahr durch die Tracheotomie, welche bei starker Infiltration der Haut immer eine sehr schwierige ist und das Einlegen sehr langer Canülen oder in Ermangelung solcher das Einführen eines langen derben Gummirohres nöthig macht.

Neubildungen und Concretionen.

Einfache Hypertrophie der Parotis scheint nach den neuern Untersuchungen durchaus nicht so häufig zu sein, wie man früher annahm. Sie ist bedingt durch Wucherung aller die Drüse constituirenden Theile oder durch Fetteinlagerung oder Wucherung des interalveolären und periacinösen Bindegewebes. Idiopathische oder secundäre Entzündungen und Abscedirungen der Parotis sind die gewöhnlichen Ursachen der zurückbleibenden Vergrösserung; einmal sah Verfasser bei einem 38jährigen Manne ohne nachweisbare Ursache eine doppelseitige, weiche, nicht schmerzhafte, das Gesicht sehr entstellende Hypertrophie.

Cystengeschwülste der Speicheldrüsen (Speichelgeschwülste) sind ziemlich häufig, sie können bis zu Hühnereigrösse wachsen und haben theils einen serösen theils atheromartigen Inhalt.

Die Cystengeschwülste der Parotis verdanken theilweise dem Verschlusse des Speichelganges durch entzündlich-ulceröse Vor-

gänge in der Mundhöhle ihre Entstehung; sie entwickeln sich allmählich und schmerzlos, sitzen in der Wange, dem Verlaufe des Duct. Stenon. entlang, seltener auf der Parotis selbst. Ihre Grösse variirt sehr, übersteigt aber kaum die einer Wallnuss, sie sind hart und derb, zuweilen fluctuirend und bei Druck knisternd. Die Heilung erfolgt nach Wiedereröffnung des Ausführungsganges oder durch Verödung und Atrophie, manchmal nach Abscedirung der Parotis und Fistelbildung.

Zu den häufigsten Neoplasmen gehören auch Chondrome. Sie nehmen vom Bindegewebsgerüste der Drüse ihren Ursprung und stellen nach König solitäre Knoten von wirklich hyalinem Knorpel vor, die aus der Tiefe der Drüse das Gewebe verdrängend herauswachsen und als ein- oder mehrlappige Knoten auf der Oberfläche erscheinen. Auch Sarcome, sowie Uebergangsformen, Myxochondrome, Myxosarcome, Fibromyxochondrome kommen nicht selten vor.

Ziemlich häufig ist das Carcinom der Parotis; es tritt als Scirrhus und als Markschwamm, namentlich im höheren Alter auf. Das erstere bildet höckerige, unebene, derbe Geschwülste, welche oft Jahre zu ihrer Entwicklung bedürfen, zumal die Fascie dem Wachsthum derselben Widerstand leistet; ist diese aber einmal durchbrochen, dann treten consecutive Schwellungen der Lymphdrüsen und Zerfall ein; die weichen Carcinome wachsen sehr rasch, vergrössern sich nach allen Richtungen, dringen in die Mundrachenhöhle ein und verwandeln sich bald in jauchende Geschwüre.

Die Erscheinungen der Parotistumoren bestehen ausser in Entstellung des Gesichts in Behinderung des Oeffnens des Mundes und Kauens, ferner in Schmerzen, Schwerhörigkeit, Facialislähmung, Compression des Pharynx und Larynx, bei Wachsthum in die Orbita in Amaurose etc.

Die Diagnose der Parotisgeschwülste stösst zuweilen auf grosse Hindernisse; im Allgemeinen halte man sich an die von König gegebene Regel, dass eine Geschwulst um so eher der Parotis angehört, je mehr sie die vergrösserten Contouren dieser Drüse zeigt.

Die Prognose richtet sich nach der Grösse und dem histologischen Baue; auch Sarcome geben frühzeitig operirt eine günstige Prognose, da sie weder recidiviren noch Metastasen machen; selbst gutartige, circumscripte Neubildungen können unheilbare Facialislähmung zurücklassen.

Die Behandlung kann nur eine operative sein; zuvor versuche man parenchymatöse Injectionen von Jod oder Chlorzink oder den innerlichen Gebrauch des Arsen, welcher bei malignen Lymphosarcomen zuweilen einen entschiedenen Nutzen hat. Lassen diese Methoden im Stiche, dann schreite man zur Exstirpation der Parotis, deren Beschreibung in den Lehrbüchern der Chirurgie nachzuschlagen ist.

Geschwülste der Sublingualis gehören zu den grössten Seltenheiten. Albert erwähnt zwei Fälle von Enchondromen, während M. Zeissl einen Fall von Adenom beschreibt.

Die Speicheldrüsen sind auch der Sitz von Fremdkörpern und Concretionen.

Die ersteren gelangen theils von der Haut aus durch Verletzungen, theils von der Mundhöhle aus in die Drüsen oder in deren Ausführungsgänge.

Wie in der Nase, so bilden sich auch in den Speicheldrüsen und deren Ausführungsgängen um kleine Fremdkörper Concretionen, die sogenannten Speichelsteine, welche meist die Grösse einer Erbse besitzen, aber auch hasel- und wallnussgross werden. Sie haben einen geschichteten Bau mit abwechselnd weissen und gelben Schichten und bestehen grösstentheils aus kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk und Magnesia, kleinerentheils aus organischen Stoffen; Maas fand in ihnen äusserst zahlreiche Bacterien; die Farbe ist gewöhnlich hellweiss oder gelb; zuweilen scheinen sie congenital zu sein.

Die Erscheinungen der Concretionen beziehen sich auf die Verstopfung der Ausführungsgänge, der Speichel staut sich, die Drüse schwillt wie bei Parotitis und Sialodochitis an, wird spontan und auf Druck schmerzhaft und vereitert; nicht selten bleiben Speichelfisteln zurück.

Zur Diagnose ist die Untersuchung der Ausführungsgänge der Drüsen mittelst Sonden oder kleiner Röhrchen unentbehrlich.

Die Behandlung besteht in Dilatation des Duct. Stenon. oder Wharton. Führt diese nicht zum Ziele, dann müssen die Concretionen excidirt werden; nicht selten entleeren sich dieselben nach spontaner oder künstlicher Eröffnung des Abscesses von selbst.

II. Abtheilung.

Die Krankheiten des Rachens.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen.

Unter Rachen, Rachenhöhle, Schlundkopf, Pharynx, versteht man einen länglich-viereckigen Raum, der sich von der Basis des Hinterhaupts- und Keilbeins bis zur Vorderfläche des fünften Halswirbels herab erstreckt, nach vorne mit der Nase und Mundhöhle, seitlich mit dem Mittelohr und nach unten mit dem Kehlkopf und Oesophagus in Verbindung steht. Dieser Raum wird ausgekleidet von einem fibrösen Balkengerüste, welches mit Schleimhaut überzogen an die vordere Fläche der Halswirbelsäule angeheftet ist und zahlreiche Muskeln, Nerven, Drüsen und Gefässe enthält. Die Anheftung geschieht an der Wirbelsäule durch das retropharyngeale Zellgewebe, das mit der Aponeurose der prävertebralen Muskeln in Verbindung tritt. Aus anatomischen sowohl wie aus klinischen Gründen theilt man den Pharynx in mehrere Abschnitte; den oberen von der Basis des Keilbein-Hinterhauptsbeines bis zur Uvula reichenden Theil bezeichnet man als Pars nasalis oder Nasenrachenraum, Cavum pharyngonasale; den von der Uvula bis zur Basis der Zunge reichenden Theil nennt man Pars oralis, den zwischen der Basis der Zunge oder auch zwischen der Spitze der Epiglottis und dem Eingange zum Oesophagus liegenden Abschnitt Pars laryngea.

Da, wie nicht zu leugnen, diese Eintheilung eine ziemlich willkürliche ist, schlug Rückert vor, nur zwei durch den Isthmus faucium strenge von einander geschiedene Abtheilungen, den obern den „Luftweg“ und den untern den „Speiseweg“, gelten zu lassen. So sehr auch Verfasser diesen Vorschlag billigt, so ist doch aus praktischen Gründen die ältere Eintheilung beibehalten worden.

Der Nasenrachenraum (siehe Figur 9) hat beiläufig die Gestalt eines abgerundeten Würfels. Seine obere Wand, das Rachendach, wird gebildet durch den Keilbeinkörper und die Pars basilaris des Hinterhauptsbeines; sie geht ohne scharfe Grenze in die hintere Wand über, an deren Bildung sich die Vorderfläche des Atlas und des ersten Halswirbels betheiligt. Die vordere Wand des Nasenrachenraumes wird gebildet durch die Choanen, den Vomer, den horizontalen Theil des Gaumenbeines, die flügelförmigen Fortsätze des Keilbeins und die Rückfläche des weichen Gaumens, welcher bei seiner Contraction zugleich auch die untere Grenze des Nasenrachenraumes bildet. Die

Seitenwand wird gebildet durch die Rosenmüller'schen Gruben, die Tubenwülste und die Ostien der Eustachischen Röhre.

Von Wichtigkeit ist die Schleimhaut der Pars nasalis. Sie ist am Dache und der hinteren und seitlichen Wand etwa bis zum Niveau der Tubenmündungen herab besonders reich an drüsigen Organen. Dieses cytogene follikelreiche Polster führt auch den Namen adenoides Gewebe oder Rachenmandel — Tonsilla pharyngea. Sie stellt ein weiches über die Schleimhaut prominirendes Gewebe dar, welches durch engere und weitere Spalten in zahlreiche Wülste und Kämme getheilt und nahe an seinem untern Ende in der Mitte mit einer verschieden grossen rundlichen in die Bursa pharyngea mündenden Oeffnung (Foramen coecum) versehen ist. Die Bursa pharyngea ist sozusagen mitten in die Rachentonsille eingebettet, sie steigt bis zum Körper des Hinterhauptbeines auf, um sich hier mit ihrem verjüngten bisweilen spitz zulaufenden Ende in die äussere fibröse Hülle dieses Knochens förmlich einzubohren. Sie ist nach Tornwaldt der Sitz mannigfacher Erkrankungen.

Die wichtigsten Organe der Pars nasalis sind die Tubenwülste mit den Tubenmündungen. Durch das Vorspringen der Tubenwülste entsteht hinter denselben eine Vertiefung, die Rosenmüller'sche Grube, Recessus pharyngis, welche gleichfalls Schleimfollikel und adenoides Gewebe enthält. An dem Tubenwulste unterscheidet man eine vordere und eine hintere Lippe, zwischen denen sich der Tubeneingang befindet. Derselbe ist von verschiedener Grösse, bald trichterförmig bald schlitzartig nach vorne und unten gerichtet. Die vordere Begrenzung des Tubeneinganges wird auch Haken genannt, er setzt sich in die Hakenfalte, Plica salpingopalatina, fort; dieselbe flacht sich während der Phonation und beim Schlingen in ihrer untern Hälfte ab. (Siehe Fig. 1 Psp, Fig. 2 HF.)

Eine grosse praktische Bedeutung hat die von dem hintern Ende des Tubenknorpels ausgehende drüsenreiche Plica salpingopharyngea, Wulstfalte. (Siehe Fig. 1 Psph, Fig. 2 WF, Fig. 9 Psph.) Sie steigt der Hakenfalte gleichlaufend an der Seitenwand des Nasenrachenraumes herab und kreuzt sich mit dem äusserlich schräg von ihr absteigenden hintern Rand des Levator veli palatini; unmittelbar über dem hintern Gaumenbogen verflacht sie sich und setzt sich rückwärts und auswärts wendend gegen den hintern Gaumenbogen fort, an dessen oberer Platte sie sich nach aussen anlegt. Durch ihre bei der Phonation und Deglutition eintretende Bewegung nach innen und unten trägt sie nach Zaufal zum Abschluss des untern vom obern Rachenraum bei.

Im Mundtheile des Pharynx interessirt uns besonders der weiche Gaumen, auch Gaumensegel, Velum palatinum. Er stellt ein von zwei Seiten mit Schleimhaut überzogenes, sich an dem harten Gaumen inserirendes mit zahlreichen Muskeln versehenes vorhangartiges Gebilde dar, dessen vordere Fläche in die Schleimhaut der Mundhöhle und dessen hintere Fläche in jene des Nasenrachenraumes übergeht. Die vordere Fläche des Velum ist unter normalen Verhältnissen leicht geröthet, glatt und enthält die Mün-

dungen zahlreicher dicht bei einander stehender Schleimdrüsen, die sich als kleine hirsekorngrosse, öfters mit winzigen Tröpfchen Schleims bedeckte Erhabenheiten markiren. In der Mitte findet sich ein cylindrischer drüsenreicher Fortsatz, das Zäpfchen, Uvula, während der untere freie Rand in zwei divergirende Schleimhautfalten ausläuft, in eine hintere schmälere, den hintern Gaumenbogen, Arcus pharyngopalatinus, und in eine breitere, den vordern Gaumenbogen, Arcus palatoglossus. Der erstere inserirt sich auf der hintern seitlichen Rachenwand vor der Wirbelsäule, der letztere an dem Seitenrande der Zunge. Zwischen beiden Gaumenbögen, dem Interstitium arcuarium, befindet sich die Gaumenmandel, Tonsilla palatina. Der von den Mandeln, den Gaumenbögen, der Uvula und Zunge begrenzte Raum heisst Isthmus faucium, die beiderseits zwischen Uvula und Gaumenbögen freibleibenden Räume werden Arcaden genannt.

Die Gaumenmandel stellt ein paariges, bei normalen Erwachsenen beiläufig haselnussgrosses länglich-rundes Drüsenpaquet vor; ihre Grösse und Form ist beträchtlichen Schwankungen unterworfen, ebenso ihre Farbe; man darf behaupten, dass man bei Erwachsenen kaum jemals ganz normale Tonsillen vorfindet. An ihrer freien Oberfläche finden sich zahlreiche schmale rundliche oder spaltförmige Oeffnungen, welche in kürzere oder längere, senkrecht oder schief verlaufende Spalten, Lacunen oder Crypten führen. Die Lacunen sind mit einer dünnen Epitheldecke ausgekleidet; über die ganze Tonsille erstreckt sich ein festes Bindegewebe, zwischen dessen Fasern die Drüsensubstanz, die Follikel, liegen; Schleimdrüsen kommen in der Mandel nicht vor. Aus den Mandeln wandern nach Ph. Stöhr fortwährend Leucocyten aus. Von besonderer Wichtigkeit ist die Umgebung der Mandel. Sie ist vorne und hinten von lockerem, nach aussen von straffem Bindegewebe umgeben und an die Fascia buccopharyngea angeheftet. Nach aussen $1^1/_2$ cm von der Tonsille entfernt, liegt die Carotis interna, 2 cm entfernt die Carotis externa.

Die Pars oralis entbehrt einer vordern Wand, insoferne als diese von einer Oeffnung, dem Aditus pharyngis, gebildet wird; nach abwärts bildet die Basis der Zunge die vordere Begrenzung.

Die Pars laryngea begrenzt sich vorne durch den Kehldeckel und den Aditus laryngis, seitlich durch zwei längliche Schleimhauttaschen, die Sinus pyriformes. Die hintere längs der Vorderfläche der Wirbelsäule herabziehende Wand der Pars oralis und laryngea erscheint eben oder schwach concav, zuweilen auch leicht convex, öfters auf einer Seite höher oder der Länge nach durch eine schmale erhabene Leiste gewölbt. In der Pars oralis finden sich bei den meisten Menschen bald in der Mittellinie, bald seitlich, einige oder mehrere halblinsengrosse, gelblichrothe prominente Stellen, die sogenannten Granula, die uns noch näher beschäftigen werden.

Die Schleimhaut der hinteren Rachenwand erscheint leicht geröthet, von zahlreichen Gefässen durchzogen, feucht, im untern Theile leicht gekörnt.

Die Schleimhaut des Nasenrachenraumes trägt Flimmerepithel, die des übrigen Pharynx Pflasterepithel.

Die in die Schleimhaut eingebetteten Drüsen sind zweierlei Art, conglomerirte traubenförmige und folliculäre; die ersteren finden sich hauptsächlich in der Pars nasalis, besonders auf der Rückfläche des Velum, im Umkreise der Tuben und den Rosenmüller'schen Gruben; die Follikel, rundliche umschriebene Gebilde, finden sich zahlreich in der Pars nasalis, so besonders in der Tonsilla pharyngea, den Tubenwülsten, Rosenmüller'schen Gruben, ferner in der Pars oralis.

Die Lymphgefässe des Rachens bilden in der Schleimhaut ein dichtes Netzwerk, den von Waldeyer-Bickel beschriebenen, die Gaumen-, Pharynx-, Tubentonsillen und die Zungendrüsen umfassenden Pharynxring. Ein Theil dieses grösseren Ringes, von dem sich lymphatisches Gewebe auf den Boden der Mundhöhle, in die Nasenhöhle bis zu den vorderen Enden der mittleren und unteren Muscheln, ja bis zur Epiglottis und den Taschenbändern erstreckt, schliesst mit dem lymphatischen Gewebe des Velums einen kleineren Ring. Die mit diesen beiden Ringen in Verbindung stehenden Lymphdrüsen liegen im Kieferwinkel an der Theilungsstelle der Carotis unter und neben dem oberen Theile des Kopfnickers, an der Seite des Zungenbeins und des Kehlkopfes. Da die im Kieferwinkel liegenden Drüsen mit den Gaumenmandeln communiciren, so schwellen dieselben bei den verschiedensten Affectionen der letzteren an.

Die Blutgefässe des Rachens sind arterielle und venöse. Unter den arteriellen sind zu merken die aus der Maxillaris interna entspringende Art. palatina superior (descendens) für den weichen und harten Gaumen, die aus der Maxill. ext. entspringende Art. palat. ascend. für die Schleimhaut, Muskeln und Drüsen des Gaumensegels und die Art. tonsillaris für die Mandeln, seitliche Schlundwand und Zungenwurzel. Ferner die Art. pharyngea ascend. und Endzweige der Maxill. intern., Art. vidiana, Art. pharyngea suprema, letztere für den Nasenrachenraum.

Die Venen bilden zwei Plexus, den Plexus venos. posterior, welcher mit den Venen der Nasenschleimhaut in Verbindung steht und sich in den Plexus der Schläfengegend ergiesst, und den Plex. ven. anter., der mit der Wurzel der Zunge communicirt und sich mittelst der Ven. pharyng. in die Jugularis int. ergiesst.

Von grösserer Wichtigkeit sind die Nerven und Muskeln des Schlundes.

Es gibt kaum ein Organ, das von so zahlreichen und so verschiedenen Nerven versorgt wird, wie der Rachen.

Die sensiblen Nerven, welche theils das Tastgefühl und die Empfindung, theils den Geschmack und die reflectorische Muskelcontraction sowie die Secretion beherrschen, stammen zumeist aus dem Trigeminus. Die Nervi palatini minores entspringen aus dem zweiten Aste und dessen Ganglion rhinicum und gehen an der Vorderseite des Gaumensegels bis zu den Rändern der vorderen Gaumen-

bögen herab. Die schmeckenden Theile des Rachens, die Seitentheile des weichen Gaumens sowie die vorderen Gaumenbögen werden vom Glossopharyngeus innervirt, während die secretorischen Nerven in der Chorda tympani liegen.

Noch mannigfaltiger gestaltet sich die motorische Innervation.

Die motorischen Fasern stammen theilweise aus dem dritten Aste des Trigeminus; die Nervi petrosi superfic. minores sowie die Rami pterygoidei int. gehen an den Tensor veli palatini. Der Facialis versorgt mittelst des Ram. palat. super. den Levator veli und Azygos uvulae, mittelst des Ram. palat. infer. den Musc. pharyngo- und glossopalatinus.

Der Accessorius innervirt bei manchen Menschen ganz, bei manchen theilweise den Constrictor pharyng. super.; er sendet ferner motorische Fasern zum Constr. phar. med., ganz besonders aber zum Levator veli, Azygos uvulae und Pharyngopalatinus.

Die Auslösung des ersten und willkürlichen Theiles des Schluckactes findet nach den experimentellen Untersuchungen von Krause in dem Gyrus praefrontalis des Scheitellappens statt.

Unter den zahlreichen Muskeln des Rachens sind functionell die Constrictoren des Schlundes die wichtigsten.

Es gibt deren drei, Constrictor pharyngis superior, medius und inferior. Durch ihr Zusammenwirken wird der Pharynx verengert und der Bissen nach abwärts befördert.

Die im vordern Gaumenbogen aufsteigenden Muskelbündel, die als M. glossopalatinus bezeichnet werden, bilden mit dem von dem hintern Gaumenbogen in das Velum ausstrahlenden M. pharyngopalatinus einen Sphincter, welcher die Mundhöhle von der Rachenhöhle abschliesst und die beiden Gaumenbögen einander nähert.

Eine sehr wichtige Function kommt ferner dem Levator veli palatini zu. Er wirkt einerseits eröffnend auf das Lumen der Ohrtrompete, andererseits hebt er den weichen Gaumen in die Höhe, drückt ihn an die hintere Rachenwand an und schliesst so die Pars nasalis von dem übrigen Pharynx ab.

Dem Tensor veli palatini kommt nach Rüdinger nur eine geringe spannende Wirkung auf das Velum zu; hingegen trägt er gleichfalls zur Eröffnung der Tuba bei.

Der Azygos uvulae verkürzt das Zäpfchen in gerader Richtung, dasselbe hebend, so dass die Schleimhaut in quere Falten gelegt wird.

Von besonderem Interesse ist die Einlagerung der Drüsen zwischen den Muskelbündeln an der Mundhöhlenfläche des Velum, indem, wie Rüdinger zeigte, die einzelnen Drüsen von den quer und schief verlaufenden Muskelbündeln umgeben werden und zwischen den Drüsen und der Schleimhaut ein besonderes Muskelstratum aus quergestreiften Fasern hinzieht. Dadurch wirken die Muskeln des Velum comprimirend und secretentleerend auf die Drüsen.

Untersuchungsmethode.

Bei dem eigenthümlichen Bau und den relativ grossen Dimensionen des Rachens ist es erklärlich, dass man mit der gewöhnlichen Inspection nicht ausreicht. Immerhin bildet dieselbe die häufigste und wichtigste Untersuchungsmethode. Vorerst bedarf man einer passenden Beleuchtung; in der Regel genügt das directe Tageslicht; ist der zu Untersuchende an das Bett gefesselt, also von dem Lichte weiter entfernt oder von demselben abgekehrt, dann bedient man sich mit Rücksicht auf den Kranken, der seine Lage nicht zu ändern braucht, des reflectirten Tageslichtes, bei trübem Wetter oder bei Nacht des reflectirten künstlichen Lichtes. Das noch so vielfach geübte Hineinleuchten in den Rachen ist nicht nur ungenügend, sondern auch lästig.

Da wenige Menschen die Fertigkeit besitzen, ihre Zunge durch eigene Muskelkraft auf dem Boden der Mundhöhle zu fixiren, so muss dieselbe mittelst geeigneter Instrumente niedergehalten werden; im Nothfalle bedient man sich eines Löffelstiels, eines Falzbeines, des Zeigefingers, des Stieles eines Kehlkopfspiegels, sonst der Mundspatel, von denen es eine grosse Auswahl gibt als da sind gerade, Winkelspatel, bogenförmige, Bajonettspatel, sowie die von Türck, B. Fränkel und Andern angegebenen Instrumente. Welchem von denselben man auch den Vorzug geben mag, stets merke man sich als Regel, dass die breite Fläche desselben langsam und vorsichtig auf den hintern mittleren Theil der Zunge aufgesetzt und dann die Zunge mit wachsendem Drucke nach vorne zu auf den Boden der Mundhöhle niedergedrückt werde. Würgebewegungen, die fast nie ausbleiben, sind zwar manchmal sehr unangenehm, in andern Fällen jedoch für die Untersuchung vortheilhaft. Man übersieht so den weichen Gaumen, die Tonsillen und die hintere Rachenwand von unterhalb der Tubenwülste bis zum Niveau des Kehldeckels, sehr oft auch noch diesen selbst. Anfänger fehlen meist darin, dass sie den Spatel nicht auf die Mitte der Zunge oder auch nicht mit gehörigem Drucke aufsetzen, was zur Folge hat, dass die oft mit staunenswerther Kraft sich aufbäumende Zunge das Instrument abwirft wie das Ross den Reiter. Widerspenstiger Kinder wird man am besten nach vorheriger Fixirung des Kopfes und der Arme, welche in ein Tuch eingeschlagen werden, durch Zuhalten der Nase Herr, indem man schnell den Spatel zwischen die bei der Inspiration sich öffnenden Schneidezähne einzwängt; anderweitige Instrumente wie Holzkeile, Metallfinger oder Mundsperrer sind zur Untersuchung und den gewöhnlichen Manipulationen unnöthig; dagegen bei der Tonsillotomie und länger dauernden Operationen namentlich bei Kindern von grossem Nutzen. Erwachsene mit falschen Zähnen oder solche, welche fürchten, durch die Instrumente des Arztes inficirt zu werden, setzen der Untersuchung oft hartnäckigen Widerstand entgegen. In Bezug auf letztere kann übrigens dem Anfänger die peinlichste Reinlichkeit und Ordnung in der Aufbewahrung der Spatel, Spiegel, Pinsel etc. in getrennten Fächern nicht genug an's Herz gelegt werden.

Bei der Inspection des Rachens achte man mit schnellem, mit der Zeit sich immer mehr schärfendem Blicke auf Configuration, Farbe, Beweglichkeit des weichen Gaumens, der Uvula, der Gaumenbögen, auf die Grösse und das Aussehen der Mandeln, die Beschaffenheit der Hinterwand, die Secretion. Niemals versäume man der seitlichen Rachenwand, besonders den hinter den Arc. palatopharyngeus liegenden und sich nach oben und unten fortsetzenden Schleimhautpartien die vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Ueber die tiefern Theile des Rachens kann nur die laryngoskopische Untersuchung Aufschluss geben.

Eines besonderen Verfahrens bedarf man zur Inspection des Nasenrachenraumes.

Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass die Pharyngoskopia sine Rhinoscopia posterior wegen ihrer unleugbaren Schwierigkeit bei weitem nicht die Verbreitung gefunden hat wie die Laryngoskopie, so kann doch nicht dringlich genug auf die Wichtigkeit derselben hingewiesen werden.

Die Schwierigkeiten liegen einerseits in dem anatomischen Bau des Nasenrachenraumes, andererseits in der Reizbarkeit der zu Untersuchenden. Man kann mit ziemlicher Sicherheit aus der blossen Inspection des Rachens beurtheilen, ob Jemand leicht oder schwer oder gar nicht rhinoskopisch zu untersuchen sein wird. Je grösser der Abstand des weichen Gaumens von der hinteren Rachenwand um so leichter und vollständiger, je geringer, um so schwerer ist die Untersuchung. Dass man bei sehr reizbaren Personen gar nicht zum Ziele kommt ist richtig, doch wird sich mit wachsender Uebung die Zahl derselben mehr und mehr verkleinern; auch besitzen wir in dem Cocain ein vortreffliches die Untersuchung sehr erleichterndes locales Anästheticum.

Die Beleuchtung ist dieselbe wie bei der Laryngoskopie, ebenso der Reflector. Verfasser bedient sich kleiner, 1—1½ Cent. im Durchmesser haltender, an einem geraden Stile befestigter, in einem fast rechten Winkel gebogener runder Planspiegel und macht von den eigentlichen Rhinoskopen mit Zungendepressor oder stellbarer Vorrichtung und Uvulahalter keinen Gebrauch. Nach Regulirung der Beleuchtung wird mit der linken Hand die Zunge niedergedrückt, so dass der weiche Gaumen mit dem Isthums frei vor Augen liegt; allenfalls sich zwischen den Arcaden bildende Luftblasen werden mit dem Stiel des Spiegels zerrissen. Sodann wird der wohlerwärmte Spiegel mit nach oben gekehrter Spiegelfläche unter sorgfältigster Vermeidung des Anstreifens an Zungenrücken oder Gaumenbogen zwischen Uvula und Gaumenbogen, also in die rechte oder linke Arcade mit der rechten Hand eingeführt und gegen die Hinterwand jedoch ohne Berührung derselben vorgeschoben, während der Patient gar nicht oder durch die Nase athmet. Zweck dieser Manipulation ist einzig und allein, das Gaumensegel in möglichst erschlafftem Zustande zu erhalten, wovon ja das Gelingen der Untersuchung stets abhängt. Tritt trotzdem durch Würgebewegungen Annäherung des Velum an die Hinterwand

also Verkleinerung eventuell vollständiger Abschluss des zu inspicirenden Raumes ein, dann lasse man den Patienten noch energischere Athemzüge durch die Nase vornehmen; gelingt auch jetzt die Erschlaffung des Velum nicht, so entfernt man den Spiegel und gönnt dem Kranken einige Ruhe, um die Untersuchung zum zweiten oder dritten Mal eventuell nach Cocainisirung vorzunehmen. Man kommt auf diese Weise bei Erwachsenen und älteren Kindern fast stets zum Ziele. Dass die von verschiedenen Autoren empfohlenen Instrumente wie Gaumenhaken, Zäpfchenschnürer, Uvulahalter, Durchziehen eines



Fig. 1. Das rhinoskopische Bild.

S.	Septum narium.
Ch.	Die beiden Choanen mit den 3 Nasenmuscheln und Nasengängen.
WG.	Rückfläche des weichen Gaumens mit Uvula und Ansatzstelle des Velum und dem harten Gaumen; Levator in mässiger Contraction.
Te.	Tubeneingang.
Tw.	Tubenwulst.
Psp.	Plica salpingopalatina.
Psph.	Plica salpingopharyngea.
Lw.	Levatorwulst.
F.	Fornix vordere Wand.
A.	Adenoides Gewebe.
RG.	Rosenmüller'sche Grube.

Seidenbandes oder einer Gummiröhre durch die Nase, welche sämmtlich eine Vergrösserung des Inspectionsraumes bezwecken, in manchen Fällen nützlich sind, soll nicht bezweifelt werden, doch kommt man in der Regel ohne dieselben zum Ziel.

Es ist natürlich, dass bei der Application so kleiner Spiegel nicht der ganze Nasenrachenraum auf einmal übersehen werden kann, sondern dass das Bild desselben durch Rotiren des Spiegels combinirt werden muss.

Seine ersten Studien mag der Anfänger an einem Phantome, so z. B. an dem Isenschmid'schen beginnen und dann erst zur Untersuchung Gesunder mit weitem Rachen und geringer Empfindlichkeit oder Defecten des Gaumens oder der Uvula und zuletzt Kranker übergehen. Die Orientirung in dem rhinoskopischen Bilde (Fig. 1) ist für den Anfänger ziemlich schwierig.

Stets beginne man mit dem Septum narium, jener auffallenden, genau in der Mittellinie gelegenen biconcaven, unter normalen Verhältnissen blassrothen Knochenleiste, an deren lateralen Rändern die Choanen, zwei länglich ovale Höhlen sichtbar werden. In den Choanen erblickt man, aber nicht immer, ganz oben die kleinste obere Muschel, unter derselben die stets sichtbare grössere mittlere und zu unterst die zumeist durch das contrahirte Velum etwas verdeckte oft nur zur Hälfte oder noch weniger sichtbare grösste grauweisse oder röthliche, feuchtglänzende in den Rachen vorspringende untere Muschel mit dem dazwischenliegenden oberen, mittleren und unteren Nasengange. Als eine ziemlich häufige Anomalie muss die kolbige selbst tumorartige Verdickung des mittleren und unteren hinteren Theiles des Septum erwähnt werden. Rotirt man jetzt den Spiegel nach aussen, dann trifft das Auge auf einen starken von aussen nach innen vorspringenden rundlichen oder länglichen röthlichgelben Wulst, der in seinem unteren mittleren Theile eine blasse manchmal auffallend anämische von Gefässen durchzogene trichterförmige kirschkerngrosse zuweilen noch umfangreichere Oeffnung trägt; ersterer ist der Tubenwulst, letztere der Tubeneingang. Derselbe wird von zwei Schleimhautfalten begrenzt, von denen die vordere Plica salpingopalatina, die hintere Plica salpingopharyngea genannt wird. Zwischen der vorderen und hinteren Plica erhebt sich der Levatorwulst. Die nach aussen von dem Tubenwulste bemerkbare im Schatten liegende Partie ist die Rosenmüller'sche Grube. Am schwierigsten gestaltet sich die Untersuchung des Rachendaches; man muss zu diesem Zwecke die spiegelnde Fläche mehr horizontal stellen und den Griff des Spiegels stark heben. Unter normalen Verhältnissen erscheint das Rachendach (Fornix) als eine leicht geröthete ebene oder bei Anwesenheit eines starken cytogenen Polsters zerklüftete wellige nach hinten abfallende Fläche. Auf derselben findet sich nach Tornwaldt bei fast allen Menschen, namentlich bei Anwendung des Gaumenhakens sichtbar, die Oeffnung der Bursa pharyngea als eine Furche oder trichterförmige Grube oder als kreisförmiges, ovales Loch genau in der Mittellinie des Rachendaches ungefähr in der Mitte des Abstandes zwischen oberem Choanenrand und Protuberantia atlantis. Am leichtesten gelingt die Untersuchung der hinteren Fläche des weichen Gaumens, der nur allzu oft das vollständige Ueberschauen der geschilderten Theile erschwert. Er markirt sich im Spiegel als eine quer durch das Gesichtsfeld ziehende theils ebene theils wellig convexe Linie. Es sei bemerkt, dass das rhinoskopische Bild bei sehr vielen Personen nur theilweise oder zur Hälfte sichtbar und das Aussehen der einzelnen Theile besonders der Muscheln und der Tubenwülste zahlreichen Schwankungen unterworfen ist.

Die Möglichkeit, einen Theil des Nasenrachenraumes von vorne durch die Nase zu inspiciren, muss zugegeben werden; meist sind es mit Muschelatrophie Behaftete, bei denen man ohne weitere Vorkehrung als Dilatation der Nasenöffnungen deutlich den Tubenwulst mit dem Tubenostium, die Rosenmüller'schen Gruben die hintere Rachenwand mit ihren Längsfalten und einem Theile des adenoiden Gewebes zu erkennen vermag (siehe Fig. 2); noch freier gestaltet sich der Blick, wenn ausser der untern Muschel auch noch der hintere Theil des Septum durch Syphilis etc. zu Verlust ging. Dass man bei vollständigen Defecten des weichen Gaumens, bei grossen Perforationen und Gaumenspalten den freiesten Einblick hat, ist natürlich. Unter normalen Verhältnissen lässt sich von der Nase aus nur ein schmaler



Fig. 2. Vergrössertes Bild des Nasenrachenraumes von vorne nach Zaufal: rechts in Ruhe, links in Bewegung.

S.	Septum narium.	lTK.	Linker Tubenknorpel.
AUM.	Atrophische untere Muschel.	TÖ.	Tubenöffnung.
rHRW.	Rechte hintere Rachenwand.	TW.	Tubenwulst.
lHRW.	Linke hintere Rachenwand.	HF.	Hakenfalte.
RG.	Rosenmüller'sche Grube.	WF.	Wulstfalte.
rTK.	Rechter Tubenknorpel.	LW.	Levatorwulst.

länglicher, zuweilen zerklüfteter Streifen der Hinterwand erkennen, sehr oft nicht einmal dieser.

Bemerkenswerth ist das Verhalten des Tubenwulstes und der hinteren Rachenwand im Zustande der Ruhe und der Bewegung bei der Phonation oder Deglutition. Figur 2 zeigt auf der einen Seite in der rechten Choane den Tubenknorpel in der Ruhe, auf der anderen Seite in Bewegung. Bei letzterer tritt der Tubenknorpel von aussen nach innen, er spitzt sich mitsammt der Tubenmündung zu, während gleichzeitig durch die Hebung des Gaumensegels von unten herauf ein horizontaler Wulst, der Levatorwulst, sichtbar wird.

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Rhinoscopia posterior hat Zaufal eine neue Methode der Untersuchung des Nasenrachenraumes mittelst Trichtern in die Praxis eingeführt (vergl. Figur 10*e*). Dieselben stellen 10—12 cm lange mit einer trichterförmigen Mündung

versehene im Durchmesser 3—8 mm dicke metallene Röhren vor, welche durch den untern Nasengang unter Controle des Auges vorsichtig in den Nasenrachenraum ohne Berührung der Hinterwand derselben vorgeschoben werden. Die Beleuchtung findet mit künstlichem Licht und dem Stirnbindenreflector statt. Wohl selten hat eine Methode so verschiedene Beurtheilung erfahren wie diese. Von den Einen wurde sie über Gebühr gepriesen, von den Andern vollständig verworfen; die Wahrheit liegt in der Mitte. Dass die Methode eine Berechtigung hat und werthvolle Aufschlüsse besonders über die Tubenwülste und deren Mündungen sowie die von ihnen ausgehenden Schleimhautfalten zu geben vermag, ist unleugbar. Ebenso wahr ist aber auch, dass die Einführung der Trichter ohne Cocain selbst bei ganz gerader Nase zum mindesten sehr unangenehm ja schmerzhaft und öfters mit Blutungen verbunden ist.

Als einer weiteren Untersuchungsmethode muss der Palpation mit dem Finger oder der Sonde gedacht werden.

Wenn dieselbe auch durch die verschiedenen Inspectionsmethoden einigermassen an Gewicht verloren hat, so ist dieselbe doch bei vielen Kranken namentlich bei Kindern unersetzlich und zur Vervollständigung und Ergänzung der Untersuchung besonders zur Aufsuchung von Fremdkörpern sowie zur Constatirung des Sitzes, der Ausbreitung, der Consistenz von Tumoren, Abscessen etc. unentbehrlich. Es bedarf allerdings einiger Uebung, um sich über das Gefühlte Rechenschaft geben zu können, zumal die Untersuchung möglichst schnell und schonend vorgenommen werden muss. Bei der Digitaluntersuchung des Nasenrachenraumes geht es selbst bei grösster Schonung in der Regel nicht ohne Blutung ab. Der zu Untersuchende sitzt auf einem Stuhle und wird am Kopfe mit der linken Hand fixirt; sodann bringt man womöglich im Momente der Inspiration den Zeigefinger der rechten Hand rasch zwischen Uvula und Gaumenbögen auf die Rückfläche des Velum, das sich sofort contrahirt und den Finger einklemmt. Nach einigen Augenblicken hört die Contraction auf, wenn nicht, dann lässt man trotz derselben den Finger längs der Hinterwand gegen das Rachendach vordringen; man fühlt dabei die Tubenwülste, die etwas in die Rachenhöhle vorspringenden untern Muscheln, überzeugt sich dann von dem Verhalten des Fornix und geht auf der andern Seite wieder zurück. Hauptsächlich achte man darauf, ob der Raum zwischen beiden Tubenwülsten sowie das Rachendach glatt und eben ist.

Allgemeine Therapie.

Die bei der Behandlung der Pharynxkrankheiten zur Verwendung kommenden Heilmittel kann man in zwei Gruppen eintheilen: in solche, welche von der Haut, und solche, welche von der Schleimhaut aus applicirt werden.

Unter den externen Methoden nehmen die Halsumschläge die erste Stelle ein.

Man unterscheidet abkühlende oder kalte, und erregende oder erwärmende Umschläge.

Kalte oder abkühlende Halsumschläge werden entweder durch häufigen Wechsel mit ganz frischem oder mit Eiswasser getränkten Compressen oder durch Auflegen eines Eisbeutels oder der eigens construirten Cravatte hergestellt. Diese stellt einen etwa handbreiten länglichen Gummisack vor, welcher entweder mit kleinen Eisstücken gefüllt oder von kaltem Wasser durchspült wird. Das letztere ist auch der Fall bei den Leiter'schen Röhren, die mit einer Wasserleitung in Verbindung gesetzt werden. Man hat vielfach die temperaturherabsetzende Wirkung dieser Umschläge bezweifelt und dieselben ganz verworfen. Wenn auch bei dem ausserordentlichen Blutreichthum der Halsregion eine Abkühlung der tiefern Theile besonders der Schleimhaut nur bei längerer Anwendung sehr niedriger Temperaturgrade zu erzielen ist, so steht doch fest, dass durch die Contraction der grösseren und kleineren Arterien des Halses die Blutzufuhr zu den Verästelungen der Carotis und zu den Gebilden des Rachens und Kehlkopfes vermindert und deren Temperatur herabgesetzt werden kann, wie die schönen Versuche von Winternitz beweisen. Die kalten Umschläge und der innerliche Gebrauch des Eises in Form von Eispillen, Fruchteis, Eislimonade etc. sind indicirt bei allen acuten entzündlichen und irritativen Processen des Rachens und des Kehlkopfes, besonders bei Phlegmone, Croup und Diphtherie.

Viel populärer und verbreiteter sind die warmen oder erregenden Umschläge. Man stellt sie in der einfachsten Weise dadurch her, dass man ein in kaltes Wasser getauchtes, gut ausgerungenes Taschentuch oder Handtuch um den Hals legt und entweder mit einem impermeablen Stoff, Guttaperchapapier, Wachsleinwand etc. oder mit einem einfachen trockenen wollenen Tuch umwickelt. Im Handel kommen jetzt auch eigens präparirte Halsumschläge vor, die man nur mit Wasser zu benetzen und dann umzubinden braucht. Die Erneuerung soll nur stattfinden, wenn die Feuchtigkeit verdunstet, der Umschlag also nahezu trocken ist. Nach Winternitz scheint sich die Frage, ob es besser sei, ein impermeables wasserdichtes Medium über dem Umschlage zu befestigen oder ein einfaches trockenes Tuch, zu Gunsten des letzteren zu entscheiden. Abgesehen davon, dass die Erweiterung der Hautgefässe bei der allmählichen Vertrocknung ohne impermeable Hülle eine mächtigere zu sein scheint, ruft die Bedeckung mit wasserdichten Stoffen durch Behinderung der Hautperspiration sehr oft ein unbehagliches ängstliches Gefühl und

lästige Hautausschläge hervor, während zu gleicher Zeit die Hyperämie der Haut sich nach einiger Zeit ganz verliert. Heisse, erregende Halsumschläge werden durch Eintauchen von Tüchern in heisses Wasser oder Camillenthee hergestellt oder in der Form der feuchten Breiumschläge, der Cataplasmen angewendet. Die erregenden Umschläge bewirken durch die Gefässerweiterung in den peripheren Hautschichten ein Sinken der Temperatur in den entzündeten Partien der Schleimhaut, auch wird die Verflüssigung der Secrete durch dieselben begünstigt. Sie sind überall indicirt, wo es gilt, die Resorption entzündlicher Producte zu befördern, also in den spätern Stadien der acuten Entzündungen; heisse Umschläge, Cataplasmen, dienen hauptsächlich zur Beschleunigung der Eiterbildung bei Phlegmone des Rachens und des peritonsillären oder retropharyngealen Bindegewebes.

Die bei Gebildeten und Ungebildeten noch in so hohem Ansehen stehenden heissen Oel- und Fettumschläge sowie das Umbinden von Speckschwarten sind unappetitlich und haben vor den Wasserumschlägen nicht das Geringste voraus.

Einreibungen medicamentöser besonders quecksilber- und jodhaltiger Lanolin-Salben sind bei der erwiesenen Resorptionsfähigkeit dieser Stoffe nicht zu verwerfen. Einreibungen von reizenden Stoffen besonders Pustelsalben auf die Haut des Halses, Vesicatore, Senfteige etc. werden mit Recht als antiquirt nur noch selten verordnet.

Von unstreitigem Nutzen ist die cutane oder endopharyngeale Application der Elektricität, theils des constanten, theils des inducirten Stromes. Man bedient sich dazu am besten der Kehlkopfelektrode. Von sehr zweifelhaftem Werthe ist hingegen die Massage. So segensreich dieselbe auch bei Gelenkaffectionen, schweren Verletzungen etc. ist, so wenig leistet sie bei der Behandlung der Rachenaffectionen, wenn auch einige allzu begeisterte Anhänger acute Anginen und Mandelhypertrophien mit derselben schnell zum Schwinden bringen wollen.

Von Blutentziehungen macht man heutzutage wenig Gebrauch mehr. Dass Aderlässe bei Krankheiten des Rachens und Kehlkopfes nutzlos sind, ist jetzt sicher erwiesen. Von localen Blutentziehungen kommen die Blutegel noch am ehesten in Betracht. Man setzt dieselben gewöhnlich in den Winkel zwischen Unterkiefer und Process. mastoideus; die Urtheile über den Werth derselben sind jedoch sehr verschieden. Nach M. Mackenzie muss man beiderseits mindestens 3—6 Stück appliciren, wenn man überhaupt einen Erfolg sehen will.

Scarificationen der Schleimhaut lassen sich bei der Dignität der Rachengebilde meist nur an den Tonsillen vornehmen; es ist nicht zu leugnen, dass durch dieselben eine wesentliche Erleichterung erzielt werden kann.

Unter den Mitteln, welche auf die Schleimhaut des Rachens applicirt werden, spielen die Gurgelwässer oder Gargarismen noch heute die wichtigste Rolle. Wenn man tagtäglich sieht, bei welchen

Krankheiten des Rachens und Kehlkopfes Gurgelungen verordnet und von den Patienten monatelang ohne jeglichen Nutzen gebraucht werden, dann muss man staunen, wie gering noch im Allgemeinen das Verständniss für eine zielbewusste Therapie ist. Zum mindesten sollte man doch wissen, welche Theile des Rachens von dem Gargarisma bespült werden. Durch zahlreiche Versuche, die Verfasser und Andere mit färbenden Substanzen anstellten, lässt sich constatiren, dass bei grösstmöglicher Fertigkeit die vordere Fläche des weichen Gaumens, die Tonsillen und ein kleines, je nach der Bauart des Rachens verschieden umfangreiches Stück der Hinterwand der Pars oralis mit dem Gurgelwasser wirklich in Contact tritt.

Daraus ergibt sich, dass Gurgelwässer einzig und allein bei Affectionen der den Isthmus faucium bildenden Organe indicirt sind.

Nicht gleichgiltig ist die Temperatur der Gurgelwässer. Im Allgemeinen gilt als Grundsatz, dass bei allen acuten, besonders phlegmonösen Processen im Anfang die Flüssigkeit kalt oder mit Eis vermischt anzuwenden ist; mit dem Nachlass der Erscheinungen, oder wenn die Kälte unangenehm empfunden wird, soll die Temperatur des Gargarisma eine höhere werden, lauwarm oder sehr warm, letzteres, wenn es gilt, Abscesse zur Reife zu bringen oder demarkirende Eiterung zu erzeugen und die Resorption entzündlicher Producte zu beschleunigen.

Eine andere sehr verbreitete Methode ist die Application zerstäubter Flüssigkeiten mittelst Inhalationsapparate oder Sprays. Während die Meisten dieselben für unentbehrlich halten, verwerfen Andere sie als völlig nutzlos. Wenn Verfasser auch behauptet, dass man mittelst Inhalation allein niemals im Stande ist, chronische Rachenaffectionen zu heilen, so wendet er dieselben doch sehr viel als Palliativ zur Befeuchtung und Reinigung sowie zur Desinfection der Schleimhaut an, auch soll damit der Nutzen richtig angewendeter Inhalationen bei acuten Affectionen, so z. B. bei Diphtherie nicht geleugnet werden.

Verfasser gibt bei chronischen Affectionen dem kalten oder Ballonspray den Vorzug, einestheils wegen der Bequemlichkeit und der Möglichkeit, der Inhalationsflüssigkeit die verschiedensten Temperaturgrade zu geben, anderntheils deswegen, weil die mit der Schleimhaut in Contact tretende Flüssigkeitsmenge eine grössere ist als bei den feinen nebelartig zerstäubenden Dampfinhalatoren. Ganz besonders zu empfehlen sind jene Zerstäuber, welche mit einem langen metallenen Mundrohre und einem verstellbaren Ansatzstücke versehen sind, so dass einestheils die Pars oralis und Pars nasalis und anderntheils die Pars laryngea und der Kehlkopf sicher von dem gerade nach hinten, nach oben oder unten gerichteten Strahle getroffen wird. Die einfachste Methode der Reinigung des Nasenrachenraumes ist das Einziehen kochsalz- oder natronhaltiger Flüssigkeit durch die Nase bei nach rückwärts geneigtem Kopfe. Die übrigen Methoden werden bei den Krankheiten der Nase besprochen werden.

Zu den wirksamsten Mitteln gehören die Bepinselungen und Touchirungen der Schleimhaut mit flüssigen oder festen Substanzen.

Man benützt zu den ersteren gerade an einem Holzstiele oder gekrümmte an einem Metallstiele befestigte Pinsel aus weichen Dachs- oder Marderhaaren. Der Effect hängt nicht nur von der Wahl der zu verwendenden Stoffe, sondern auch von der energischen und geschickten Führung des Pinsels ab, der sehr oft allzuschüchtern und in wahren Miniaturexemplaren gehandhabt wird. Dass zur Touchirung der Pars laryngea der Pinsel eine grössere, zu der des Nasenrachenraumes eine kürzere Biegung haben muss, ist selbstverständlich. Sehr praktisch ist auch die Touchirung mittelst eines Stückchens feinen Schwammes oder Watte, welche in eine Klemmpincette eingelegt oder an einem Holzstäbchen befestigt wird.

Die am häufigsten zur Verwendung kommenden Stoffe sind Tannin, Argent. nitr., Jodlösungen, Sublimat etc.

Zur localen Anästhesie benützt man jetzt vorzugsweise das Cocain in 5—20% Lösung; die speciellen Indicationen werden bei den einzelnen Krankheiten ihre Besprechung finden. Die übrigen Anästhetica: Bromkali, Tinct. opii, Menthol in 20% Lösung mit Ol. olivar., sowie das Rhigolin stehen an Wirksamkeit dem Cocain weit nach.

Bei Cauterisationen mit Lapis in Substanz achte man besonders auf gute Befestigung desselben; die gewöhnlichen Lapisträger sollten von Anfängern wegen der Gefahr des Abbrechens des Stiftes ganz vermieden und durch Eisendrähte, an welche bei jedesmaligem Gebrauche ein kleines Stück angeschmolzen wird oder durch den in Holz gefassten Heller'schen Lapisstift ersetzt werden. Sehr beliebt ist neuerdings die Chromsäure geworden; sie wird an eine Silbersonde oder Platinöse angeschmolzen, so dass diese von einer gleichmässigen rothen Perle überzogen erscheint; die Erhitzung soll langsam vor sich gehen; bei zu schneller Erhitzung bildet sich nichtätzendes Chromoxyd; die zu cauterisirenden Theile müssen zuvor gereinigt und nach der Cauterisation mit Sodalösung neutralisirt werden.

Arzneimittel können ferner auch in Pulverform applicirt werden. Man benützt dazu Pulverbläser oder Insufflatoren, die entweder in einen Ballon oder in einen $^1/_2$ m langen Gummischlauch mit Mundstück enden und mit einer durch einen Schieber zu öffnenden Vertiefung versehen sind, in welche das betreffende Medicament eingeschüttet wird. Ganz besonders empfiehlt sich das von Bresgen verbesserte zerlegbare und mit einem Ventil versehene Insufflationsrohr.

Bei der geringen Auswahl stärkerer nicht zerfliessender Aetzmittel muss die Einführung der Galvanokaustik in die Therapie der Rachen-, Kehlkopf- und Nasenerkrankungen als ein äusserst segensreicher Fortschritt bezeichnet werden. Ueber die Indicationen derselben wird der Leser bei den einzelnen Krankheiten das Nähere finden; hier können nur einige Bemerkungen über das Instrumentarium Platz finden. Ohne die Verdienste anderer Forscher, besonders von Bruns, Hedinger, Voltolini im Geringsten zu unterschätzen, glaubt der Verfasser doch durch seine Instrumente für galvanokaustische Operationen in Nase, Rachen und Kehlkopf einem entschiedenen Bedürfnisse

Fig. 3. Universalhandgriff von Schech für galvanokaustische Operationen in Rachen, Nase und Kehlkopf.

a. Schlinge; b. spitziger Cauter zur Stichelung der Muscheln; c. d. e. Cauteren für Granula und hypertrophische Seitenstränge; f. Flachbrenner zum Ueberstreichen der Muskeln.

abgeholfen und dadurch der Verbreitung der Galvanokaustik Vorschub geleistet zu haben; Verfasser kann sich wenigstens schmeicheln, dass sein Instrumentarium allerorten in Deutschland und namentlich auch in England bei Morell Mackenzie, Semon etc. Eingang gefunden hat.

Figur 3 zeigt des Verfassers Universalhandgriff, in welchen nicht nur alle soliden Cauteren, sondern auch alle Röhren für die Schlingen eingelassen werden. Der drehbare Elfenbeinring hinten ist für die Aufnahme des Daumens, der ebenfalls aus Elfenbein gearbeitete feststehende Ring unten für den dritten, die drückerartige Schliessungsvorrichtung davor für den vierten und der bewegliche Ring oben mit dem Schlitten und Querbalken für den Zeigefinger bestimmt. Die Leitungsschnüre treten auf der unteren Fläche ein, wodurch die Schwere derselben einigermassen paralysirt und eine sichere Führung des Instrumentes ermöglicht wird. Soll der Handgriff für galvanokaustische Messer gebraucht werden, dann wird der Schlitten durch die an seinem hinteren Ende angebrachte Schraube festgestellt und der Ring als Stützpunkt für den Zeigefinger benützt.

In Figur 3 sind auch einige der gebräuchlichsten in Rachen und Nase zur Verwendung kommenden Ansätze abgebildet. So stellt *a* die Schlinge für die Nase, *b* einen spitzigen Cauter zum Furchenziehen oder der galvanokaustischen Stichelung der Nasenmuscheln, *c*, *d*, *e* Brenner zur Zerstörung der Granulationen und Seitenstränge, *f* einen Flachbrenner für die Muscheln vor.

In dem von dem Universitätsmechaniker Eugen Albrecht in Tübingen um den Preis von 80 Mark nach meiner Angabe zusammengestellten Etui mit zwei Handgriffen befindet sich eine grosse Anzahl (15) Brenner von allen möglichen Formen und Biegungen für Rachen, Nase und Kehlkopf in musterhafter Ausführung. Das kleinere Etui mit dem Universalhandgriff und 8 Ansätzen kostet 48 Mark.

Unter den zahlreichen galvanokaustischen Batterien kann Verfasser besonders die zweielementige Bruns'sche Zinkkohlentauchbatterie, die mit Chromsäure gespeist und ebenfalls von E. Albrecht für 90 Mark geliefert wird, bestens empfehlen. Sie ist in Figur 4 abgebildet; *a* und *c*



Fig. 4.
Zweielementige Zinkkohlentauchbatterie nach von Bruns.

sind zwei sehr kräftige Zinksterne, *b* und *d* je vier mit einander verbundene Kohlenplatten; *b c* ist die Verbindung zwischen den beiden Elementen; die eine Leitungsschnur wird in *a* eingehängt, die andere in *d*. Die Batterie kann in einem Kasten aufbewahrt oder auf Rollen gestellt und so transportabler gemacht werden. Die Menge der Erregungsflüssigkeit, welche zur Füllung eines Elementes erforderlich ist, beträgt 4 Liter. Die schwache Lösung enthält in je 4 Liter 250 Gramm Kali bichromicum und 500 Gramm englische Schwefelsäure von 1·83 specif. Gewicht. Die starke Lösung enthält in derselben Flüssigkeitsmenge 500 Gramm Kali bichromicum und 1000 Gramm Schwefelsäure. Die Stärke des Stromes wird regulirt durch mehr oder weniger tiefes Eintauchen der Elemente in die Erregungsflüssigkeit. Ein sehr grosser Vortheil der Batterie ist ihre Einfachheit, leichte Zerlegbarkeit und die bei täglichem Gebrauche nur alle 4—6 Wochen nöthige Neufüllung.

Die Mängel aller, selbst der besten Batterien, geringe Constanz, Umständlichkeit der Füllung, Abnutzung der Zinke, lassen es sehr wünschenswerth erscheinen, dass die Glühhitze auf anderem Wege erzeugt werde. Bei den ausserordentlichen Fortschritten, welche die Elektrotechnik in den letzten Jahren machte, steht zu hoffen, dass die Schwierigkeiten nicht unüberwindlich sind. So befriedigend auch die von Bayer in Brüssel und Semon in London mitgetheilten Resultate mit Accumulatoren sind, so bedarf es doch noch weiterer Versuche, bis dieselben zur allgemeinen Einführung empfohlen werden können.

Sehr wenig Eingang hat sich bis jetzt die Elektrolyse resp. Elektropunctur verschaffen können. Neuerdings wurde sie wieder von Voltolini, Michel und Keimer zur Entfernung sehr blutreicher Neubildungen, besonders von Angiomen, Teleangiectasien in Mund, Rachen, Kehlkopf, ferner bei sehr blutreichen Geschwülsten des Nasenrachenraumes, von Schäffer auch bei Struma und Lymphomen des Halses empfohlen. Die Elektrolyse wirkt theils ätzend auf die Gewebe theils coagulirend auf den Inhalt der Gefässe. Die Behandlungsdauer ist je nach der Grösse und Beschaffenheit des zu behandelnden Objectes sehr verschieden doch meist sehr lang. Immerhin verdient die Methode bei den obengenannten Affectionen volle Beachtung.

Missbildungen, angeborne und erworbene Formfehler und sonstige Anomalien.

Unter den angeborenen Formfehlern sind die Spaltbildungen die häufigsten.

Sie erstrecken sich von den Schneidezähnen bis zum harten und weichen Gaumen und sind unter dem Namen Wolfsrachen bekannt. Ausserdem gibt es noch seitliche Gaumenspalten, die entweder nur den Knochen oder die Weichtheile betreffen.

Ferner können durch abnorme Processe der knöchernen Wandungen des Pharynx mannigfache Formanomalien und functionelle Störungen erzeugt werden.

Beginnen wir an der Schädelbasis so begegnen wir zuerst einer abnormen Länge der Proc. styloid. Derartige Fälle sind anatomischerseits von W. Gruber, klinischerseits von Lücke und Weinlechner beschrieben. Solche abnorm lange Griffelfortsätze sowie die Verknöcherungen des Ligam. styloid. können dadurch, dass sie bis an die Hinterfläche der Gaumenmandeln herabreichen oder seitlich verbogen sind, zu abnormen Sensationen und dauernden Schluckbeschwerden Anlass geben, die Weinlechner in einem Falle durch Abbrechen des betreffenden Knochenfortsatzes beseitigen konnte.

Nicht gar selten werden durch Exostosen der Halswirbel sowie durch Lordose oder durch Defectbildung eines Halswirbels mit Erkrankung der Wirbelsäule Schlingbeschwerden erzeugt, die zuweilen durch das Tragen einer passenden Cravatte behoben werden können. (Heymann.)

Wenden wir uns zu den Abnormitäten der Weichtheile des Rachens, so begegnen wir den congenitalen oder erworbenen Defecten des ganzen weichen Gaumens, angeborner oder erworbener Durchlöcherung der vorderen oder hinteren Gaumenbögen, dem Fehlen der Uvula. Von den erworbenen Anomalien verdienen die später noch zu besprechenden Perforationen des Velum einstweilen Erwähnung.

Die Uvula kann angeboren abnorm klein oder auffallend gross sein, sie ist entweder in Verbindung mit dem Velum oder für sich allein gespalten und finden sich von der gewöhnlichen Einkerbung bis zum ausgesprochenen Wolfsrachen alle Uebergänge.

Nicht zu verwechseln damit ist die Uvula bifida, bei der die untern Enden leyerschwanzartig von einander abstehen oder einander anliegen. In letzterem Falle muss man dieselben mit der Sonde trennen, um zu ermitteln, wie hoch die Spaltung gegen die Basis hinaufreicht. Die totalen Spaltungen der Uvula können durch zu weites Offenstehen des Isthmus pharyngonasalis nasales Timbre bedingen, welche Erscheinung auch den bereits erwähnten Perforationen und Defecten in erhöhtem Grade zukommt. Je grösser die Oeffnung desto deutlicher treten auch die Beschwerden der Deglutition und Phonation hervor. Sehr oft ist die Uvula in Folge vorausgegangener Ulcerationen geknickt, verzerrt und nach verschiedenen Richtungen verzogen; einmal sah Verfasser ohne gleichzeitigen Wolfsrachen zwei Uvulae, welche wahrscheinlich durch Spaltung einer entstanden und 2 cm von einander entfernt waren.

Als weitere Anomalie muss das Fehlen der Mandeln und ihre rudimentäre Entwicklung erwähnt werden; relativ häufig ist die Einlagerung eines Theiles der Tonsille in den hintern Gaumenbogen oder die hintere Rachenwand. Jurasz sah einmal eine Tonsilla pendula, welche mit einem schmalen Stiele am hintern Gaumenbogen aufsass

und in den unteren Rachenraum hinabhing, ferner eine Tonsilla accessoria auf dem obern Theile der Plica salpingopharyngea.

Zu den häufigsten acquirirten Formfehlern gehören die Verengerungen des Pharynx in Folge von Narbenstrictur.

Aetiologisch kommen in Betracht die im Gefolge der Syphilis, des Lupus, der Tuberculose, der Diphtherie auftretenden Geschwüre, sowie Verbrühungen und Verätzungen der Schleimhaut.

Der Nasenrachenraum ist in seltenen Fällen durch eine, wie Schrötter meint, von den verticalen Theilen des Gaumenbeins ausgehende Knochenlamelle einseitig oder doppelseitig von den Choanen geschieden (knöcherner Choanenverschluss); auch Theilungen des Nasenrachenraumes durch ein bis zur Wirbelsäule vorgeschobenes Septum narium sind beobachtet. Schrötter beschrieb ferner mehrere Fälle von partiellem oder totalem membranösen Verschluss der Choanen in Folge von Syphilis und Störk'scher Blennorrhoe.

Nicht selten kommt es hauptsächlich bei syphilitischen, diphtheritischen, scrophulösen Geschwüren mit Zerstörung des Tubenknorpels zu mehr oder weniger vollständigem Verschluss der Tubenmündungen; zuweilen in Folge heftiger nasaler Exspiration zu symmetrischer Dilatation der Rosenmüller'schen Gruben (Pertik).

Am meisten aber interessiren den Praktiker die Verwachsungen des weichen Gaumens mit der hintern Rachenwand.

Die häufigste ist die partielle einseitige oder doppelseitige; die Anlöthung beginnt in der Regel von dem untern Theile des hintern Gaumenbogens und schreitet von da auf den mittleren Theil des Velum und die Uvula weiter. Die einfachste Form ist die, dass die hintere Fläche des Arc. palatoph. mit der Schlundwand in Verbindung tritt. Dass dadurch der Pharynx die mannigfaltigsten oft wunderlichsten Formen annimmt, ist leicht verständlich, zumal mit der Anlöthung und mehr oder weniger deutlichen Horizontalstellung der Gaumenbögen noch weitere durch Narben der Hinterwand erzeugte Verschiebungen verbunden sein können. Sehr oft ist die Uvula intact und bleibt hinter derselben eine kaum bleistiftdicke Communicationsöffnung bestehen.

Die Störungen der partiellen Verwachsungen beschränken sich meist auf die Sprache, welche klangarm und nasal erscheint, und auf erschwerte Respiration durch die Nase, seltener auf Behinderung der Deglutition.

Totale Verwachsungen des weichen Gaumens mit vollständigem Abschlusse des Nasenrachenraumes gehören zu den Seltenheiten. Durch den completen Verschluss geht der Geruch und der Geschmack verloren und zu den obenerwähnten Beschwerden gesellt sich noch eine gewisse durch das Offenhalten des Mundes bedingte Verblödung des Gesichtsausdruckes, Trockenheit der Mundhöhle, Belegtheit der Zunge, unruhiger Schlaf. Die Sprache ist nicht nur nasal sondern auch oft nahezu unverständlich; öfters besteht gleichzeitig Tubenverschluss.

Betrachten wir die Anomalien der hintern Rachenwand so finden sich meist in Folge von Syphilis ausgebreitete weisse strahlige Narben und leistenartige Kämme, welche von der Pars oralis nach oben und unten auslaufen; Verfasser sah ferner einmal in Folge von Syphilis die hintere Rachenwand in grosser Ausdehnung durch eine mediane narbig hypertrophische Leiste förmlich in zwei Hälften getheilt, ein anderesmal die vom Velum abgetrennte Uvula auf der Hinterwand festgewachsen, sehr oft auf die Rückfläche des Velum fixirt.

In den tieferen Abschnitten des Pharynx sind Stricturen viel seltener.

Wie Verfasser schon früher hervorhob, sind die Bilder, welche solche tiefsitzende Stricturen geben, sehr verschieden und zuweilen erst nach wiederholten Untersuchungen verständlich, besonders wenn Wucherungen und Abschnürungen an der Zunge oder den Narbenrändern vorhanden sind.

Zu den einfachen Formen gehören jene, bei denen die Rachenhöhle in geringerer oder grösserer Ausdehnung durch eine von der Hinterwand oder den Seitentheilen bis zur Zungenbasis sich erstreckende Membran überbrückt wird. Es wird dadurch die eine Hälfte des Kehlkopfes verdeckt oder es bleibt eine bald mehr central bald mehr peripher gelegene verschieden oft nur noch stecknadelkopfgrosse Oeffnung übrig, durch welche man entweder nichts oder Theile des normalen oder gleichfalls veränderten Kehlkopfes wahrnimmt. Manchmal ragt ein Theil der hohlsondenartig comprimirten Epiglottis aus der noch restirenden Oeffnung empor, manchmal sind die Ränder des Kehldeckels mit jenen der Oeffnung selbst verwachsen und durch Verdickung und Verzerrung kaum als der Epiglottis angehörig zu erkennen. Solch ausgedehnte ringförmige Stenosen gehen aus tiefen syphilitischen Ulcerationen der hinteren und seitlichen Pharynxwand und des Zungengrundes hervor. Nicht selten sind membranartige Verwachsungen an der Zungenbasis mit partieller oder totaler Verwachsung des weichen Gaumens combinirt, so dass der Rachen in drei selbstständige Theile zerlegt erscheint.

Sehr complicirte Bilder geben jene Fälle, bei denen Narbenstränge brücken- und gitterartig die Rachenhöhle durchziehen oder wie Coulissen sich in das Lumen derselben hineindrängen.

Die durch diese verschiedenen Stricturen hervorgebrachten Störungen beziehen sich meist auf die Deglutition. Abgesehen von der Unmöglichkeit, grössere Bissen durchpassiren zu lassen, gelingt sehr oft nicht einmal das Schlingen kleinerer oder wenn, nur mit Aufwand vieler Mühe und Zeit, einestheils weil die Hauptmasse des Bissens zwischen den Narbensträngen und den dadurch gebildeten Taschen hängen bleibt, anderntheils weil durch die Umwandlung der Schleimhaut in Narbengewebe zahlreiche der Befeuchtung des Schlundes dienende Drüsen verödet und unter der Schleimhaut liegende Muskelfasern contractionsunfähig geworden sind. In hochgradigeren Fällen können die Kranken nur noch Flüssigkeiten zu sich nehmen, doch

wird durch Uebung und Geschicklichkeit mit der Zeit das Schluckhinderniss theilweise überwunden. Störungen der Respiration müssen selbstverständlich in allen jenen Fällen eintreten, bei denen die Communication mit dem Kehlkopfe in beträchtlicherem Grade behindert ist; auch kann durch das Steckenbleiben eines zu grossen Bissens in der Communicationsöffnung plötzliche Asphyxie auftreten.

Die Prognose der durch Narbenstricturen erzeugten Pharynxstenosen richtet sich nach dem Grade und dem Sitze und ist durch die Vervollkommnung der laryngoskopischen Technik gegen früher eine viel günstigere geworden; immerhin bleibt ein Theil der Fälle ungeheilt oder nur zeitweise gebessert.

Die Behandlung der Pharynxstricturen sei natürlich womöglich zuerst eine prophylaktische; durch sorgfältige Allgemein- und Localbehandlung der Geschwüre, durch Einlegen von Tampons wird man noch am ehesten im Stande sein, die Verwachsung gegenüberliegender epithelloser Flächen zu verhindern oder schon bestehende frische Adhäsionen zu lösen. Ist die Stenose aber schon älter, dann können verschiedene Wege eingeschlagen werden.

Bei Verwachsungen der Tubenmündungen hat man forcirte Lufteinreibungen, das Einführen von Bougies sowie die Durchschneidung der vordern Wand der Tuba empfohlen; leider sind diese Proceduren alle sehr unzuverlässig. Bei vollständiger Verwachsung des Tubeneingangs empfiehlt sich zur Beseitigung der Taubheit die Perforation des Trommelfells eventuell mit Exstirpation des Hammers und Eintreibung von Luft durch den äussern Gehörgang.

Die knöcherne Obliteration der Choanen kann von der Nase aus mittelst des Galvanokauters oder eines Troicarts oder Meissels beseitigt werden, die Verlängerung des Septum nach hinten durch Ausbrechen mittelst einer Knochenscheere oder des Verfassers Choanenzange.

Die membranösen Verwachsungen der Choanen werden am besten durch den von der Nase oder vom Rachen aus eingeführten Galvanokauter durchbrochen und durch eingelegte Metallbougies offengehalten. Schrötter bindet zu diesem Zwecke die in die Nase eingelegten Metallbougies vorne durch einen Faden zusammen, so dass durch das Auseinanderweichen ihrer hinteren Enden ein fortwährender Druck auf die seitlichen Wandungen der künstlich geschaffenen Oeffnung ausgeübt wird.

Partielle Verwachsungen des weichen Gaumens bedürfen keiner Behandlung, da sie in der Regel keine namhaften Beschwerden verursachen.

Anders ist dies bei den totalen Verwachsungen. Hier muss der weiche Gaumen von der Hinterwand abgetrennt, die Ränder des ersteren umsäumt und die Wiederverwachsung hindernde Bougies eingelegt werden. Man benützt dazu am besten dicke durch die Nase gezogene Kautschukdrainagen oder nach Kuhn eine die ganze Breite des Rachens einnehmende nach vorne convexe Hartkautschuk- oder Silberplatte, welche durch eine federnde Vorrichtung an zwei gegen-

überliegenden oberen Backzähnen befestigt werden kann. Lublinski wölbt mittelst eines durch die Nase eingeführten Katheters das Gaumensegel vor, schneidet es ein und legt durch den klaffenden Spalt passende Bougies oder Bleisonden ein, die täglich längere Zeit hindurch liegen bleiben. Die Excision des Gaumensegels ist nach Ried angezeigt bei hochgradigen Flächenverwachsungen oder da, wo eine Ablösung des Gaumensegels zu schwierig wäre. Complete mit Perforation des Velum verbundene Verwachsungen lässt man am besten unbehelligt.

Die Resultate sind in Bezug auf Wiederherstellung der Nasenathmung in der Regel günstig, wenn auch die Tendenz zu nochmaliger Verengerung eine ausgesprochene ist und öfters eine zweite Operation nöthig wird. Sehr unbefriedigend jedoch sind meist die Erfolge in Bezug auf Verbesserung und Wiederherstellung der Sprache. Der Grund liegt hauptsächlich in der Schwierigkeit, dem Gaumensegel die normale Länge und Beweglichkeit wiederzugeben, zumal wenn die Muskeln bereits atrophirt sind und die Schleimhaut durch bindegewebige Narben unnachgiebig geworden ist.

Die Behandlung der membranösen Verwachsungen der tieferen Rachengebilde richtet sich nach der Intensität und Form der Stenose. Am einfachsten ist die Durchtrennung und Excision der Membranen von der noch bestehenden Oeffnung aus durch geknöpfte Messer oder Scheeren unter Leitung des Kehlkopfspiegels. Zur Entfernung grösserer Vorsprünge und Vegetationen eignet sich am besten die Glühschlinge. Die Nachbehandlung besteht in fleissiger Reinigung der Wundflächen und dem längeren Liegenlassen der Schrötter'schen Dilatationsrohre. Recidiven sind jedoch auch hiebei nicht ausgeschlossen.

Hinsichtlich der Behandlung des Wolfsrachens und der anderen meist angeborenen Anomalien sowie die Ausführung der plastischen Operationen muss auf die Lehrbücher. der Chirurgie verwiesen werden; doch sei bemerkt, dass die durch Defecte und Spaltungen des harten und weichen Gaumens verursachten Sprachstörungen zuweilen durch Obturatoren beseitigt oder doch gebessert werden können und dass der operative Verschluss erworbener Defecte meist sehr günstige Resultate liefert.

Ausser Verengerungen kommen aber auch Erweiterungen des Pharynx zuweilen vor.

Weiten geräumigen Rachen findet man sehr häufig bei chronischen Katarrhen, wenn die Schleimhaut in ausgedehntem Grade atrophisch geworden ist. Ringförmige Erweiterung oberhalb einer verengerten Stelle ist selten.

Zu den seltensten Vorkommnissen aber gehört die partielle Erweiterung des Pharynx, die Pharyngocele.

Man versteht darunter eine mehr oder weniger hochgradige meist einseitige, den untern hintern oder seitlichen Pharynxabschnitt und den Anfangstheil des Oesophagus betreffende sackartige Erweiterung, in welcher die Speisen zurückgehalten werden. Die Geschwulst

ist bei seitlicher Entwicklung auch aussen am Halse neben dem Kehlkopfe bis zum Unterkieferwinkel hinauf sicht- und fühlbar. Ist der Divertikel mit Luft gefüllt, dann erscheint die Geschwulst elastisch, comprimirbar; ist er hingegen durch Speisen ausgedehnt, dann fühlt er sich hart oder teigig an. Als Ursache beschuldigt man Missbrauch der Stimme, Spielen von Blasinstrumenten; doch kommt die Pharyngocele auch angeboren vor; möglicherweise spielen auch Verletzungen und Atrophie der Muskeln eine Rolle.

Die Symptome betreffen meistentheils die Deglutition. Ist der Divertikel gefüllt, dann ist das Schlingen in hohem Grade behindert oder ganz unmöglich. Ist der Divertikel aber leer oder durch Druck von aussen seines Inhaltes beraubt worden, dann geht das Schlingen anstandslos von Statten.

Die Diagnose stützt sich einestheils auf den häufigen Wechsel der Erscheinungen und die Anwesenheit einer comprimirbaren Geschwulst, anderntheils auf die laryngoskopische Untersuchung und die Sondirung.

Die Behandlung muss darauf gerichtet sein, den Divertikel zu entleeren oder die Eingangsmündung desselben zu verschliessen; meist führt jedoch nur die Exstirpation des Divertikels durch Eröffnung des Pharynx zwischen seitlichem Zungenbeinrand und Ringknorpel zur Radicalheilung.

Pharyngitis catarrhalis acuta.

Wie die Mundhöhle so wird auch der Rachen weitaus am häufigsten von katarrhalischen Entzündungen ergriffen. Man versteht unter katarrhalischer Pharyngitis (Angina catarrhalis) einen durch Röthung, sammtartige Schwellung der Schleimhaut und vermehrte Secretion sich markirenden oberflächlichen Entzündungsprocess. Nicht selten steigert sich derselbe in einzelnen Gebilden der Schleimhaut, so besonders in den Drüsen, bis zur Vereiterung und stellt dann eine Combination mit Phlegmone dar.

Die Ursachen des acuten Rachenkatarrhs sind äusserst zahlreich. Dass auf Erkältungen, Zugluft, Durchnässen der Haut, des Halses, des Nackens, ja selbst entfernterer Körpertheile, besonders der Füsse, bei vielen Personen Katarrhe der verschiedenen Schleimhäute entstehen, ist eine feststehende Thatsache. Deshalb trifft man den acuten Rachenkatarrh auch häufig in Gesellschaft einer acuten Rhinitis, Stomatitis, Laryngitis und Bronchitis oder im Vereine mit Muskel- und Gelenkrheumatismen, besonders von Torticollis und Lumbago. Unter die primären oder idiopathischen Rachenkatarrhe gehören ferner auch jene, welche durch Zufuhr zu scharfer, gewürzter, zu heisser Speisen und Getränke oder durch Einathmen heisser Dämpfe entstanden sind. Als secundäre oder symptomatische Erscheinung findet

sich der acute Rachenkatarrh im Gefolge der meisten Infectionskrankheiten, so besonders der Masern, des Scharlachs, der Rötheln, Blattern, des Typhus, der Syphilis, ferner nach Aufnahme gewisser Arzneistoffe und Gifte, so besonders der Belladonna-Präparate (Atropin), des Jodkali, Quecksilber, Antimon, der Säuren und Alkalien (toxische Angina). Die von M. Mackenzie beschriebene Angina arthritica, die sich im Verlaufe eines Gichtanfalles entwickelt, scheint auf dem Continent sehr selten zu sein; Löri erwähnt sie gleichfalls.

Wenn auch, wie oben bemerkt, der Einfluss von Erkältungen in Folge von schroffen Temperatursprüngen, rascher Abkühlung bei schwitzendem Körper unleugbar ist, so scheinen doch auch noch andere Momente bei der Entstehung acuter Rachenkatarrhe mitzuwirken. Namentlich erscheint es so gut wie sicher, dass die Angina lacunaris eine durch niedrige Organismen, pyogene Coccen, erzeugte Infectionskrankheit ist. Dafür spricht ausser dem zeitweise massenhaften Auftreten der Affection das Nacheinandererkranken verschiedener Familienglieder, namentlich solcher, welche die Kranken pflegten oder mit ihnen in demselben Raume schliefen, das Auftreten von Fieber- und Allgemeinsymptomen vor dem Erscheinen der localen Veränderungen, die Schwellung der Milz, das Mitergriffenwerden der Gelenke und die langsame Reconvalescenz. Wahrscheinlich sind es verschiedene Arten von pyogenen Mikroorganismen, welche acute lacunäre oder phlegmonöse Anginen erzeugen können; so sah Verfasser wie auch Strümpell dem Ausbruche des Gesichtserysipels eine lacunäre Angina mit consecutiver Lymphdrüsenschwellung vorausgehen, ferner einmal eine nasenkranke Dame, welche ein an lacunärer Angina leidendes Kind gepflegt hatte, an Gesichtserysipel erkranken. Dass die Mikroorganismen des Erysipels und jene der Phlegmone zuweilen dieselben Erscheinungen zur Folge haben, ist durch vielfache experimentale Untersuchungen sichergestellt. B. Fränkel, der aus dem Secrete der lacunären Angina drei Arten von Mikroorganismen gezüchtet hatte, kam zu keinem sicheren Resultate über den Infectionsträger. Er glaubt, dass die Erkältung die Gewebsveränderungen hervorrufe, die nöthig seien, um dem betreffenden Pilz die Pforten des Körpers zu erschliessen.

Entweder ist die ganze Rachenschleimhaut oder nur ein Theil derselben Sitz der Entzündung.

Localisirt sich dieselbe im Nasenrachenraum, dann ergibt die objective Untersuchung nach Entfernung der meist reichlichen Schleimmassen geringere oder stärkere Röthung und Schwellung der Schleimhaut, besonders des drüsenreichen Polsters der hinteren und oberen Wand; auch die Tubenwülste und die von ihnen ausgehenden Schleimhautfalten nehmen an der entzündlichen Schwellung Theil, die sich auch auf die Rückfläche des Velum und die Uvula erstreckt, deren Schleimhautoberfläche in Folge der Schwellung der Follikel uneben erscheint. Zuweilen vereitern die Follikel in grösserer Anzahl und verleihen der Schleimhaut ein gesprenkeltes Aussehen (Paulsen); sehr oft ist die Schleimhaut trocken und mit einem blutigen dem pneumonischen Sputum ähnlichen Schleimklumpen überzogen.

Besonders häufig erkrankten die Pars oralis und die den Isthmus faucium bildenden Theile.

Ist die längs der Wirbelsäule herabziehende Schleimhaut befallen, so findet sich oft nur ein leicht rosa oder tiefroth gefärbter Streifen auf derselben, meist aber ist die Hinterwand in eine grosse intensiv geröthete Fläche umgewandelt. Anfänglich erscheint namentlich bei den acuten Exanthemen die Schleimhaut fleckig, marmorirt, später confluiren die Flecken; ebenso erscheint die Mucosa im Beginne der Krankheit mit spärlichem Secrete bedeckt und trocken, später von dickem, zähem, glasigem, schleimeitrigem Secrete überzogen, durch Schwellung der Drüsen uneben; ab und zu findet sich auch ein grösserer an der Spitze einen gelben Eiterpunkt tragender Follikel oder ein rundliches kraterförmiges Follikulargeschwür.

Die Regio interarytaenoidea sowie die Lig. aryepigl. und die Stimmbänder zeigen sehr oft dieselben Veränderungen.

Der weiche Gaumen nimmt meistens an der Entzündung Theil. Er erscheint verdickt, mehr oder weniger geröthet und deutlich von dem viel blässeren harten Gaumen abgegrenzt. Auf geröthetem Grunde finden sich zahlreiche Gefässramificationen, ectatische Venen, selbst kleine Hämorrhagien. Die Uvula ist der Länge und der Quere nach vergrössert, in ihrem unteren Theile ödematös, ihre Spitze weicht seitlich ab oder ist hornartig gekrümmt, ihr Schleimhautüberzug milchig getrübt oder durch Schwellung der Drüsen uneben und gekörnt. Sehr oft steht die erkrankte Seite des Velum tiefer als die gesunde und bleibt bei der Phonation zurück oder ist ganz unbeweglich oder wird nach der entgegengesetzten Seite verzogen.

Die Mandeln erkranken sehr oft allein oder gemeinschaftlich mit der Hinterwand oder dem Velum.

Die einfachste Form des Tonsillarkatarrhs ist durch gleichmässige Röthung der Schleimhaut und mehr oder weniger beträchtliche Schwellung und Schleimsecretion gekennzeichnet. Anders ist das Bild, wenn die Entzündung in den Lacunen ihren Sitz aufschlägt (Angina lacunaris). Auf gleichmässig gerötheter geschwellter Schleimhaut machen sich entweder schmale weissliche oder gelbe längliche, dreieckige oft deutlich sternförmige Streifen oder rundliche Flecken bemerkbar, die an Zahl, Grösse, Form und Vertheilung den Eingangsöffnungen der Lacunen entsprechen und an der Oberfläche sehr oft zu grösseren Tropfen und Flecken confluiren. Das Secret kommt aus der Tiefe der Lacunen und besteht aus geronnenem Eiter, gequollenen Epithelien und Pilzen und lässt sich meist ohne Schwierigkeit entfernen.

Eine andere Form oder vielmehr eine Combination mit phlegmonöser Entzündung ist die Angina follicularis.

Auf einer, meist auf beiden stark gerötheten und vergrösserten Tonsillen finden sich entweder in Gruppen zusammenstehende oder unregelmässig vertheilte zum Theil confluirende weisse oder gelbe, gelbgrünliche erhabene Punkte und Flecken, welche vereiterte Drüsen-

follikel vorstellen. Im weiteren Verlaufe entstehen nach Durchbruch des Eiters je nach der Tiefe, in welche die Eiterung vorgedrungen war, oberflächliche oder tiefere kraterförmige Substanzverluste, welche rasch heilen und netzartige Narben oder schüsselförmige durch bindegewebige Brücken von einander getrennte Vertiefungen zurücklassen. In der Regel tritt die Angina follicularis wie die Angina lacunaris von Anfang an doppelseitig auf, sehr oft beginnt sie aber auch einseitig, um nach einigen Tagen auf die andere Seite überzuspringen; nicht selten entwickelt sich aus der Verschwärung einzelner Follikel ebenso aus der Angina lacunaris eine diffuse Phlegmone beider Mandeln, des Velum oder peritonsillären Bindegewebes, zuweilen tritt im Bereiche der vereiternden Follikel superficielle Nekrose und Gangrän ein; nicht selten finden sich endlich, was in dem Capitel „Pharyngitis exsudativa" ausführlicher erwähnt werden soll, über oder neben den vereiternden Follikeln echte Croupexsudate.

Unter den objectiven Erscheinungen ist bei den intensivern Erkrankungen der fieberhafte Beginn der constanteste. Entweder nach leichtem Frösteln, allgemeinem Unbehagen und Kopfweh oder nach einem deutlichen Schüttelfrost, erhöhter bis zu 40 und mehr gesteigerter Temperatur und einer Pulsfrequenz bis zu 120, bei Kindern bis zu 140, wiederholtem Erbrechen unter Unruhe, allgemeiner Abgeschlagenheit, unruhigem Schlafe, Appetitlosigkeit, vermehrtem Durst, bei Kindern nicht selten unter Convulsionen, stellen sich Schmerzen beim Schlingen ein, die beim Ergriffensein der Hinterwand hauptsächlich aber bei der lacunären und folliculären Angina am heftigsten sind. Beim acuten Retronasalkatarrh fehlen meist eigentliche Schmerzen, doch erscheint das Sprechen und Schlucken empfindlich, die Athmung durch die Nase behindert; nicht selten erkrankt das Ohr unter Ohrensausen, Schwerhörigkeit mit subjectiven Geräuschen in Folge von Tubenverschluss oder von Mittelohrentzündungen mit Perforation des Trommelfells. Ganz constant sind Klagen über Trockenheit im Halse, die jedoch meist bald gesteigerter Schleimsecretion Platz macht und zu vermehrten Schluckbewegungen und Räuspern veranlasst. Bei Mitaffection des Kehlkopfes ist Heiserkeit und Hustenreiz vorhanden. Sehr charakteristisch ist das Verhalten der Stimme; die Sprache ist klanglos, nasal, oder als ob die Kranken einen Fremdkörper im Halse hätten. Die anginöse Sprache ist wie das Regurgitiren des Genossenen grösstentheils die Folge der Functionsunfähigkeit des Gaumensegels. Sehr oft klagen die Kranken beim Kopfumdrehen über Schmerzen aussen am Halse, welche entweder durch gleichzeitige rheumatische Affection der Halsmuskeln oder durch sympathische Lymphdrüsenschwellung bedingt sind. Wirkliche Gelenkaffectionen mit Schwellung und Exsudation in die Gelenke, erythematöse oder urticariaähnliche Hautausschläge gehören zwar nach des Verfassers Beobachtungen zu den grossen Seltenheiten, sprechen aber ebenfalls für die infectiöse Natur der Krankheit.

Der acute Rachenkatarrh verläuft meist in wenigen Tagen, doch kann er bei ungeeignetem Verhalten auch längere Zeit, 10 bis

14 Tage dauern, namentlich wenn sich Complicationen, diffuse Phlegmone, Peritonsillitis oder Gelenkschwellungen einstellen.

Die Diagnose ist aus dem objectiven Befunde leicht zu stellen. Praktisch von grösster Wichtigkeit ist die Differentialdiagnose zwischen Angina lacunaris, A. follicularis und Diphtherie. Da die subjectiven Beschwerden sich vollständig mit jenen der Diphtherie decken können und auch die Lymphdrüsenschwellung bei Angina eine constante und oft sehr hochgradige ist, so muss der objective Befund im Rachen allein den Ausschlag geben. Bei Erwachsenen, bei denen Diphtherie zu den Seltenheiten gehört, spricht die gleichmässige Vertheilung und das Beschränktsein der Flecken auf die Mandeln, ihre mehr gelbe oder grüngelbe Farbe, ihre geringe Tendenz zu flächenhafter Ausbreitung, das Vorhandensein noch nicht völlig reifer eitergefüllter Follikel, die rasche Abstossung und Verkleinerung der Flecken, das baldige Sichtbarwerden schüssel- oder trichterförmiger Substanzverluste an Stelle der früheren Auflagerungen mit Bestimmtheit gegen Diphtherie. Bei Kindern ist der Entscheid zuweilen ausserordentlich schwer oder erst nach mehrtägiger Beobachtung möglich, da auch die Diphtherie lacunär und multipel beginnen kann; doch confluiren die diphtheritischen Belege sehr rasch und greifen auf die Gaumenbögen, Uvula und Hinterwand über. Einen nahezu sicheren Entscheid gibt die freilich praktisch oft kaum durchführbare mikroskopische Untersuchung der Belege, welche bei Angina aus Eiterzellen und Epithelien, bei Diphtherie aus Fibrin bestehen. Tonsilläre oder peritonsilläre Abscesse kommen bei Diphtherie nicht vor, während Paralyse des Velum ganz besonders häufig diphtheritischen Ursprungs ist. Die Behauptung, dass Erwachsene mit Lacunärangina Kinder diphtheritisch inficiren können, beruht auf falscher Diagnose; die wirkliche lacunäre Angina erzeugt keine Diphtherie.

Die Therapie muss bei der ausserordentlichen Disposition vieler Menschen für acute Rachenkatarrhe vor allen Dingen eine prophylaktische sein.

Zu einer vernünftigen Hygiene sollte freilich schon in frühester Jugend der Grund gelegt werden; allein wie sehr hier gefehlt wird, lehrt die tägliche Erfahrung; und so sehen wir denn auch, dass gerade diejenigen Kinder, welche am sorgfältigsten vor jedem kalten Luftzuge gehütet und zum Schutze gegen die Unbilden des Wetters mit möglichst vielen Tüchern umwickelt werden, ganz besonders häufig von Anginen befallen werden. Diese Verhätschelung und Luftscheu setzt sich in systematischer Weise in das Mannesalter fort und wird besonders durch die bei Beamten und Gelehrten so sehr beliebte Ueberheizung der Bureaux und Wohnräume oder den methodischen Gebrauch zu warmer Bäder namentlich der Dampfbäder, sowie mangelhafte Ventilation der Schlafräume bis zu vollständiger Erschlaffung der Haut und beständiger Neigung zu Transpiration in bedenklichster Weise gesteigert. Es mag zugegeben werden, dass auch wetterfeste Naturen und nicht in Treibhauswärme Auferzogene den Unbilden und Schwankungen der Temperatur nicht immer ungestraft trotzen, immerhin

aber kann als Grundsatz gelten, dass je kräftiger und abgehärteter die äussere Haut ist, desto seltener die Schleimhäute von entzündlichen Processen befallen werden. Dass man durch Einwirkung auf die vasomotorischen Nerven der Haut eine Aenderung der Circulation und Secretion und eine Kräftigung der Cutis bewirken kann, ist unzweifelhaft. Bei vielen zu Schleimhautkatarrhen Disponirten genügt oft schon das Tragen von Wollkleidern, um den erstrebten Zweck zu erreichen. Die Wolle verhütet am besten Schwankungen in der Oberflächentemperatur der Haut, auch saugt sie von allen Stoffen am meisten Flüssigkeit auf und lässt dieselbe am langsamsten wieder verdunsten. Ebenso begreift man, dass mit der Beseitigung der abnorm hohen Zimmer- und Badetemperaturen ein weiteres Moment für die Relaxation der Hautgefässe wegfällt. In directer Weise kann die Haut gekräftigt und widerstandsfähiger werden durch die verschiedenen hydropathischen Proceduren, besonders durch tägliche am Morgen vorzunehmende kalte Waschungen, Abreibungen, Wickelungen, Douchen, im Sommer durch Fluss-, Sturz- und Wellenbäder. Am besten wirkt unstreitig ein längerer Aufenthalt an der See mit täglichem Seebade und beständigem Genusse der Strandluft oder eine Cur in einer gut geleiteten Kaltwasserheilanstalt.

Mit der Abhärtung der äusseren Haut verbindet man zweckmässig die Abhärtung der Schleimhäute durch methodische monatelang fortgesetzte Gurgelungen oder Ausspritzungen mit kaltem Wasser, dem man irgend ein Astringens z. B. Alaun, Tinct. Ratanh. etc. beisetzen kann. Es empfiehlt sich ferner, den ungeduldigen stets um neue Mittel gegen die wiederkehrenden Katarrhe bittenden Kranken zu bedeuten, dass eine seit Jahren grossgezogene Erschlaffung der Haut in wenigen Wochen oder Monaten nicht beseitigt werden könne.

Bei der Infectiosität der Lacunärangina sowie in zweifelhaften Fällen empfiehlt sich die Isolirung der Erkrankten, namentlich in kinderreichen Familien oder bei schwächlichen Leuten.

Um den Ausbruch der acuten katarrhalischen oder phlegmonösen Angina zu verhindern, resp. um dieselbe zu coupiren, hat man verschiedene Mittel in Vorschlag gebracht. In England sind die von M. Mackenzie empfohlenen 0·2 Resina Guajacis oder Resina Gagais enthaltenden und beim Auftreten der ersten Symptome sofort zweistündlich zu nehmenden Pastillen sehr gebräuchlich; auch Tinct. Aconiti dreistündlich 6 Tropfen wird empfohlen, ebenso das Bepinseln mit Cocain, das nicht nur anästhetische sondern auch anämisirende Eigenschaft besitzt. Unna empfiehlt das Ichthyol in Form von Bepinselungen (Ichthyoli 2·0, Ol. Ricini 4·0, Cumarini 0·1, Spir. vini 20·0) oder als Spray (Ichthyoli 5·0, Spir. vini, Aether. āā 50·0); Concato-Bufalini den Aetherspray von 3—4 Minuten Dauer.

Ein sehr beliebtes Coupirungsmittel sind ferner Dampfbäder und sonstige Schwitzkuren. Wenn nun auch nicht zu leugnen ist, dass in einzelnen Fällen durch die oben genannten Medicamente oder durch kräftige Ableitung auf die Haut eine beginnende Angina oder Coryza zurückgedrängt werden kann, so lehrt doch die Erfahrung,

dass man in der Regel post festum kommt. Bei den mit Muskel- und Gelenkrheumatismen einhergehenden Anginen ist das Natron salicylicum pro die 5·0—8·0 zu versuchen.

Ist die Krankheit schon ausgebrochen, so ist mit Rücksicht auf das Fieber angezeigt, mit B. Fränkel einige Dosen Chinin bis zu 1·0 Gramm Abends zu geben; auch wird der Verlauf der Krankheit beträchtlich abgekürzt. Durch Priessnitz'sche oder Eisumschläge auf den Hals, durch Verschlucken von Eispillen und Trinken eisgekühlter Getränke, kalte oder nach Umständen warme Gargarismen und die Darreichung eines Laxans, das allzu oft vergessen wird, gelingt es meist, die Beschwerden zu mässigen und den Verlauf abzukürzen. Dass bei starkem Schluckweh auf breiige oder flüssige Consistenz sowie passende Temperatur der Ingesta Rücksicht zu nehmen ist, ist selbstverständlich. Da in der Regel nach 2—3 Tagen eine gewisse Intoleranz gegen die äusserlich und innerlich applicirte Kälte eintritt, so gehe man zu warmen erregenden Umschlägen, warmen Gurgelungen und warmen Getränken besonders alkalischen Wässern über, indem durch dieselben die Resorption der entzündlichen Producte beschleunigt und dem subjectiven Gefühle des Kranken Rechnung getragen wird.

Als Gurgelwässer und Inhalationen und zum Durchspülen des Cavum pharyngonasale eignen sich am besten verdünnte lauwarme Milch, Emserwasser, schleimige Decocte, Glycerinlösungen 10 : 100, 1—2% Lösungen von Natr. bicarb. oder Natr. chlor., ferner das Natr. biborac. Ist die Secretion reichlicher geworden, dann gehe man bei Affectionen des Isthmus faucium zu den adstringirenden Gurgelwässern Alaun, Tannin, bei Follikularverschwärung zu Kali chloric. 5 : 150 über. In letzteren Fällen ist auch die 4% Borsäure und 1—3% Carbolsäure angezeigt.

Bei Entzündung der tieferen Theile der Pars oralis und der Pars laryngea verdient die Inhalation warmer zerstäubter Medicamente, welche wirklich, wenn auch immerhin noch in geringen Quantitäten, an die erkrankten Stellen hingelangen, den Vorzug. Zieht sich die Rückbildung in die Länge, dann kann man durch Bepinselungen mit Tannoglycerin 1 : 10 oder Arg. nitr. 1 : 30 oder die später zu erwähnende Mandl'sche Jodsolution die Resorption beschleunigen.

Grösste Sorgfalt erheischt die Miterkrankung des Ohres. Man beginne bei den ersten Erscheinungen sofort mit der Luftdouche, bei stärkerer Verlegung mit dem Katheterismus, der jedoch im acuten Stadium sehr schmerzhaft ist; in der Regel reicht man mit dem Politzer'schen Verfahren namentlich bei Kindern aus. Die sich entwickelnde Otitis media bekämpfe man mit den üblichen Mitteln, Blutegeln, Eisumschlägen eventuell Paracentese des Trommelfells.

Ausser diesen bisher beschriebenen Formen der acuten Angina gibt es noch verschiedene seltenere Modificationen.

So erwähnt z. B. E. Wagner bald mehr circumscripter bald mehr diffuser weisser oder weissgelblicher über die Oberfläche schwach vorragender Flecken auf der Schleimhaut des Gaumens und der Tonsillen, welche einer Epitheleiterung ihre Entstehung verdanken. Die

obersten Epithellagen fehlen meist, die zunächst folgenden zeigen die Epithelien blasig, hydropisch und mit einzelnen Eiter- und Blutkörperchen durchsetzt. Manchmal zeigt die Oberfläche ein unebenes, rauhes, grauliches Aussehen, die Epithelien sind in Abschuppung begriffen, zwischen denselben finden sich vielfach grosse Fetttropfen.

Man hat diese Form auch als kachektische Angina — Angine pultacée — bezeichnet. Sie kommt nur bei Schwächezuständen acuter oder chronischer Natur so besonders bei Typhus, Phthise, Marasmus senilis vor. Ob dieselbe mit der von M. Mackenzie beschriebenen Angina ulcerosa identisch ist, welche besonders bei Anatomen, Medicinern, Krankenwärtern in Folge leichter septischer Infection vorkommen soll, wagt Verfasser nicht zu entscheiden.

Nicht gar selten finden sich ferner im Gefolge acuter Pharyngitis kleinere oder grössere Ecchymosen, welche Form man auch als hämorrhagische Angina bezeichnet hat und die in dem Capitel „Rachenblutungen" ihre Stelle finden wird. Die zuweilen bei regulärer oder larvirter Intermittens auftretenden Anfälle von Halsschmerz hat man als intermittirende Angina bezeichnet.

Bei Abdominaltyphus kommt ausser der katarrhalischen, phlegmonösen, aphthösen, lacunären, croupös-diphtheritischen ja selbst gangränösen Form der Angina nach Cahn und E. Wagner auch noch eine specifisch-typhöse Angina vor. Sie tritt im Anfang des Typhus gleichzeitig mit der Roseola auf in Form von mehreren rundlichen oder ovalen, bis über linsengrossen grauweissen, flachen, scharf abgeschnittenen am weichen Gaumen oder den Gaumenbögen sitzenden Geschwüren, welche geplatzten Herpesbläschen gleichen, fast gar keine oder nur geringe Schluckbeschwerden verursachen und ziemlich rasch heilen. Wagner fand in denselben weisse Blutkörperchen, Plattenepithelien und Pilze aber keine Typhusbacillen. Eugen Fränkel bestreitet das Vorkommen der specifisch-typhösen Angina und behauptet, die im Verlaufe des Typhus im Rachen und Kehlkopf vorkommenden Geschwüre seien verursacht durch mangelhafte Reinigung resp. massenhafte Wucherung der normalen in der Mundrachenhöhle vorkommenden Mikroorganismen so namentlich des Staphylococcus pyogenes und flavus und der durch dieselben erzeugten Epithelnecrose.

Auch im Gefolge des Scorbutes und der idiopathischen Stomacace finden sich Entzündungen des Rachens (Angina scorbutica). Auf der gerötheten Schleimhaut des weichen Gaumens, der Uvula und der Tonsillen entstehen meist schon nach wenigen Tagen erhabene gelbliche Flecken, welche sich bald in vertiefte Geschwüre umwandeln und wenn die Kranken sich selbst überlassen bleiben, zu umfangreichen Zerstörungen und brandigen Abstossungen Anlass geben können. Der Geruch aus dem Munde ist fötid, die Salivation sehr reichlich; die subjectiven Beschwerden wie bei acuter Pharyngitis und Stomatitis.

Die Behandlung ist dieselbe wie bei den entsprechenden Krankheiten der Mundhöhle. Auch hier bewährt sich das Kali chloricum als bestes Topicum.

Pharyngitis chronica.

Die Ursachen der chronischen auf der ganzen Welt verbreiteten Pharyngitis lassen sich in prädisponirende und in direct anregende eintheilen.

Dass schwächliche Personen, Scrophulöse, Tuberculöse, Herzkranke, Reconvalescenten von schweren besonders acuten Infectionskrankheiten, nach Rühle auch Hämorrhoidarier ebenso Syphilitische zu Rachenkatarrhen ganz besonders disponirt sind, kann keinem Zweifel unterliegen.

Unter den direct wirkenden Ursachen sind stets wiederkehrende oder rasch aufeinander folgende Nasenrachenkatarrhe wohl die häufigsten. Wenn man bedenkt, wie selten die vollständige Rückbildung einer Angina oder eines Retronasalkatarrhs abgewartet wird resp. nicht abgewartet werden kann, dann kann man sich nicht wundern, wenn bei jeder neuen Attaque nicht resorbirtes Material zurückbleibt und die acute Schwellung der Schleimhaut chronisch wird.

Der chronische Rachenkatarrh ist ein nahezu constanter Begleiter des chronischen Schnupfens, der adenoiden Wucherungen und grosser Nasenrachenpolypen. Vielleicht noch häufiger muss eine ungeeignete Lebensweise speciell der Genuss starker alkoholischer Getränke sowie scharfer, gewürzter, gepfefferter Speisen und das Rauchen angeschuldigt werden. Dass auch das Tabakschnupfen und das noch ekelhaftere Kauen dieselbe Wirkung entfaltet, bedarf keiner Auseinandersetzung.

Auch gewisse Beschäftigungen, Berufsarten und Gewerbe geben zu chronischen Rachenkatarrhen Anlass; Leute die in staubiger Luft leben oder arbeiten, Müller, Stein-, Feilenhauer, Metallarbeiter, besonders auch Schreiner, Drechsler, Arbeiterinnen in Cigarrenfabriken werden fast noch öfter von Rachenkatarrhen als von Kehlkopfentzündungen heimgesucht.

Von Vielen wird auch auf die Schädlichkeit stimmlicher Ueberanstrengung und die relative Häufigkeit des chron. Rachenkatarrhs bei Lehrern, Sängern, Schauspielern, Predigern, Officieren und Anwälten hingewiesen. In England bezeichnet man den chron. Rachenkatarrh kurzweg als Predigerhalsweh.

Bresgen, der stimmliche Ueberanstrengungen allein nicht als Ursache gelten lassen will, erklärt die scheinbar hohe Morbiditätszahl der in Rede stehenden Berufsclassen aus dem Umstande, dass dieselben viel eher als andere Menschen durch die Folgen ihrer Erkrankung in ihrem Berufe gestört würden; dagegen gibt er zu, dass durch anhaltende Ueberanstrengung der Stimme schon bestehende Rachenkatarrhe wesentlich verschlimmert werden.

Verfasser ist der Ansicht, dass Ueberanstrengung der Stimme zwar für sich allein zu Pharyngitis chronica besonders zu Hypertrophie der Seitenstränge Anlass geben kann, glaubt aber, dass dieselbe weitaus am häufigsten erst im Bunde mit einer oder mehreren andern Schädlichkeiten ihre Wirkung entfaltet. Dem Verfasser ist wenigstens stets die geringe Betheiligung des lehrenden, schauspie-

lenden und singenden weiblichen Geschlechtes und die starke Frequenz des im Freien bei jedem Wetter und auf staubiger Reitbahn commandirenden und das savoir vivre wohlverstehenden Officierstandes aufgefallen. Auch bei Lehrern konnten in der Regel neben stimmlicher Ueberanstrengung Constitutionsanomalien oder Disposition zu Erkältungen verantwortlich gemacht werden.

Im Allgemeinen kann man also Rühle, der für die grosse Häufigkeit der Rachenerkrankungen in den Rheinlanden die Cigarre, den Wein und den Gesang anklagt, nur beipflichten und die von ihm gegebene Aetiologie mit einigen Modificationen in Bezug auf Quantität und Qualität der Alcoholica und die mehr oder weniger künstlerische Verwendung der Stimmwerkzeuge für überall gelten lassen.

Der chronische Rachenkatarrh kann nicht nur den ganzen Rachen befallen, sondern sich auch in einzelnen Abschnitten localisiren; allerdings schneidet der Process meist nicht scharf ab, sondern erstreckt sich noch von einer Partie mehr oder weniger auf die andere. Wenn Roth aber behauptet, dass der pathologische Process stets die Rachenschleimhaut in ganzer Ausdehnung treffe und dass eine räumliche Trennung der Entzündung ungerechtfertigt sei, so muss ihm Verfasser vom klinischen Standpunkte aus widersprechen.

Als das charakteristische Merkmal aller sowohl des diffusen als des localisirten chronischen Rachenkatarrhs muss die Hypertrophie der betroffenen Theile angesehen werden; dieselbe erstreckt sich einestheils auf Follikel und Balgdrüsen, anderntheils auf die ganze Schleimhaut und das submucöse Bindegewebe (Pharyngitis chronica hypertrophica). Da jedoch viele Pharyngitiden mit Atrophie der Schleimhaut enden, so unterscheidet man auch eine Pharyngitis chronica atrophicans sive sicca.

Der chronische **hypertrophische Katarrh des Nasenrachenraumes** setzt Veränderungen, welche von den bei den andern Formen beobachteten wesentlich abweichen; er soll deshalb an erster Stelle besprochen werden.

Die Schleimhaut der Tubenwülste und der von ihnen ausgehenden Schleimhautfalten sowie der Rosenmüller'schen Grube, die Rückfläche des Velum erscheint verdickt, serös infiltrirt, mehr oder weniger hyperämisch, von erweiterten Gefässen durchzogen, selbst ecchymosirt, manchmal durch Epithelwucherung oder Erosion grauweiss verfärbt. Die Schleimdrüsen sowie die Follikel treten deutlicher hervor, die hinteren Enden der Nasenmuscheln sind hypertrophisch oder zu blasenartigen froschleichähnlichen Wülsten degenerirt, die Schleimhaut der Pars oralis kann normal sein, häufiger ist sie gleichfalls hypertrophisch und mit Granulationen besetzt, die Gaumenmandeln vergrössert.

Nach Tornwaldt ist öfters die **Bursa pharyngea** befallen. Der chronische Katarrh resp. die Hypersecretion dieses Organs kennzeichnet sich dadurch, dass aus ihrer Oeffnung ein vorwiegend schleimiges oder vorwiegend eitriges Secret abfliesst und, wenn es flüssiger Consistenz ist, die nach unten und hinten von der Bursa gelegene Partie

des Rachendaches und der hinteren Rachenwand bedeckt, wenn es mehr zähe und klebrig ist, sich auf die nächste Umgebung der Bursa beschränkt. Im Gegensatz zu Ozaena oder allgemeinem Nasenrachenkatarrh bleibt der Theil des Rachendaches, welcher zwischen der Oeffnung der Bursa und den Choanen liegt, in den nicht mit diesen Krankheiten complicirten Fällen von Secret frei. Dass das Secret in der That aus der Mündung der Bursa kommt, lässt sich einestheils durch directe Beobachtung nachweisen, anderntheils durch das Sistiren der Secretion nach zeitweiligem Verschluss der Oeffnung, wie es durch den Galvanokauter erzeugt wird, sowie durch die definitive Beseitigung der Secretbildung mittelst therapeutischer Eingriffe, welche sich ausschliesslich auf die Bursa beschränken.

Die subjectiven Beschwerden, welche beim chronischen Katarrh oder bei Cystenbildung der Bursa pharyngea auftreten, sind im Allgemeinen dieselben, wie sie jedem chronischen Nasenrachenkatarrh zukommen; auch Reflexe in anderen Organen sind beobachtet; das Specielle findet sich am Schlusse des Capitels.

Die Behandlung der chronischen Bursitis muss zuerst auf Entfernung der Secrete mittelst Nasendouche oder Spray eventuell mit der Pincette gerichtet sein; dann insufflire man Tannin, Alaun, Argent. nitr. 1·0—10·0 Amylum. Bei sehr enger Oeffnung führe man eine mit Lapis überzogene Sonde in die Bursa ein oder injicire mittelst Spritze concentrirte Lapislösung. Am raschesten wirkt galvanokaustische Spaltung der Bursa sowie wiederholte Cauterisation ihrer Wände mit einem Spitzbrenner. Noch schneller dürfte vielleicht die Abtragung des die vordere Wand der Bursa bildenden Drüsengewebes mittelst des Lange'schen oder Gottstein'schen Ringmessers zum Ziele führen.

Mit besonderer Häufigkeit und Intensität wird beim chronischen Nasenrachenkatarrh das cytogene adenoide Gewebe befallen. Die Hypertrophie desselben bezeichnet man als **adenoide Wucherungen, Hypertrophie der dritten Mandel,** oder als **Hypertrophie der Rachenmandel.**

Dieselbe wird von Manchen zu den Neubildungen gerechnet, jedoch mit Unrecht, da die adenoiden Vegetationen Hypertrophien und excessive Formationen eines normal vorhandenen Gewebes darstellen; immerhin muss zugegeben werden, dass sie nicht immer Entzündungsprocessen im klinischen Sinne ihre Entstehung verdanken.

Der objective Befund ist je nach dem Grade der Erkrankung sehr verschieden.

In hochgradigen Fällen fällt dem mit dem Nasenrachenspiegel Untersuchenden sofort das Nichtsichtbarsein der Choanen auf. Wie er auch den Spiegel dreht und wendet, nirgends ist von dem so charakteristischen Septum narium oder den Muscheln etwas zu sehen. Statt dessen erblickt man eine vom Rachendach bis zur Vereinigung des harten und weichen Gaumens und bis zu den Tubenmündungen herabreichende und auch diese noch verdeckende, das Lumen des Nasenrachenraumes ausfüllende Masse röthlicher oder graurother zapfen-,

beeren- und stalaktitenartiger Gebilde, die oft mehr oder weniger mit einem dicken, zähen, grüngelben oder blutigen zu Borken eingetrockneten Secrete bedeckt sind. Nach Entfernung des letzteren wird der Untersuchende gewahr, dass die einzelnen Geschwülste und kammartigen Prominenzen durch tiefe meist Längseinschnitte von einander getrennt, theils gestielt theils breit aufsitzend und in verschiedenem Grade beweglich sind.

In mittelschweren Fällen, wofür Figur 5 ein Beispiel sein mag, sind die Choanen und die Scheidewand nur in ihrem unteren Abschnitte sichtbar, während der obere mit den eben beschriebenen Geschwülsten wie mit einem Vorhange überdeckt ist. In den leichtesten Fällen sieht man auf der vorderen oder hinteren Fläche des Fornix einen grösseren oder mehrere kleinere prominente rundliche Geschwülste oder Zapfen, welche den Durchgang der Luft durch die Choanen nur dann beeinträchtigen, wenn sich grössere Massen von Secret auf denselben ansammeln und dort verkrusten.

Fig. 5. Adenoide Wucherungen mittleren Grades bei einem 14jährigen Knaben.

Wilhelm Mayer, dem das grosse Verdienst gebührt, zuerst in ausführlicher Weise auf diese eigenartigen Gebilde aufmerksam gemacht zu haben, theilt sie in blattförmige und in zapfenförmige ein, als Unterarten erwähnt er die kamm- und plattenförmigen. Die hypertrophische Rachenmandel zeigt als Grundlage ein bindegewebiges Maschennetz bald aus dickeren mehr glänzenden Balken mit engeren und rundlichen Maschen, bald aus dünnen Fasern mit weiten oft gestreckten Maschen. Auffallend stark entwickelt ist das venöse und arterielle Gefässsystem. Die Hauptmasse der adenoiden Wucherungen bilden zahlreiche kleine Rundzellen, Lymphkörperchen. Die Epitheldecke besteht aus flimmernden und nicht flimmernden Cylinderzellen, seltener aus Pflasterepithel, letzteres constant da, wo sich ein Follikel der Oberfläche nähert.

Die Consistenz der adenoiden Wucherungen ist meist eine sehr geringe, so dass sie mit dem palpirenden Finger zerdrückt oder zerrissen werden können; bei Erwachsenen ist ihre Oberfläche derber und fester, ihre Basis jedoch ausserordentlich widerstandsfähig.

Ueber die Grösse und Zahl der Geschwülste gibt weder die Rhinoscopia anterior noch posterior ganz befriedigende Aufschlüsse. Bei der starken perspectivischen Verkürzung mit der sich die unter-

suchten Theile bei der Rhinoscopia posterior repräsentiren, können meist nur die zu unterst sitzenden Geschwülste genauer übersehen werden, während die oberhalb liegenden dem Auge verborgen bleiben oder kleiner erscheinen. Umgekehrt kann man bei der Rhinoscopia anterior die Geschwülste leicht für zu gross halten. Wie ihre Grösse und Zahl so ist auch ihr Sitz und Ausgangspunkt verschieden. Bald entspringen sie vom Fornix und zwar bald mehr von der vorderen bald mehr von der hinteren Wand, selten ist der Fornix ganz frei und die Hinterwand zwischen den Tubenwülsten herab bis zur Tubenmündung ausschliesslich befallen. Auch auf der seitlichen Rachenwand in der Rosenmüller'schen Grube, ja selbst auf den Tubenwülsten kommen adenoide Vegetationen vor, was Trautmann jedoch in Abrede stellt.

Noch vor einigen Jahren hielt man die adenoiden Vegetationen für eine relativ seltene Affection und glaubte, dass dieselben nur in manchen Ländern hauptsächlich an den deutschen Küsten, in Dänemark, Holland und England vorkämen. Dass dem nicht so ist, dass auch in Binnenländern die Krankheit häufig beobachtet wird, lehren die übereinstimmenden Berichte der verschiedensten Beobachter. Der Grund liegt offenbar darin, dass man seit ihrem Bekanntwerden fleissiger nach ihnen sucht.

Ganz besonders bevorzugt erscheint das Kindesalter. Manche wie Bresgen, V. Lange, Semon glauben sogar, die Krankheit sei angeboren; dass dieselbe erst einige Jahre nach der Geburt bemerkt werde, habe in der langsamen Entwicklung des Leidens seinen Grund. Die Heredität scheint in der That eine grosse Rolle zu spielen, da öfters mehrere Kinder derselben Familie erkranken, deren Eltern gleichfalls mit aden. Wucherungen behaftet sind; übrigens kann die Prädisposition des kindlichen Alters insoferne nicht auffallend erscheinen, als auch andere drüsige Organe, die Gaumenmandeln, die Lymphdrüsen, im Kindesalter sehr häufig von Hyperplasien betroffen werden.

Man hat auch geglaubt, die adenoiden Wucherungen als den Ausdruck eines constitutionellen Leidens speciell der Scrophulose ja sogar als die Ursache der Scrophulose betrachten zu müssen. Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass scrophulöse Kinder und anämische junge Leute ein grösseres Contingent stellen, als blühende und wohlgenährte, so hält Verfasser doch die adenoiden Vegetationen für eine selbstständige, gewisse Constitutionsanomalien nur besonders gerne begleitende Affection.

Acute und chronische Entzündungen der Nase und des Rachens namentlich in Folge von Masern, Scharlach oder Keuchhusten, geben am häufigsten zu deren Entstehung Anlass; nach Löwenberg kommen sie auch bei angebornen Gaumenspalten vor. Alle Beobachter stimmen darin überein, dass die Krankheit vom 5. bis 20. Lebensjahre am verbreitetsten ist, d. h. dass dieselbe in diesem Zeitraume am häufigsten zur Beobachtung gelangt. Nach den Zwanzigern wird die Affection auffallend selten, was die Einen aus der spontanen

Rückbildung der Vegetationen erklären, die Andern daraus, dass die im Wachsthum zurückbleibenden Wucherungen in dem sich nach allen Seiten hin vergrössernden Rachen keine Erscheinungen mehr machen.

Unter den Symptomen ist eines der auffallendsten und frühesten die Veränderung der Sprache. Dieselbe hat ihre Resonanz verloren, die Worte klingen dumpf, die Nasenlaute können nicht ausgesprochen werden oder sie werden durch andere Consonanten ersetzt. Man bezeichnet diese Sprache als eine todte, klanglose. In manchen Fällen gleicht sie jener bei acuten Anginen oder Tonsillarhypertrophie, in andern Fällen mehr jener bei Lähmung des Gaumensegels, das auch in der That durch den Druck der Wucherungen und den hypertrophischen Zustand, in welchem es sich selbst befindet, in seiner Function beeinträchtigt wird. Gar nicht selten erscheint der weiche Gaumen gegen die Mundhöhle vorgewölbt. Die Beobachtung Hedinger's, dass auch noch andere Sprachfehler, Lambdacismus, Rotacismus, Sigmatismus, Stottern etc. bei Kindern mit adenoiden Wucherungen vorkommen, kann Verfasser vollauf bestätigen.

In den einigermassen entwickelten Fällen ist die Athmung durch die Nase behindert, in hochgradigen ganz unmöglich. Häufig klagen die Eltern über unruhigen Schlaf sowie über lautes Schnarchen ihrer Kinder. Die Unmöglichkeit, durch die Nase zu athmen, zwingt zum Offenhalten des Mundes und bekommen die Gesichtszüge durch Herabhängen der Unterlippe einen blöden alternden Ausdruck. Die meisten Kinder werden ferner mit der Zunahme der Krankheit blass, anämisch, ihr Brustkorb bleibt flach, eingesunken und unentwickelt, ähnlich wie bei der Hypertrophie der Gaumenmandeln. Dass die Entfernung der Secrete der Nase durch das Schneuzen sehr erschwert ja unmöglich ist, dass Geruch und Geschmack leiden, ist begreiflich. Sehr häufig zeigen die Kinder ein schlaffes, träges Wesen, lernen schwer, bleiben in der Schule zurück oder klagen über Hinterhauptskopfschmerz oder dumpfen Druck über der Stirne, sowie über Supraorbitalneuralgie, Asthma und anderweitige Reflexneurosen (vergl. dieses Capitel bei den Krankheiten der Nase).

Die Schleimsecretion ist sowohl in der Nase wie im Rachen vermehrt; behufs Entfernung des Secretes werden die angestrengtesten Schneuz-, Räusper- und Hustenbewegungen angestellt; das Secret ist meist sehr dick und zähe, glasartig zuweilen blutig tingirt und dem pneumonischen Sputum täuschend ähnlich.

Besonders häufig — nach den Untersuchungen von Hartmann und W. Mayer circa in 74% — sind Störungen des Gehörs, von den leichtesten vorübergehenden Störungen der Gehörschärfe und dem unbedeutendsten Ohrensausen bis zu hochgradiger Schwerhörigkeit und perforativer Otitis media.

Mit wenigen oder kleineren die Athmung und Sprache nur wenig alterirenden Wucherungen Behaftete klagen meist über Verschleimung des Halses oder über ein Gefühl eines Fremdkörpers; sie räuspern und spucken und treiben die Luft stossweise durch die Nase, als ob sie ein Hinderniss beseitigen wollten. Sehr oft werden alle

geschilderten Erscheinungen von den Angehörigen ja sogar von Aerzten übersehen, nicht beachtet oder gar, wie das Offenhalten des Mundes, für üble Gewohnheiten erklärt, welche man den Kindern mit der Ruthe austreiben müsse!

Sehr oft findet sich im Gefolge der adenoiden Wucherungen Hyperplasie der Gaumenmandeln — nach Schäffer in 19% der Fälle —; ferner Granulationen der Hinterwand und chronische Rhinitis. Die Schleimhaut der Nase ist meistens nur leicht geröthet, nicht hypertrophisch, aber das Schwellnetz namentlich an den untern Muscheln stark gefüllt. Diese Schwellung dürfte weniger dem erschwerten Abfluss des Blutes als vielmehr activer reflectorischer Reizung ihre Entstehung verdanken.

Der Verlauf der adenoiden Wucherungen ist ein äusserst langsamer. Sie können viele Jahre ziemlich symptomlos verlaufen, bis sie unter allmählicher Volumzunahme die oben citirten Erscheinungen hervorrufen. Spontane Rückbildung wird von mehreren Autoren mit Bestimmtheit behauptet.

Die Prognose ist günstig sowohl in Bezug auf die Beseitigung der Beschwerden als auch auf völlige Heilung. Recidiven kommen nicht selten vor, doch möchte sich der Verfasser B. Fränkel anschliessen, der behauptet, es seien dies keine wirklichen Recidiven, das schon einmal Entfernte wachse nicht wieder nach, hingegen könnten kleinere nicht operirte Wucherungen nach Entfernung der grösseren sie im Wachsthum hindernden Stücke allmählich so gross werden, dass von Neuem Erscheinungen auftreten. Dass die Wiederherstellung des Gehörs in sehr schweren oder veralteten Fällen nicht immer möglich ist, ist verständlich.

Die Diagnose stützt sich einestheils auf die Symptome anderntheils den rhinoskopischen Befund.

Stets beginne man mit der Untersuchung der Nase von vorne, die sich auch unbändige Kinder viel eher gefallen lassen, und die meistens sehr brauchbare theils positive theils negative Resultate ergibt. Sehr oft gelingt es nämlich besonders nach vorheriger Cocainisirung, die Wucherungen direct zu sehen oder wenigstens zu constatiren, dass das Athmungshinderniss nicht in der Nase liegt. Misslingt die Rhinoscopia anterior wegen Enge der Nase oder wegen Verbiegungen und Auswüchsen des Septum, dann versuche man die Rhinoskopia posterior. Lässt auch diese im Stich, dann schreite man zur Digitaluntersuchung; man kann sich namentlich bei ältern Kindern oder jungen Leuten mittelst derselben auch sehr gut über die Zahl, Grösse und Sitz der Geschwülste orientiren. Auch die Untersuchung mit einer dicken passend gekrümmten und in einen erbsengrossen Knopf endigenden Sonde vom Mund aus gibt sehr verwerthbare Resultate. Um die bei Kindern immerhin schwierige und schmerzhafte Digitaluntersuchung zu ersetzen, empfiehlt F. Semon die Durchgängigkeit des Nasenrachenraumes durch Injection einer kleinen Quantität warmen Wassers mit Hilfe der Ballonspritze zu prüfen. Fliesst das injicirte Wasser nicht sofort und im Strome aus dem andern

Nasenloch sondern durch den Mund ab, dann ist man berechtigt, ein Hinderniss im Nasenrachenraum anzunehmen; auch empfiehlt sich dieses Verfahren als Prüfstein, ob durch die Operation die freie Passage hergestellt wurde. Ein weiterer diagnostischer Behelf ist die Sondirung des Nasenrachenraumes von vorne; bei Anwesenheit von Wucherungen stösst die Sonde nicht auf die hart sich anfühlende hintere Rachenwand sondern auf ein weiches elastisches Polster, welches die unter normalen Verhältnissen vorhandene freie Beweglichkeit des Instrumentes verhindert.

Da die Behandlung des nicht mit Hypertrophie des cytogenen Lagus einhergehenden Nasenrachenkatarrhs bei den übrigen Formen ihre Besprechung finden wird, so wenden wir uns zur Behandlung der adenoiden Vegetationen.

Als Palliativ zur leichteren Beseitigung des die Choanen theilweise verlegenden und den Wucherungen anhaftenden reichlichen Schleims kann der Nasenspray oder die Douche mit 1% Kochsalz-, Soda- oder Boraxlösung dienen. Wenn auch einzelne Beobachter wie Hartmann durch Einblasungen von Boraxpulver oder durch Brunnen-, Bade- und Luftcuren adenoide Wucherungen sich zurückbilden gesehen haben, so muss doch in den entwickelteren Fällen die Behandlung eine rein chirurgische sein. Die mildeste, langweiligste und schlechteste Methode sind Aetzungen mit Lapis in Substanz oder Chromsäure, die auf einen je nach dem Standorte der Vegetationen gekrümmten und gerifften Aetzmittelträger angeschmolzen werden; die Cur dauert mehrere Monate.

Das einzig Richtige ist deshalb die mechanische Entfernung. Wenn es auch möglich ist, weiche Wucherungen durch Zerquetschen mit dem Fingernagel zum Schwinden zu bringen, so bedürfen wir doch meist eingreifenderer Mittel. Die Frage, in welchem Alter Kinder operirt werden sollen, beantwortet sich aus dem jeweiligen Status. Bestehen Gehörstörungen, Anämie, Engbrüstigkeit, dann muss sogleich operirt werden. Ist die Nase aber noch durchgängig und bestehen weder Gehör- noch sonstige Entwicklungsstörungen, dann kann man allenfalls zuwarten, bis die Kinder grösser geworden sind oder sich die Erscheinungen steigern; rationeller ist es jedoch, die volle Entwicklung der Krankheit nicht abzuwarten, sondern bald einzugreifen.

Eine weitere Frage ist die, ob es möglich und nothwendig ist, unter Controle des Spiegels zu operiren.

Die Möglichkeit, mit dem Spiegel zu operiren, kann nicht geleugnet werden; doch ist die Controle mit dem Spiegel, da die weitaus grösste Zahl der Patienten Kinder sind, in praxi kaum jemals auszuführen. Wer übrigens Zeit und Geduld hat, die kleinen Patienten wochenlang einzuüben, kann sich ja immerhin dieses zweifelhafte Vergnügen verschaffen. Der einzig richtige weil einzig praktische Standpunkt, den die Mehrzahl der Operateure einnimmt, ist der, die Operation ohne Spiegel auszuführen, an dieselbe aber erst dann heranzutreten, wenn man sich durch vorherige Inspection oder Palpation über Sitz und Ausdehnung der Wucherungen genügend informirt hat.

Wer unter diesen Cautelen operirt, kann keinen Schaden anrichten. Eine weitere Frage ist, ob die Operation in einer oder mehreren Sitzungen und ob mit oder ohne Narkose vorzunehmen sei.

Die Beantwortung des ersten Theiles richtet sich nach dem Einzelfalle; bei standhaften Erwachsenen und älteren Kindern lässt sich, vorausgesetzt, dass der Wucherungen nicht allzuviele sind, die Operation meist in einer Sitzung und ohne Narkose am besten mit Cocain vornehmen, wenn auch die Blutung zuweilen eine beträchtliche ist. Ist aber der ganze Nasenrachenraum mit Geschwülsten förmlich ausgestopft, dann kann man kaum in einer Sitzung fertig werden. Vernünftige Kinder lassen zwar meist den ersten Eingriff widerstandslos über sich ergehen, machen aber bei weiteren Sitzungen ja schon beim zweitmaligen Eingehen mit dem Instrumente immer mehr Schwierigkeiten. Unvernünftiger Kinder, namentlich solcher, welche jeder Manipulation des Arztes handgreiflichen Widerstand entgegensetzen und deren Zahl in Wahrheit nicht so gering ist, als man nach den Berichten verschiedener Beobachter annehmen könnte, kann man nur mit Gewalt oder in der Narkose Herr werden. In ersterem Falle sind mindestens zwei kräftige Hände nöthig, meistens sogar vier, so dass sich die Zahl der bei der Operation direct Betheiligten auf 3 beläuft. Abgesehen von der Schwierigkeit, in der Privatsprechstunde oder auf dem Lande sofort die nöthige Assistenz zu bekommen, übt auch die gewaltsame Fixation, die unendliche Aufregung und das Geschrei der nach Leibeskräften sich wehrenden kleinen Patienten auf die Eltern einen sehr unangenehmen Eindruck, wofür Verfasser reichlich Beispiele anführen könnte. Aus diesen Gründen vollzieht Verfasser bei unbändigen Kindern die Operation in der Narkose, resp. in der Halbnarkose. Durch dieselbe soll nur der Widerstand gebrochen, die Reflexerregbarkeit aber nicht aufgehoben werden. Auf diese Weise wird die gegen die Narkose in's Feld geführte Aspiration von Blut, Schleim und exstirpirten Geschwülsten sicher vermieden und nicht der mindeste Schaden angerichtet. Der Rath, mit der Operation zu warten, bis die Kinder vernünftiger geworden sind und die Operation ohne Narkose gestatten, ist bei vollentwickelter Krankheit der denkbar schlechteste.

Ueber den Modus der Operation gehen die Ansichten auseinander. Die Einen ziehen den Weg durch die Nase vor und entfernen die Wucherungen mittelst des W. Mayer'schen Ringmessers oder des Drahtecraseurs oder der galvanokaustischen Schlinge. Dass der Weg durch die Nase der kürzeste und namentlich bei Wucherungen am Tubenostium der bequemste ist, ist richtig, allein man kann dieser Methode mit Recht vorwerfen, dass man von der Nase aus nicht alle besonders nicht die am vordersten oberen Theile des Fornix sitzenden Vegetationen zu erreichen vermag. Abgesehen von der Unmöglichkeit, die betreffenden Instrumente durch eine enge, verkrümmte und mit Auswüchsen versehene Nase durchzuführen, darf man nicht vergessen, dass die weitaus grösste Anzahl der zu Operirenden Kinder sind, bei denen schon aus anatomischen Gründen der Weg durch die Nase unthunlich erscheint.

Deshalb wird der Weg durch den Mund von den Meisten und auch dem Verfasser vorgezogen. Manche empfehlen mit besonderer Wärme den Schlingenschnürer; da aber das Einführen wegen Verbiegung des Drahtes sehr schwierig ist, so construirte Hartmann einen gedeckten Schlingenschnürer, der vor dem ungedeckten den Vorzug verdient. Die galvanokaustische Schlinge ist bei der Weichheit der Tumoren zum mindesten unnöthig. Die massenhaften Wucherungen aber mit dem galvanokaustischen Brenner zerstören zu wollen, hiesse einfach die Operation in's Unendliche verlängern. Die beste Methode ist die, durch welche möglichst schnell möglichst viel entfernt werden kann. Dazu eignen sich der scharfe Löffel, der hauptsächlich von

Fig. 6. Ringmesser von Gottstein.

Justi und Trautmann angewendet wird, ferner das Ringmesser von Gottstein und die schneidenden Curetten von Lange und Hartmann. Das Instrument von Gottstein (Fig. 6) ist ein birnförmiges Ringmesser, welches von oben nach unten schneidet, wenn es an die hintere Rachenwand angedrückt wird. Das Ringmesser von Lange (Fig. 7) ist ein ovaler Ring, welcher seitlich schneidet, je nachdem er von der einen zu der andern Seite der hinteren und oberen Rachenwand geführt wird. Das Hartmann'sche Instrument ist nach demselben Principe construirt und nur etwas modificirt. Das Löwenberg'sche stellt ein gedecktes Ringmesser vor. So grosse Vorzüge nun auch die erwähnten Instrumente haben, so kommt man

Fig. 7. Ringmesser von V. Lange.

doch nicht in allen Fällen namentlich bei der Anwesenheit sehr zahlreicher oder derber Wucherungen mit ihnen aus. Nicht aus Sucht, die grosse Zahl der schon vorhandenen Instrumente zu vermehren, unter welchen das stellbare schneidende Adenotom Delstanches' und Bezold's verlängerter Fingernagel besonders erwähnt sein mögen, sondern aus rein praktischen Bedürfnissen construirte Verfasser eine Choanenzange, die Michael's Doppelmeissel oder jener von Löwenberg, Solis-Cohen und Störk ähnlich ist. Wie die Abbildung in Fig. 8 zeigt, hat dieselbe eine doppelte Krümmung, eine am Handgriff und eine andere im Bogen nach vorne concave für den Nasenrachenraum.

Die stark gehaltene Zange — die Stärke ist zum Schneiden unbedingt nöthig — endet in zwei löffelförmige genau auf einander passende auf allen Seiten scharfe ovale 14 mm hohe und 12 mm breite Branchen. Dadurch ist es möglich, jeden Theil des Nasenrachenraumes zu erreichen. Will man die auf der Hinterwand sitzenden Vegetationen entfernen, dann führt man die Zange bei niedergedrückter Zunge unter Hebung des Griffes an die gewünschte Stelle; wenn nöthig, schiebt man dieselbe möglichst hoch in verticaler Richtung an den Fornix und von da aus unter leichter Senkung des Griffes an die vordere Fläche gegen die Choanen, um die dort befindlichen Tumoren zu beseitigen. Ein weiterer Vortheil des Instrumentes besteht in der Möglichkeit, sehr grosse und derbe Stücke, in welchen sich der scharfe Löffel oder das Ringmesser fangen würde oder nicht ein-

Fig. 8. Choanenzange von Schech.

pressen liesse, mit einem einzigen Drucke abzuquetschen. Ist die bindegewebige Basis sehr dick und sehr derb, so kann es wohl wie bei den Ecraseuren vorkommen, dass die Branchen nicht ganz durchschneiden, in der Regel gelingt es aber durch einige rotirende Bewegungen die Geschwulst abzutrennen eventuell das noch nicht ganz Durchschnittene loszureissen.

Bei Erwachsenen und grösseren Kindern bedient man sich der Zange stärkeren Kalibers, bei sehr kleinen Patienten und sehr beträchtlicher Enge des Operationsfeldes gebraucht man ein schlankeres Exemplar. Die Zangen sind von Instrumentenfabrikant Katsch in München um 14 Mark pro Stück zu beziehen.

Die Blutung ist bei der Zangenoperation meist gering und steht entweder von selbst oder nach Injection kalten eventuell mit Liq.

ferri sesquichl. versetzten Wassers oder Insufflation von Alaun, Tannin. Der Schmerz ist meist gering, doch werden zuweilen von den Kranken in die Zähne und Ohren ausstrahlende Schmerzen angegeben. Da aber auch mit der Zange nicht Alles entfernt werden kann, namentlich nicht die sehr flach aufsitzenden oder kleinen hinter den Tubenwülsten befindlichen Vegetationen, so bedient sich Verfasser zum Schlusse der Operation auch noch der obenerwähnten Ringmesser von Gottstein, Hartmann und Lange, um die Wände des Nasenrachenraumes noch völlig auszuglätten.

Wenn Manche es für unnöthig halten, alles Krankhafte zu entfernen, da das Uebriggebliebene atrophire, so muss Verfasser gegen diese Anschauung umsomehr protestiren, als einestheils zurückgebliebene Reste und kleinere Vegetationen wieder wachsen und von Neuem Erscheinungen machen, und man anderntheils trotz sorgfältigster Operation nicht selten von Recidiven überrascht wird.

Die Reaction kann, im Falle man in einer Sitzung Alles operirt hat, sehr stürmisch sein; Kopfschmerzen, Fieber, Schlingbeschwerden, vermehrte Absonderung eines blutig-eiterigen Schleims und allgemeines Unbehagen zwingen die Kranken auf einige Tage in's Bett. Kinder ertragen die Operation in der Narkose auffallend gut, selbst wenn man, wie Verfasser gewöhnlich thut, gleichzeitig die hypertrophischen Gaumenmandeln entfernt hat. Sind wegen allzu grosser Menge der Vegetationen mehrere Sitzungen nöthig, dann darf erst nach Ablauf der Reaction ein weiterer Eingriff gemacht werden. Nachtheilige Folgen für das Ohr hat Verfasser noch nie gesehen. Die Reaction bekämpfe man mit Eisumschlägen auf Kopf und Hals, Schlucken von Eis und Bettruhe. Zur Nachbehandlung resp. zur Verhütung von Erysipel und Sepsis lasse man den Nasenrachenraum 3—4mal täglich mit 4% Borlösung reinigen und verbiete selbst bei gänzlichem Mangel an Reaction für die ersten Tage den Aufenthalt in staubigen, rauchigen Localen oder grössere Spaziergänge; Kinder dürfen die Schule keinenfalls besuchen.

Mag man die Operation mit einem Instrumente vollziehen, mit welchem man wolle — und dies bestimmt Uebung, Gewohnheit und Vorliebe — der Effect ist stets der gleiche. Ist die Athmung durch die Nase wieder hergestellt, dann verschwindet der stupide Gesichtsausdruck, die Sprache wird klangvoll und laut, die übermässige Schleimsecretion sistirt, die Gehörstörungen gehen zurück, die Blässe macht allmählich einer gesunderen Farbe Platz, der Thorax wölbt sich. In den mit hypertrophischer Rhinitis combinirten Fällen ist es nöthig, auch diese in entsprechender Weise zu behandeln, während die einfache Schwellung des erectilen Gewebes in der Regel von selbst verschwindet und Lufteintreibungen in die Tuben die Wiederherstellung des Gehörs beschleunigen. Zuweilen ist es auch nöthig, die Operirten durch Hinaufbinden des Unterkiefers wieder an die Athmung durch die Nase zu gewöhnen und durch Sprachübungen allenfallsige Sprachfehler zu beseitigen.

Unstreitig am häufigsten unter allen Abschnitten des Rachens erkrankt die **Pars oralis**.

In seiner einfachsten Form manifestirt sich der chron. Katarrh derselben durch gleichmässige Röthung und sammtartige Schwellung der Schleimhaut. Die Röthe ist zuweilen so unbeträchtlich, dass nur ein geübtes Auge im Stande ist, dieselbe als pathologisch zu agnosciren, meist ist sie gesättigt, mit einem Stich in's Blaurothe; in anderen Fällen erscheint die Schleimhaut wie marmorirt, im grossen Ganzen aber glatt oder durch erweiterte geschlängelte Blutgefässe und geschwellte Schleimdrüsen leicht uneben und mit einem grauen grüngelben Secret bedeckt. Manchmal erscheint die hintere Rachenwand in mehrere platte oder rundliche Längsstreifen getheilt, welche seichte Furchen zwischen sich lassen; es sind dies jene Fälle, bei denen es bereits zu einer partiellen Hypertrophie der Schleimhaut gekommen ist.

Die am häufigsten vorkommende Form ist die granulöse (**Pharyngitis granulosa**).

Untersucht man eine grössere Anzahl jugendlicher und erwachsener Personen beiderlei Geschlechts, so erblickt man auf der längs der Wirbelsäule herablaufenden Schleimhaut des Rachens, hauptsächlich aber auf der Pars oralis und ihrer nächsten Umgebung intensiv rothe manchmal blassrothe oder gelbliche längliche oder ovale Erhabenheiten von der Grösse einer Linse oder Erbse selbst Bohne. Bald ist nur ein einziges Exemplar vorhanden, bald mehrere in gleichmässiger Zerstreuung über die Schleimhaut, bald stehen sie in Gruppen bei einander, nicht selten bilden sie flache verschieden breite Platten. Durch die Untersuchungen von Saalfeld und Roth ist endgiltig sichergestellt, dass die Granula eine circumscripte Wucherung des lymphatischen Gewebes in der Umgebung des Ausführungsganges einer Schleimdrüse darstellen.

Der Ausführungsgang der Drüse ist nur im Bereiche des geschwellten Gewebes erweitert, das Pflasterepithel der Schleimhaut setzt sich auf die Granula fort und erscheint zuweilen auf der Höhe derselben verdünnt, manchmal fehlt es sogar völlig. Die zwischen den Granulationen liegende Schleimhaut ist theils normal theils hyperämisch und von erweiterten Gefässen durchzogen.

Bresgen hält die Granula für angeboren; Roth widerspricht ihm und behauptet, dieselben bei Neugebornen niemals gesehen zu haben; bei Kindern unter 6 Jahren sind sie sehr selten während sie nach dem 6. Jahre allmählich häufiger werden; Roth sah dieselben wiederholt bei Erwachsenen sich erst entwickeln. Die Zunahme der Granula mit dem wachsenden Alter erklärt sich wohl aus der Intensität und Vielfältigkeit der Reize, welche in allmählicher Progression die Rachenschleimhaut treffen. Während bei Säuglingen und jüngeren Kindern durch die reizlose und milde Kost und die seltene Gelegenheit zu Erkältungen die Entwicklung der Granula verhindert wird, werden dieselben im späteren Kindesalter durch die Theilnahme am Tische der Eltern sowie in Folge der beim Schulbesuche unvermeid-

lichen Erkältungen und die intercurrirenden durchweg mit acuten Anginen verlaufenden Kinderkrankheiten allmählich häufiger. Dazu gesellen sich mit dem 12. Lebensjahre oft noch viel früher der Reiz der Cigarre und die erwachende im Jünglings- und Mannesalter sich noch steigernde Vorliebe für Alcoholica sowie die eingangs beschriebenen Berufsschädlichkeiten. Was Wunder also, wenn es kaum einen erwachsenen Menschen gibt, der völlig frei wäre von Granulationen. Wenn das weibliche Geschlecht auch nicht ganz von denselben verschont bleibt, so erkrankt dasselbe doch nicht in dem Masse wie das männliche. Die Anwesenheit von Granulationen bedingt jedoch durchaus nicht immer Beschwerden; diese letzteren entstehen meistens dann, wenn das hyperplastische um die erweiterten Ausführungsgänge der vergrösserten Schleimdrüsen gelegene lymphatische Gewebe oder die zwischen den einzelnen Granulationen befindliche Schleimhaut sich entzündet.

Combinationen der granulösen Form mit der einfachen Form des chron. Rachenkatarrhs kommen unendlich häufig zur Beobachtung. Ab und zu finden sich auf der Schleimhaut hirsekorn- bis linsengrosse Erhabenheiten, welche an der Spitze einen gelben Punkt tragen und verstopfte Balgdrüsen mit verfettetem Inhalt vorstellen; häufig begegnet man denselben auf den Gaumenbögen und auf der Tonsille.

Localisirt sich der Entzündungsprocess an den Seitenwänden des Rachens, so bezeichnet man denselben als **Pharyngitis lateralis hypertrophica** oder als **Entzündung der Seitenstränge** (Michel, M. Schmidt, Hering).

Bei der Inspection der Hinterwand sieht man, weniger deutlich oder auch gar nicht bei ruhigem Velum, hingegen deutlicher bei Würgebewegungen, unmittelbar hinter dem Arcus palatopharyngeus einen bald blass- bald intensiv rothen länglichrunden oder platten Wulst, der gegen die Mittellinie vorspringt und sich nach oben oder nach unten meist nach beiden Richtungen fortsetzt. Der Umfang dieses Wulstes oder Stranges oder Schleimhautfalte wechselt zwischen der Dicke eines dünnen Bleistiftes und eines kleinen Fingers. Wie man durch Inspection und Palpation eruiren kann, verliert sich derselbe nach oben zu in den Tubenwulst, stellt also eine wahre Hypertrophie der Plica salpingopharyngea vor. Dieselbe kann eine längliche, haselnussgrosse, fleischähnliche Geschwulst bilden, die sich nach unten verschmälert und sich zuweilen mit einem mit vielen Trachomkörnern besetzten Conjunctivalwulst vergleichen lässt. Sehr oft geht der entzündete Seitenstrang nicht in die Plica salpingophar. über, sondern hält sich ganz in der äussersten seitlichen Ecke des Rachens und verliert sich unterhalb und nach aussen vom Tubenwulst oder zieht in leichtem Bogen nach vorne gegen die Hakenkrümmung zu. Die Tubenwülste und seine Falten zeichnen sich in der Ruhe und bei Bewegung scharf von diesem Strange ab, welcher bei der Phonation und beim Schlucken eine leichte Einwärtsbewegung ausführt. In der Nähe des hintern Gaumenbogens verbreitert sich sehr oft die hypertrophische Schleimhautfalte zu einer flachen glatten

oder unebenen oft ganz aus Granulationen bestehenden oder mit einzelnen Granulis besetzten Coulisse, welche bei Würgebewegungen nach einwärts vorgedrängt wird. Diese oft perlschnurartige Verdickung der Schleimhaut verliert sich entweder im Niveau der Insertion des hintern Gaumenbogens oder setzt sich nach unten zu fort, um in der Höhe der Kehldeckelspitze plötzlich oder allmählich in die normale Schleimhaut überzugehen.

Die Pharyngitis lateralis ist meist doppelseitig, häufig aber auf einer Seite stärker entwickelt. Die zwischen den hypertrophischen Seitensträngen liegende Schleimhaut kann normal oder mit Granulationen besetzt oder in anderer Weise verändert sein.

Hering unterscheidet die Pharyngitis lateralis granulosa von der eigentlichen Pharyng. lat. hypertr. Unter ersterer versteht er ein Conglomerat von Granulationen, welche auf den geschwellten und congestionirten Falten der Seitenwand um die Plica salpingopharyngea herum oder unterhalb derselben ihren Sitz haben, unter letzterer die oben beschriebene Hypertrophie der Plica salpingopharyngea und ihrer nach unten sich fortsetzenden Schleimhautpartien.

Die chronische **Entzündung des weichen Gaumens** ist meist eine Theilerscheinung des chronischen Katarrhs der Hinterwand, oft ist sie die einzige Veränderung, welche im Rachen wahrzunehmen ist.

Ihre objectiven Erscheinungen bestehen in Röthung des Velum, das von erweiterten Gefässen durchzogen und durch die Schwellung zahlreicher Drüsen uneben ist. Das Velum erscheint ferner verdickt, die Gaumenbögen sind in dicke rothe Wülste umgewandelt, ihre Beweglichkeit ist mehr oder weniger beschränkt. Die blaurothe ödematöse an ihrer Vorderfläche durch geschwellte Balgdrüsen unebene Uvula stellt einen langen dicken plumpen Zapfen vor, der mit nach einer Seite gewendeter Spitze auf den Rücken der Zunge herabhängt, oder durch Schleimfäden an die Hinterwand angeklebt ist. Die Schleimhaut der Uvula hängt besonders in ihrem untersten Theile als leerer Sack herab; zuweilen erscheint das Epithel getrübt und milchig.

Eine weitere Form der chronischen hyperplastischen Pharyngitis ist die **Hypertrophie der Gaumenmandeln.**

Aetiologisch kommen bei vielen Kranken häufige acute und phlegmonöse sowie syphilitische und diphtheritische Anginen in Betracht.

Manchmal gelangt ein intratonsillärer Abscess nicht zum Durchbruch sondern verläuft mit beträchtlicher Volumzunahme chronisch. Eine besondere Disposition zeigt das Kindesalter; mit Vorliebe werden anämische und scrophulöse Kinder befallen, zuweilen erscheint die Disposition zu Tonsillarhypertrophie erblich. Bei Kindern können deshalb weniger recidivirende Anginen als vielmehr eine gewisse lymphatische Disposition, die sich gleichzeitig in der Schwellung der Halslymphdrüsen und des cytogenen Gewebes des Nasenrachenraumes äussert, als ätiologisches Moment herangezogen werden. Gerhardt glaubt in derselben manchmal die letzten Ausläufer elterlicher Sy-

philis zu erblicken. Für das Vorkommen in den ersten Lebensmonaten dürfte nach M. Mackenzie Ekzem und Impetigo des Gesichts und Kopfes, sowie Blennorrhoea neonat., Rhinitis blennorrhoica verantwortlich gemacht werden; das Auftreten der Krankheit zur Pubertätszeit wollen Manche auf einen sympathischen Zusammenhang mit den Genitalien zurückführen.

Die Hypertrophie der Gaumenmandeln betrifft sämmtliche Gewebe. Die Follikel sind vergrössert und vermehrt, das interstitielle Bindegewebe verdickt, ebenso der Schleimhautüberzug. Die Consistenz der vergrösserten Mandeln ist verschieden, bei scrophulösen Kindern weich-elastisch, bei den aus häufigen acuten Anginen hervorgegangenen Formen meist sehr hart; nicht selten finden sich kalkige Einlagerungen in denselben.

Bei der Inspection fällt besonders die Volumzunahme einer oder beider Tonsillen auf. Die Vergrösserungen haben nach allen Richtungen stattgefunden; die Organe ragen weit in den Isthmus faucium herein, in hochgradigen Fällen berühren sie sich oder lassen nur einen schmalen Raum zwischen sich übrig, in dessen oberem Theile die oft gleichfalls hypertrophische Uvula hervorschaut; der Blick auf die hintere Wand ist nur theilweise möglich. Nach oben und hinten zu ragen die Mandeln in den Nasenrachenraum, nach unten bis auf den Zungengrund, nach vorne drängen sie das Velum in die Mundhöhle herein. Ihre Schleimhaut ist bald geröthet bald blass, ja sogar von gelblicher Farbe, ihre Oberfläche meist uneben und von netzförmigen Narben und schüsselförmigen Vertiefungen bedeckt, ihr Parenchym zerklüftet, zerfetzt, an einzelnen Stellen sogar atrophisch und defect.

Sehr oft combinirt sich die Hypertrophie der Gaumenmandeln mit jener der Rachenmandel oder mit Pharyngitis granulosa oder Hypertrophie der Seitenstränge. Da die Tonsillarhypertrophie, wie erwähnt, theilweise aus entzündlichen Processen hervorgeht und umgekehrt auch wieder zu acuten Anginen und Follikularverschwärungen Anlass gibt, so finden sich bei ihr häufig indolente Schwellungen der Halslymphdrüsen. Selbst sehr beträchtlich vergrösserte Tonsillen können aussen am Halse nicht gefühlt werden; was man hier fühlt, sind geschwellte Lymphdrüsen oder Infiltrate des Bindegewebes.

Mit der Pars oralis zusammen oder auch für sich allein erkrankt die **Pars laryngea pharyngis**. Der objective Befund gestaltet sich hier ziemlich einfach; die hintere Rachenwand erscheint im Kehlkopfspiegel mehr oder weniger geröthet, mit Schleim bedeckt, uneben und leicht höckerig. Die Unebenheiten sind fast durchweg durch die Schwellung der Schleimdrüsen bedingt, seltener durch Granula, welche sich durch ihren grösseren Umfang und ihre Form deutlich von den ersteren unterscheiden.

An der Erkrankung der tieferen Rachentheile nimmt sehr oft der Kehlkopf Theil. Die Ligam. aryepigl., die Incis. interaryt. manchmal die ganze Hinterwand erscheinen mehr oder weniger geröthet und geschwellt, die Schleimhaut der Regio interarytaen. convex nach vorne gewölbt und mit zähem Schleim bedeckt. Seltener verbreitet

sich die Röthe auch auf die Stimmbänder, in der Regel ist in Folge der erwähnten Schleimhautschwellungen und durch Muskelparesen der Verschluss der Glottis ein mangelhafter.

Nachdem wir gesehen haben, dass die Pharyngitis chronica weitaus am häufigsten mit Hypertrophie der Schleimhaut einhergeht, müssen wir auch des Ausganges in Atrophie gedenken.

Man bezeichnet diese Form als **Pharyngitis chronica atrophicans** sive **sicca** oder auch als rareficirenden Rachenkatarrh. Die Atrophie betrifft die Schleimhaut in verschiedener Ausdehnung und in verschiedenem Grade. Ganz besonders muss betont werden, dass neben bereits atrophischen Stellen noch sehr häufig hypertrophische sich vorfinden. Wenn auch der Beweis, dass die Atrophie sich stets aus der Hypertrophie entwickelt, nicht stricte zu erbringen ist, weil man selten in der Lage sein wird, den chronischen Rachenkatarrh von seinem ersten Anfange an bis zu den letzten Veränderungen zu verfolgen, so dürfte dies doch aus Gründen der Analogie höchst wahrscheinlich erscheinen. Die Frage, ob die Atrophie sich nicht manchmal primär d. h. ohne vorausgegangene Hypertrophie entwickelt, muss als offene bezeichnet werden.

Der unstreitig am häufigsten von Atrophie befallene Theil des Rachens ist der Nasenrachenraum und die Pars oralis, sehr häufig schneidet die Atrophie haarscharf in der Höhe der Uvula oder im Niveau der Insertion derselben an dem Velum ab; nicht gar selten setzt sich dieselbe in die Pars laryngea und sogar den Kehlkopf fort, am allerseltensten aber wird, wie Verfasser nur einige Male sah, die vordere Fläche des Gaumensegels und die Mundschleimhaut befallen. Die Schleimhaut erscheint dünn und zart, glänzend und legt sich bei der Contraction der Muskeln in feine deutliche Lichtreflexe zeigende Fältchen. Die unter der Schleimhaut sichtbaren Muskeln verleihen derselben das Aussehen von rohem geräucherten Fleisch und purpurrother bis blassrother Farbe. Die Rachenhöhle erscheint, wenn die Atrophie grössere Strecken ergriffen hat, weiter, was besonders bei dem Schwunde des cytogenen Gewebes der Pars nasalis hervortritt. Die Tubenwülste springen theils in Folge der Atrophie ihres Ueberzuges theils ihrer nächsten Umgebung deutlich vor, ebenso die hinteren Muschelenden.

In Folge des Unterganges zahlreicher Schleimdrüsen ist die Secretion mehr oder weniger vermindert und verändert.

Das meist spärliche Secret überzieht wie eine Tapete die Schleimhaut und verleiht derselben einen firnissartigen Glanz, es haftet in Folge des geringen Wassergehaltes der Unterlage so fest an, dass man es mit der Pincette abziehen muss. Die Behauptung, dass der trockene Rachenkatarrh nur im Gefolge einer fötiden Rhinitis auftrete, und dass das zu festen Borken eintrocknende öfters fötide Secret stets aus der Nase stamme, ist unrichtig. Wenn es auch richtig ist, dass die Rhinitis foetida ausnahmslos mit Pharyngitis sicca einhergeht, so ist doch in sehr vielen Fällen von Pharyngitis sicca die Nase durchaus unbetheiligt. Der trockene Rachenkatarrh

kommt ebensogut im Kindes- wie im Mannesalter vor, doch lässt sich nicht in Abrede stellen, dass er im höheren Alter oder bei sonst schlecht genährten Personen, bei Scrophulösen, Anämischen, Tuberculösen häufiger ist.

Löri hält atrophische Katarrhe des Rachens, der Nase, des Kehlkopfes für nahezu constante Begleiter der fettigen Degeneration des Herzens und anderer marantischer Processe.

In einem gewissen noch nicht näher erforschten Causalverhältniss stehen dieselben ferner mit Diabetes mellitus und Morb. Brighti; es empfiehlt sich deshalb, in jedem Falle eine genaue Untersuchung des Harns und des Gesammtorganismus vorzunehmen.

Der Vollständigkeit wegen sei erwähnt, dass Atrophie nicht nur der Schleimhaut sondern auch aller Rachengebilde namentlich des weichen Gaumens und der Uvula wahrscheinlich in Folge vorausgegangener acuter und chronischer Entzündungen bei Tuberculösen sowie im Greisenalter beobachtet wird. Das Gaumensegel erscheint blass, dünn und mager, die Uvula klein und spitzig. Die Atrophie der Tonsillen ist fast immer das Product vorausgegangener entzündlicher namentlich lacunär-folliculär-ulceröser Processe; sie ist bald einseitig bald doppelseitig, oder was sehr häufig beobachtet ist, die eine Tonsille ist hypertrophisch die andere atrophisch. Die Oberfläche solcher atrophischer Mandeln ist meist stark zerklüftet und uneben, die Schleimhaut blass, verdickt und narbig.

Es erübrigt nun noch, jener Form des chronischen Rachenkatarrhs zu gedenken, welche Hoppe als **stinkende** oder **fötide Pharyngitis** bezeichnet. Nach den bisherigen Beobachtungen scheint der Process mit dem der Rhinitis foetida identisch zu sein. Roth konnte sich durch die Tamponade der Choanen überzeugen, dass das fötide Secret nicht aus der Nase stamme sondern auf der Rachenschleimhaut selbst erzeugt werde. Die Affection tritt theils in Combination mit Ozaena theils selbstständig auf. Mit der Störk'schen Blennorrhoe scheint sie sehr nahe verwandt zu sein, doch ist es ein Charakteristikum der ersteren, dass der Process stets in der Nase beginnt und sich erst im weiteren Verlauf auf Rachen, Kehlkopf und Luftröhre ausbreitet.

Wir wenden uns nun zur Symptomatologie.

Zu den frühesten und constantesten Erscheinungen gehören perverse Sensationen im Rachen.

Am häufigsten wird über Trockenheit im Halse geklagt, nicht minder über Verschleimung. Man würde sich jedoch sehr täuschen, wollte man annehmen, dass in ersterem Falle die Schleimhaut ausnahmslos trocken und mit wenig, in letzterem Falle mit dünnem und reichlichem Secrete bedeckt wäre. Constant sind die Klagen über Trockenheit nur bei Pharyngitis sicca, weshalb die meisten Kranken ohne gerade Durst zu empfinden, den Rachen öfters anfeuchten. So verschieden wie die Quantität ist auch die Qualität des Secretes. Dasselbe ist in der Regel grau, glasig, zäh, bald mehr schleimig, schleimig-eitrig, blutig gestreift oder sehr selten rein blutig. Gelbes

rein eitriges, flüssiges oder zu Borken eingetrocknetes Secret deutet meist auf Ulcerations-Processe oder Ozaena hin. Das Secret haftet entweder nur an einzelnen Stellen der Schleimhaut in Form kleiner grauer Klümpchen oder überzieht wie bei dem atrophischen Katarrh die ganze Schleimhaut gleichmässig. Die natürliche Folge dieser Secretionsanomalien ist das Bedürfniss, durch Räuspern das vorhandene oder eingebildete Secret zu entfernen. Die Entfernung geschieht theils durch kräftige tönende Exspiration, das sogenannte „hem hem", oder auch bei geschlossenem Munde durch rasches Einziehen von Luft in den Nasenrachenraum oder unter gleichzeitiger heftiger Erschütterung des weichen Gaumens.

Ein weiterer Grund für das häufige Räuspern liegt in dem Gefühl des Kranken, einen Fremdkörper, ein Haar, eine Gräte, eine Nadel, Sandkörner und andere Dinge im Halse zu haben. Durch die fruchtlosen immer wiederholten Versuche, diesen Fremdkörper oder den angesammelten und zu Klumpen vertrockneten Schleim zu entfernen, steigert sich die Röthung und Empfindlichkeit der Schleimhaut derart, dass Brechen und Würgen und vermehrtes Schluckbedürfniss eintritt. Das letztere führt nicht selten zu abnormer Luftauftreibung des Magens, Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden; der Vomitus matutinus ist viel häufiger eine Rachen- als eine Magenaffection.

Wirkliche Schmerzen beim Schlucken fehlen in der Regel, doch können eingetrocknete harte Secretmassen besonders bei der atrophischen Form zu stechenden Schmerzen Anlass geben.

Unangenehme brennende, manchmal auch Kältegefühle, Kratzen, Drücken, treten spontan oder bei der Nahrungsaufnahme, beim Rauchen und dem Genusse zu heisser oder gewürzter Speisen, hauptsächlich der Alcoholica auf. Manchen Kranken verursacht selbst der Genuss einfachen frischen Wassers abnorme Sensationen; bei der atrophischen Form werden die Beschwerden sehr oft nach dem Genusse reizender Ingesta wahrscheinlich in Folge der durch die vermehrte Blutzufuhr momentan gesteigerten Secretion gelindert, zuweilen für einige Stunden völlig beseitigt.

Dass viele mit zahlreichen entzündeten Granulationen und Hypertrophie der Seitenstränge, selbst mit Pharyng. sicca Behaftete, keine Beschwerden haben, während Andere bei Anwesenheit geringfügiger Veränderungen die allarmirendsten Erscheinungen darbieten, hängt theils von der verschiedenen Erregbarkeit des Nervensystems theils von dem Grade der begleitenden entzündlichen Erscheinungen ab. M. Schmidt erklärt das Fehlen jeglicher Symptome trotz der Anwesenheit entzündeter Seitenstränge aus dem Umstande, dass dieselben in diesen Fällen nicht bis zum Constrictor pharyngis supr. hinaufragen und bei der Contraction dieses Muskels nicht insultirt werden. Sehr häufig sind namentlich bei Hypertrophie der Seitenstränge die Beschwerden wechselnd, auf wochen- selbst monatelange Euphorie folgen Zeiten der quälendsten Belästigung.

Bei sensibeln zuweilen aber auch bei robusten Personen gehören neuralgische in entfernten Organen sich abspielende Erscheinungen

— Reflexneurosen — zu den gewöhnlichen Vorkommnissen. Bei weiblichen Personen sind reflectorische Krämpfe am Eingang des Oesophagus ziemlich häufig. Ebenso können Asthma, Migräne, Brustschmerz am Sternum und andere Reflexerscheinungen, auf die wir bei den Krankheiten der Nase näher eingehen müssen, Folgen eines gewöhnlichen Rachenkatarrhs oder katarrhalischer und cystöser Erkrankung der Bursa pharyngea sein. Es ist ein Verdienst von Hack, auf die angedeuteten Krankheitszustände sowie auf das Vorkommen spontan auftretender plötzlich durchfahrender Stiche zwischen den Schulterblättern und rheumatischer meist nur bei Muskelcontractionen sich einstellender Schmerzen über den Schlüsselbeinen aufmerksam gemacht zu haben.

Eine ebenfalls hieher gehörige Reflexerscheinung ist Husten. Wenn auch in der weitaus grössten Zahl der Fälle bei Pharyng. chron. kein Husten beobachtet und derselbe meist mit Räuspern verwechselt wird, so ist doch jetzt durch exacte Beobachtungen unumstösslich sichergestellt, dass in der That von der Pharynxschleimhaut aus Husten erzeugt werden kann. Verfasser hat wiederholt Hustenanfälle (Rachen- oder Spinnenhusten) sowohl spontan entstehen sehen als auch dieselben durch Berührung der Granula und Seitenstränge mit auffallender Promptheit erzeugen können. Der sogenannte „Rachenhusten", nach Schadewald und Wille pharyngealer Trigeminushusten genannt, hat abgesehen von den positiven Experimenten Koht's seine entschiedene Berechtigung. Wenn Störk denselben aus der Reizung des Kehlkopfes durch Hinabfliessen des Secrets erklärt, so ist dies nur zum Theile richtig; bei Miterkrankung des Kehlkopfes, mag sie noch so unbedeutend sein, bedarf das Auftreten von Husten ohnehin keiner weiteren Erklärung.

Höchst schädlich wirkt der chron. Rachenkatarrh namentlich die Hypertrophie der Seitenstränge auf die Stimme.

Mag man einen Lehrer oder Officier, einen Sänger oder Schauspieler hören, alle klagen über rasche Ermüdung der Stimme, über den Verlust des Metalles, über Schwierigkeit bei der Production höherer Töne. Diese Symptome erklären sich theils aus der Reibung und Reizung des Kehlkopfes in Folge des ewigen Räusperns, theils aus den anatomischen Veränderungen, welche die Rachenschleimhaut erlitten hat. Michel, dessen Erörterungen sich der Verfasser vollständig anschliesst, erklärt sie folgendermassen:

Die Rachenwand bildet den hauptsächlichsten Reflector für die aus der Kehle strömenden Schallwellen; hier und gegen das Velum schlagen sie zuerst an. Ist diese Wand nun nicht glatt, sondern höckrig uneben durch Granulationen und Hypertrophien, so müssen sich Klangschatten bilden, gerade so wie eine bucklige Spiegelfläche von einem vorgehaltenen Gegenstande nur ein entstelltes Bild geben kann. Durch den mangelhaften Reflex erleidet also der Ton Einbusse, er wird abgeschwächt, er trägt nicht weit, oder was dasselbe ist, er verliert sein Metall.

Granulationen und Flächenhypertrophien, die an den hintern Gaumenbögen sitzen, belasten dieselben, machen sie steif, mehr oder weniger starr, wodurch ihre Beweglichkeit vermindert wird; dann aber werden letztere auch schwingungsunfähiger, pflanzen die sie treffenden Schallwellen nicht weiter fort und dadurch geht wieder ein Theil von diesen verloren.

Die Pharyng. lat. hypertr. beeinträchtigt die Beweglichkeit des Gaumensegels dadurch, dass sie dem Emporsteigen desselben hinderlich ist, auch verschlechtert sie als eine fleischige Masse die Resonanz.

Ein weiteres Hinderniss für die Entfaltung der Stimme liegt in der durch anhaltend lautes Sprechen und Singen hervorgerufenen Schwellung, Erhitzung und Trockenheit der Schleimhaut. Durch den Versuch, diese verschiedenen Hindernisse zu überwinden und den Ausfall an Klang zu ersetzen wird deshalb die Stimme oft über Gebühr angestrengt und forcirt, was durch krankhafte oft sichtbare Ermüdung der Kehlkopfmuskeln Schwäche der Stimme und Verlust des Metalles zur Folge hat.

Endlich darf man nicht vergessen, dass nach den Beobachtungen Gerhardt's durch krankhafte Processe im Rachen auf reflectorischem Wege Stimmbandlähmungen entstehen können.

Störungen des Gehörs kommen bei chronischen Katarrhen des Nasenrachenraumes äusserst häufig vor. Die Ohraffection ist theils primär theils secundär, d. h. von der Schleimhaut des Rachens auf jene der Tuba und des Mittelohres fortgeleitet und wird deren Rückbildung durch die bestehende Rachenaffection verhindert oder verzögert. Die die Tonsillarhypertrophie so häufig begleitende Schwerhörigkeit hat weniger ihren Grund in directem Verschluss (Compression) des Tubeneingangs durch das vergrösserte Organ, als vielmehr in dem die Tonsillarhypertrophie begleitenden entzündlichen Katarrh der Tubenmündungen.

Bei der Summe der verschiedenen Störungen ist es nicht zu verwundern, wenn der chron. Rachenkatarrh auch auf das Allgemeinbefinden besonders auch auf das Gemüthsleben in äusserst schädlicher Weise einwirkt.

Deprimirte Gemüthsstimmung, Sterbegedanken, die Idee, dass sich eine unheilbare Halsschwindsucht oder ein Krebsleiden entwickelt habe, führen durch mangelhafte Ernährung, unruhigen, ungenügenden Schlaf zu Mattigkeit, Anämie, Lebensüberdruss mit Selbstmordgedanken und kennzeichnen so die echte Hypochondrie des Halses. Die Sorge um die Erhaltung des Lebens veranlasst die Kranken zu peinlichster Auswahl der Speisen und Getränke, zu Vermeidung aller selbst der schwächsten Alcoholica, ja selbst aller festen Nahrung, zu dem Gebrauche der ekelhaftesten Medicamente, zu möglichst dicker Umhüllung des Halses und zu einer bis zum Fanatismus gesteigerten Scheu vor frischer Luft und Berührung mit kaltem Wasser. Wie weit die psychische Verirrung gehen kann, mag daraus erhellen, dass eine mit hochgradiger Hypertrophie der Seitenstränge behaftete Dame meiner Clientel monatelang nur noch frischgelegte Eier genoss und

dieselben auf das Sorgfältigste manchmal sogar mikroskopisch untersuchen liess, weil sie von der fixen Idee befangen war, dass die sie quälenden kratzenden Gefühle durch absichtliche Beimengungen von Sand und Steinen zu den Speisen verursacht seien.

Zum Schlusse erübrigt noch auf die Beschwerden einzugehen, welche die Hypertrophie der Uvula und der Gaumenmandeln hervorbringen.

Man hat dem hypertrophischen Zäpfchen so schauderhafte Folgen nachgesagt, dass es nicht unnöthig erscheint, die wirklichen Störungen von den eingebildeten zu sondern.

Dass die Vergrösserung der Uvula die Ursache der Lungenschwindsucht sei, glaubt heutzutage kaum mehr ein altes Weib. Dass die Uvula durch Herabhängen auf die Stimmbänder Erstickungserscheinungen verursache, gehört gleichfalls in das Bereich der Fabel. Richtig ist, dass dieselbe in höchst seltenen excessiven Fällen bis zum Kehldeckel herabreichen und dadurch Reizhusten, unter Umständen eine Art Glottiskrampf erzeugen kann. Hyrtl erwähnt ferner einen Kranken, der sich seine abnorm vergrösserte Uvula beim Husten abbiss. Für gewöhnlich beschränken sich jedoch die Beschwerden auf das Gefühl eines Fremdkörpers, auf Kitzel und Verschleimung, Würge- und Brechreiz. Die Stimme ist öfters unrein, durch Parese des Azygos uvulae und Mehrbelastung des Velum leicht nasal.

Die Erscheinungen der Hypertrophie der Gaumenmandeln decken sich nahezu mit jenen der Hypertrophie der Rachenmandeln.

Die Respiration ist auch hier sowohl bei Körperbewegungen als auch in der Ruhe laut hörbar, der Schlaf unruhig und durch plötzliche Erstickungsanfälle und Aufschrecken (Pavor nocturnus) unterbrochen, durch Schnarchen äusserst störend. Durch Offenstehen des Mundes bekommt auch hier das Gesicht den bekannten blöden Ausdruck, manchmal sind auch Gehörstörungen vorhanden. Die Sprache klingt durch Verengerung des Schallrohrs matt, dumpf und klanglos, oft mit nasalem Timbre, der Umfang der Singstimme wird beschränkt, öfters will man eine Erhöhung der Stimmlage beobachtet haben. Schmerzen beim Schlingen fehlen, die Deglutition ist für festere gröbere Substanzen und grössere Bissen erschwert und verlangsamt. Die Klagen über Fremdkörpergefühle, vermehrte Schleimabsonderung, vermehrtes Räusper- und Schluckbedürfniss sind dieselben wie bei den andern Formen des chronischen Rachenkatarrhs. Eine besonders nachtheilige Wirkung übt die Tonsillarhypertrophie auf die Entwicklung der Kinder aus; dieselbe ist meist noch viel ausgesprochener wie die welche bei den adenoiden Wucherungen bereits erwähnt wurde.

Das Gesicht und die Nase wachsen nicht im Verhältnisse zu dem übrigen Körper, die Nasenlöcher bleiben klein, die Oberlippe wird grösser, die Nasolabialfalte verflacht sich, das Dach der Mundhöhle wird stärker gewölbt, zugespitzt, die Alveolarfortsätze verschmälern sich, die Schneidezähne treten übereinander. In Folge der mangelhaften Sauerstoffaufnahme werden die Kinder anämisch, der Blick matt, das Gesicht gedunsen mit einem Anflug von Cyanose,

die Muskulatur schlecht entwickelt. Bei längerem Bestande der Krankheit bleibt auch die Rückwirkung auf den Thorax nicht aus. Derselbe ist flach, lang und schmal, mit einem Worte paralytisch, öfters trägt er den rhachitischen Charakter der Hühnerbrust oder zeigt an den untern seitlichen Partien die Eindrücke der Arme. Ein weiterer Nachtheil grosser Mandeln ist die ausgesprochene Neigung zu häufigen lacunären oder phlegmonösen Anginen, vielleicht auch grössere Disposition zu Diphtherie.

Die Diagnose des chronischen Rachenkatarrhs stützt sich auf die subjectiven und objectiven Erscheinungen. Der Anfänger beherzige stets, dass in zahlreichen Fällen der objective Befund in keinem Verhältnisse steht zu der Heftigkeit der subjectiven Beschwerden und lasse sich dadurch in seiner Diagnose nicht beirren. Nur beim gänzlichen Mangel oder äusserster Geringfügigkeit der objectiven Veränderungen im Rachen und am Zungengrund stelle man die Diagnose auf nervöses Halsleiden. Da Geschwüre bei dem idiop. chron. Rachenkatarrh niemals vorkommen, so denke man bei der Anwesenheit solcher in erster Linie an Syphilis, dann an Tuberculose, Lupus, Herpes etc. Die Differentialdiagnose zwischen Larynx- und Bronchialkatarrh und Pharyngitis ist in der Regel leicht, manchmal erst nach längerer Beobachtung sicherzustellen. Auf die Angaben des Kranken, dass der Schmerz oder die unangenehmen Empfindungen nur auf einer Seite, hoch oben, in der Mitte oder tief unten ihren Sitz hätten, kann man sich bei dem geringen Localisationsgefühl des Rachens zwar nicht verlassen, doch hat sich dem Verfasser die Berührung der erkrankten oder verdächtigen Schleimhautpartien besonders der Granula und Seitenstränge mittelst der Sonde insoferne als ein diagnostischer Behelf erwiesen, als die gänzlich unvorbereiteten Patienten fast ausnahmslos über plötzlichen Schmerz klagen und die betreffenden Schleimhautstellen mit Bestimmtheit als den Sitz ihrer Beschwerden bezeichnen.

Bei Kindern vergesse man nicht, dass die Hypertrophie der Gaumenmandeln sehr oft mit Hypertrophie der Rachenmandel combinirt ist, und dass diese Combination um so sicherer vorliegt, wenn die kleinen Patienten nach Beseitigung der Tonsillarhypertrophie immer noch schnarchen, immer noch den Mund offen haben und schlecht sprechen.

Der Verlauf kann sich über viele Jahre selbst das ganze Leben erstrecken. Zeitweise namentlich bei Witterungswechsel, psychischer Erregung, Aufnahme gewisser Ingesta, werden die Beschwerden weniger stark empfunden. Der Status der Schleimhaut kann lange Zeit völlig unverändert bleiben, in der Regel aber nimmt die Hypertrophie stetig zu oder es tritt Atrophie ein.

Die Prognose ist quoad vitam günstig. Wenn auch der chronische Rachenkatarrh niemals direct zum Tode führt, so kann derselbe doch, wie aus den geschilderten Beschwerden hervorgeht, den damit Behafteten das Leben gründlich verbittern. Während noch vor einem Decennium der chronische Rachenkatarrh zu den unheilbaren Krank-

heiten gezählt wurde, ist dies jetzt dank den Bestrebungen der neueren Therapie anders geworden. Die hypertrophische Form kann gründlich und dauernd geheilt werden, eine schlechte Prognose gibt nur die atrophische Form, da wir zur Zeit noch kein Mittel besitzen, eine atrophische Schleimhaut wieder zur Norm zurückzuführen.

Therapie. Bei wenigen Affectionen findet man noch so unklare Ansichten über die Behandlung als beim chronischen Rachenkatarrh. Die ausführliche Besprechung der modernen Behandlungsmethoden der chronischen Pharyngitis hält deswegen der Verfasser sowohl im Interesse des Arztes als des Patienten für äusserst nothwendig.

Die Kranken, welche ernstlich gewillt sind, von ihrem Leiden loszukommen, mögen jedoch niemals vergessen, dass eine Heilung nur bei grösster Consequenz und Ausdauer möglich ist, und dass eine Affection, die schon Jahre bestanden hat, sich nicht in wenigen Tagen oder Wochen beseitigen lässt.

Da man der Indicatio causalis fast nie genügen kann, so muss man sich in den meisten Fällen mit einem prophylaktischen und mehr hygienisch-diätetischen Verfahren begnügen. Es ist selbstverständlich, dass Anämie, Scrophulose und Hämorrhoidalzustände beseitigt, der Genuss stärkerer Alkoholica und gewürzter zu heisser Speisen sowie das Rauchen und Schnupfen verboten oder thunlichst eingeschränkt werden. In staubender Luft Arbeitende müssen sich durch respiratorähnliche Vorrichtungen schützen und während der Dauer der Behandlung die gewohnten Räume meiden, Berufsredner müssen sich beurlauben lassen, eventuell von ihren Sprachwerkzeugen möglichst wenig Gebrauch machen. Da der chronische Rachenkatarrh ein örtliches Leiden vorstellt, so muss die Behandlung auch vorzüglich eine örtliche sein.

Es ist daher einleuchtend, dass Bade-, Trink- oder hydropathische Curen ohne gleichzeitige Localbehandlung nicht die richtigen Heilmittel sein können. Trotzdem lehrt die Erfahrung, dass der bei Arzt und Publicum noch gleich starke Glaube an die Heilkraft gewisser Brunnen jährlich pecuniäre Opfer fordert, welche mit den erzielten Resultaten in keinem Verhältnisse stehen.

Bei der ungemeinen Verbreitung des chronischen Rachenkatarrhs ist es nicht zu verwundern, dass derselbe unter den Indicationen der meisten Curorte eine Stelle gefunden hat; und so rühmen denn sowohl die alkalischen und kochsalzhaltigen, besonders die jodhaltigen Quellen ihre ganz besondere Heilkraft, als auch die Schwefelquellen und die erdig-mineralischen Wässer. Der Nutzen aller dieser Wässer besteht darin, dass die Kranken während der Cur eine Linderung ihrer subjectiven Beschwerden verspüren, die jedoch nach ihrer Rückkehr in die Heimat mit alter Heftigkeit wieder erscheinen. Auf die Nutzlosigkeit solcher Brunnencuren ohne gleichzeitige Localbehandlung wurde zwar wiederholt besonders eindringlich von Bresgen und Leichtenstern hingewiesen, doch dürfte es noch lange dauern, bis sich die Ansicht von der Nothwendigkeit der localen Behandlung in den Curorten allgemein Bahn brechen wird.

Einen ähnlichen Werth haben die Gurgelungen, Inhalationen und Berieselungen mit dem Spray. Die ersteren haben, wie bereits erwähnt, nur einen Nutzen bei den Erkrankungen des Isthmus faucium; die letzteren sind zwar zur Reinigung und Befeuchtung der Schleimhaut nicht zu entbehren, besitzen aber durchaus keine Heilkraft. Verfasser zieht den kalten Spray vor theils zur schnellerên Abstumpfung der übergrossen Reizbarkeit, theils um die meist schon allzusehr an die Wärme gewöhnten Schleimhäute allmälig widerstandsfähiger zu machen und verwendet nur die Resolventia, besonders 1% bis 2% Lösungen von Natr. bicarb., Kali carb., Natr. chlorat.; in manchen Fällen wirkt 4% Bromkalilösung beruhigend. Zur Reinigung des Nasenrachenraumes lasse man entweder die Nasendouche gebrauchen oder die ebengenannten Lösungen einfach aufschnupfen, bei Kindern mit dem Löffel eingiessen.

Rationelle Mittel besitzen wir hingegen in den Bepinselungen oder Insufflationen.

Handelt es sich um gleichmässige Röthung mit sammtartiger Schwellung der Schleimhaut oder um frische Fälle von Hypertrophie der Uvula, dann beginne man mit täglichen Bepinselungen einer starken Tanninlösung (5 : 20), die man später durch allmälig stärker werdende Höllensteinlösungen (1 : 20—10) ersetzt.

Bei einigermassen beträchtlicher Schwellung bewährt sich jedoch kein Mittel so gut wie das Jod, resp. die Mandl'sche Solution. Es empfiehlt sich, je nach der Schwere des Falles mehrere Concentrationsgrade vorräthig zu haben. Mandl setzte seiner Lösung zur Anästhesie der Schleimhaut Carbolsäure bei, Verfasser zieht des besseren Geschmackes wegen Ol. menth. pip. vor. Die 3 verschiedenen Concentrationen enthalten:

	1	2	3
Kali jodat.	1·0	2·0	3·0
Jodi puri	0·25	0·5	0·8
Glycerini	20·0	20·0	20·0

Ol. menth. pip. gutt. duas.

Bresgen wendet noch stärkere Lösungen an, doch reicht man mit den angegebenen völlig aus; auch die schwächste von ihnen verursacht Anfangs heftiges Brennen, das jedoch meist schon nach einigen Minuten vergeht. Die Bepinselungen, welche die ganze erkrankte Partie treffen, und bei Localisation in der Pars nasalis und laryngea mit dem gekrümmten Pinsel vorgenommen werden müssen, sind Anfangs täglich später, wenn man zu den stärkeren Lösungen übergeht, jeden dritten Tag auszuführen.

Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem Grade der Schwellung und erstreckt sich meist auf 4—8 Wochen.

Zu Insufflationen, welche jedoch weniger wirksam sind, eignet sich am besten Arg. nitr. 0·5 : 10·0 Amylum; M. Mackenzie empfiehlt Pulv. Catechu 0·03 pro dosi, Ferr. persulfur. 1 : 3 Amylum oder Resina Eucalypti 1 : 3 Amylum.

Zur Beseitigung grösserer und weicherer Granula greife man zur Chromsäure. Lässt auch diese im Stich, was bei schon lange bestehenden hypertrophischen Seitensträngen die Regel ist, dann gibt es nur noch ein Mittel, die von Michel in die Praxis eingeführte galvanokaustische Zerstörung.

Gegen den Paquelin'schen Thermocautère wäre selbstverständlich nichts einzuwenden, wenn die Scheu der Kranken vor der Einführung eines schon glühenden Instrumentes nicht wäre.

Man bedient sich zur Cauterisation der Granula entweder eines in eine kleine rundliche Platte endenden Galvanokauters oder bei grösseren flächenartigen Granulationen sowie zur Zerstörung der Seitenstränge eines transversalen im rechten Winkel je nach der Grösse der zu cauterisirenden Fläche umgebogenen galvanokaustischen Messers, das bei niedergedrückter Zunge kalt auf die betreffende Stelle aufgesetzt und dann erst zum Glühen gebracht wird. Sind nur wenige Granula vorhanden, dann zerstört man sie am besten alle auf einmal, sind deren aber sehr viele, dann ist nach Ablauf der Reaction eine zweite eventuell dritte Sitzung nöthig.

Sehr grosse Vorsicht und Uebung erheischt die Cauterisation der Seitenstränge. Sie sind in der Ruhe oft so völlig von den hinteren Gaumenbögen verdeckt, dass man sie am besten während der Phonation oder des Würgens cauterisirt. Stets vermeide man sorgfältigst, die hinteren Gaumenbögen oder andere gesunde Theile zu berühren. Bei Hypertrophie der Plica salpingopharyngea lasse man den Patienten mittelst des Winkelspatels die Zunge selbst fixiren, während der Operateur, um möglichst hoch hinaufzukommen und das Velum vor Verletzung zu schützen, das letztere mit irgend einem geeigneten Instrumente, z. B. Gaumenhaken, nach vorne oder in die Höhe schiebt und in langen Strichen von oben nach unten die Cauterisation vornimmt. Bei der meist ausserordentlichen Derbheit der Stränge und seitlich gelegenen Granula kann nur durch eine energische und öfters wiederholte Cauterisation die vollständige Zerstörung alles Krankhaften erreicht werden.

Während das Brennen der auf der Mitte befindlichen Granulationen meist wenig Schmerz und geringe Reaction hervorruft, ist die Cauterisation der seitlich gelegenen Granula besonders aber die der Seitenstränge selbst nach tüchtiger Cocainisirung zuweilen äusserst schmerzhaft. Bei Doppelseitigkeit der Erkrankung ist es deshalb besser, mehrere Sitzungen anzuberaumen. Die Reaction ist häufig eine sehr stürmische; die Schlingbeschwerden erreichen meist nach 6 bis 12 Stunden eine solche Höhe, dass die Kranken nur noch flüssige Nahrung aufnehmen können und selbst diese verweigern, um nur nicht schlucken zu müssen. Selten ist die Reaction so heftig, dass die Operirten wegen Kopfweh, Fieber, allgemeinen Unbehagens einige Tage das Bett hüten müssen

Man applicire dann Eisumschläge auf den Kopf, lasse Eisstückchen schlucken und Anfangs kalt, später lauwarm gurgeln. Ist man nicht zu energisch vorgegangen, dann verliert sich der heftige

Schmerz meist am 3.—5. Tage, um einem leichten Unbehagen oder flüchtigen Stichen beim Schlucken Platz zu machen. Der sich nach der Cauterisation bildende, ein veritables Croupexsudat vorstellende Brandschorf stösst sich meist erst nach 8—14 Tagen, manchmal noch später ab. Ob eine nochmalige Sitzung nöthig ist, kann und soll erst entschieden werden, wenn die reactive Entzündung und Schwellung vollständig beseitigt ist, dann schreite man zur Zerstörung des noch übrigen Restes oder des auf der anderen Seite gelegenen Stranges. Die Zerstörung der Granula kann bei der geringen Reaction früher vorgenommen werden.

Zur Nachbehandlung empfehlen sich Inhalationen oder Gurgelungen mit antiseptischen Substanzen; auch verbiete man den Kranken das Rauchen sowie das Sprechen und den Genuss reizender Ingesta, den Besuch von Wirthshäusern oder Theatern, staubenden Localitäten etc.

Lässt sich die Hypertrophie der Uvula nicht durch die obengenannten Touchirungen zurückbilden, dann kommt die Amputation derselben in Frage. Bei dem heute noch vielfach geübten Unfug des Abschneidens des Zäpfchens zur Heilung aller möglichen Krankheiten erscheint es nöthig, die Indicationen näher zu fixiren.

Die Uvulotomie ist, wie auch Semon hervorhebt, nur indicirt, wenn die Uvula wirklich auf die Epiglottis herabhängen und dieselbe zu Husten und krampfartiger Respiration reizen sollte, wenn sich anderweitige Erscheinungen von Seite des Rachens nur auf die Vergrösserung der Uvula zurückführen lassen, wenn die Uvula bei der Operation endolaryngealer Geschwülste, Spaltung, von Abscessen localer Behandlung etc. hinderlich und endlich wenn sie der Sitz bösartiger Neubildungen ist.

Man vollführt die Operation entweder mit der Störk'schen Kehlkopf-Guillotine oder mittelst Scheere oder Messer. Die ganze Uvula zu entfernen ist nicht gestattet, es muss mindestens ein 1 cm langes Stück erhalten bleiben. Die Wunde heilt bei geringer Schmerzhaftigkeit nach einigen Tagen, doch ist Vorsicht in der Auswahl und Temperatur der Speisen nöthig; auch erscheint es rathsam, desinficirende Gargarismen zu verordnen.

Zur Beseitigung der Tonsillarhypertrophie wurden die verschiedensten Mittel in Vorschlag gebracht. Abgesehen von den obenerwähnten Bepinselungen, die jedoch nur in ganz frischen Fällen einen Erfolg erwarten lassen, hat man eine Verkleinerung durch Einreibung von Alaunkrystallen mit oder ohne Massage, durch Einbohren von Zink-, Kupfer- und Höllensteinstiften, von Jodkalikrystallen, durch parenchymatöse Injectionen von Jod, Essig- oder Chromsäure und ähnlichen Stoffen zu erzielen gehofft. Abgesehen von ihrer Umständlichkeit und Schmerzhaftigkeit sind diese Methoden durchweg völlig nutzlos.

Rationeller erscheint zwar die Verkleinerung mit dem Galvanokauter, allein die Langsamkeit der Methode, die Nothwendigkeit wiederholter Eingriffe namentlich im Kindesalter lassen dieselbe doch nur für einzelne Fälle geeignet erscheinen.

Das rationellste Mittel ist die Amputation mit schneidenden Instrumenten. Dass das Tonsillotom bei Kindern vor der Messeroperation den Vorzug verdient, kann keinem Zweifel unterliegen. Welches Tonsillotom aber das beste ist, ist schwer zu sagen, da Gewohnheit und Uebung zu sehr in's Gewicht fallen.

Unzweckmässig sind jene, deren grösster Durchmesser in horizontaler Richtung d. h. von vorne nach hinten liegt; es ist gut, mehrere Tonsillotome von verschiedener Grösse vorräthig zu haben. Dass trotz vieler Vortheile das Tonsillotom auch manche Nachtheile hat, ist richtig, wenn Manche dasselbe aber ganz verwerfen, so zeugt das nur von geringer praktischer Erfahrung. In jenen Fällen, bei denen die Mandeln hauptsächlich nach oben und aussen vergrössert sind, ist die Amputation mit dem Messer nach vorherigem energischen Hervorziehen mittelst scharfer Haken dem Tonsillotom vorzuziehen.

Als Indicationen der Tonsillotomie sind zu erwähnen: Behinderung der Respiration, mangelhafte Entwicklung des Thorax, ungenügende Decarbonisation des Blutes, „klosige" Sprache, Disposition zu immer wiederkehrenden Anginen. Wenn auch die letztere durch die Operation nicht immer beseitigt werden kann, so treten die Anginen doch in der Regel seltener und weniger intensiv auf. Dass durch die Herausnahme der Mandeln die Geschlechtsfunction beeinträchtigt oder die Stimme ruinirt würde, ist eine Fabel; immerhin entschliesse man sich namentlich bei Sängern oder Schauspielern, wie auch Beschorner sehr richtig bemerkt, nur im Nothfalle zur Operation; man könnte es am Ende erleben, dass solche ausgesungene und im Niedergange begriffene Grössen den Arzt für den Verlust ihres phänomenalen Organes verantwortlich machen.

Die ganze Mandel herauszunehmen, ist wegen der Gefahr der Carotisverletzung verwerflich; meist genügt es, den über die Gaumenbögen vorstehenden Theil zu entfernen, zumal sich der übrigbleibende Rest meist von selbst zurückbildet.

Tödtliche Blutungen aus der Carotis sind bei richtiger Anwendung des Tonsillotoms unmöglich, bei der Messeroperation nicht ganz ausgeschlossen; ist die Carotis eröffnet, dann ist die Unterbindung das einzige wenn auch sehr zweifelhafte Rettungsmittel; starke Blutungen, die gerne bei vollblütigen oder ältern Leuten mit schon atheromatösen Gefässen vorkommen, werden am besten durch Torquiren oder die etwas schwierige Digitalcompression oder mit der Péan-Mikulicz'schen Zange zum Stehen gebracht; bei jugendlichen Personen stammen sie meist aus erweiterten Venen oder aus der im vordern Gaumenbogen verlaufenden Arterie; mässige Blutungen, die häufigsten, stehen nach wenigen Minuten von selbst oder nach Gurgelungen mit Eiswasser oder durch Eisenchloridlösung.

Nach O. Zuckerkandl liegt die Ursache der heftigen Blutungen nach der Tonsillotomie in dem Verhalten der Art. tonsillaris zu der Kapsel der Tonsille. Wird die Arterie in der Ebene der Kapsel durchschnitten, mit welcher sie in sehr innige Verbindung tritt, und welche sie oft erst nach Zurücklegung mehrerer Windungen

durchbohrt, dann wird die Retraction und Contraction des Gefässes verhindert und eine Thrombosirung bei Durchschneidung an der Durchschnittsstelle unmöglich gemacht. Ist hingegen die Abtragung der Tonsille im Gewebe derselben erfolgt, so schliessen sich die sehr kleinen im lockeren Bindgewebe liegenden Aeste prompt und es erfolgt keine Blutung; ebenso tritt leicht spontane Stillung der Blutung bei Durchschneidung der A. tonsillaris vor ihrem Eintritt in die Kapsel ein, solange sie eben im lockeren Zellgewebe liegt.

Eine andere Gefahr, welche Viele von der Tonsillotomie abschreckt, ist die der Diphtherie. Dass diese in der That schon Opfer gefordert hat, ist richtig, doch gehört ein solches Ereigniss zu den grössten Seltenheiten; immerhin sollte die Tonsillotomie nicht in einem Krankenhause, sondern in einer gesunden Privatwohnung und namentlich nicht zu Zeiten einer Diphtherie- oder Scharlach-Epidemie vorgenommen werden.

Man machte endlich auch den Vorschlag, die Amputation der Tonsillen mit der galvanok. Schlinge auszuführen. Abgesehen von der Umständlichkeit des Verfahrens und der Schwierigkeit, namentlich bei sehr starker Vergrösserung der Mandeln eine gerade Schnittfläche zu erhalten, ist auch die Gefahr der Blutung, die man dadurch zu umgehen meint, bei der nothwendigen starken Erhitzung des Drahtes durchaus nicht ausgeschlossen.

Was die Behandlung der Pharyngitis sicca betrifft, so hat sich dieselbe auf sorgfältige mehrmals täglich wiederholte Reinigung und Befeuchtung der Schleimhaut mittelst Nasendouche und Spray mit indifferenten Mitteln, warmer Milch, schleimigen Decocten, schwachen Glycerinlösungen, 1% Natron- oder Kochsalzsolutionen, Schwefelwässern, Soolquellen zu beschränken. Adstringentia schaden nur, dagegen können durch Bepinselungen mit den stärkeren Jodglycerinlösungen die Beschwerden zeitweise gemässigt und zum Verschwinden gebracht werden. Französische Autoren empfehlen Bepinselungen mit Tinct. Capsic. ann. 1·0—2·0 : 50 Glycerin.

Die Behandlung der Pharyngitis foetida sowohl wie die der Störk'schen Blennorrhoe muss nach den bei den Krankheiten der Nase zu schildernden Principien geleitet werden.

Pharyngitis phlegmonosa.

Befällt die Entzündung nicht nur die Schleimhaut, sondern auch das submucöse Gewebe oder das Parenchym der Organe, dann spricht man von phlegmonöser oder parenchymatöser, oder auch, weil die Phlegmone mit Oedem einhergeht und oft mit Eiterbildung endet, von ödematöser oder abscedirender Pharyngitis, wohl auch von Erysipel des Rachens.

Die phlegmonöse Pharyngitis entsteht wie die katarrhalische primär nach scheinbaren Erkältungen, ferner durch mechanische oder

thermische Einflüsse, operative Eingriffe, Aetzungen und galvanok. Manipulationen; es gibt viele Menschen, welche mit einer auffallenden Disposition für pharyngeale Phlegmonen behaftet sind. Wie die Angina lacunaris so entsteht auch die phlegmonöse Angina wahrscheinlich immer durch Infection; wie es scheint, können verschiedene pyogene Mikroorganismen, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, der Pilz des Scharlachs, letzterer auch ohne allgemeine Infection im Rachen Phlegmone erzeugen.

In sehr nahen Beziehungen steht das Erysipel zu phlegmonösen Rachenentzündungen; man spricht deshalb von Erysipel oder Rothlauf des Rachens oder von erysipelatöser Angina. Dieselbe geht entweder dem Ausbruche des Gesichtserysipels voraus, oder sie folgt dem letzteren nach. In den nicht seltenen von Gerhardt, Gubler, Panthel, Pozzi, Strümpell, Trousseau und auch von dem Verfasser beobachteten Fällen, in welchen eine phlegmonös-ödematöse oder lacunäre oder diphtherieähnliche Angina mit Schwellung der Lymphdrüsen dem Erysipel der Gesichtshaut vorausgeht, muss die Infection im Rachen zuerst stattgefunden haben. Als Eingangspforten für den Pilz sind einestheils Epithelverluste oder Erosionen, anderntheils die im Epithelüberzug der Mandeln liegenden normalen Lücken zu betrachten, aus welchen nach Ph. Stöhr fortwährend Leukocyten auswandern. Die Weiterverbreitung aus dem Rachen auf die Gesichtshaut findet nach Pozzi statt entweder durch die Tuba, Paukenhöhle und äusseren Gehörgang, oder durch den Thränennasengang oder am häufigsten durch den untern Nasengang. Die Affection des Rachens kann aber auch umgekehrt durch das Weiterkriechen des Erysipels von der äussern Haut auf den eben genannten Wegen erzeugt werden. Der Zusammenhang von gehäuftem Vorkommen von Anginen und Erysipel ist nach Gerhardt, welcher sich am eingehendsten über den Rothlauf des Rachens ausgesprochen hat, wahrscheinlich auf wahre Erysipelanginen zurückzuführen, welche auf den Rachen beschränkt bleiben.

Secundär gesellt sich die phlegmonöse Angina mit Vorliebe zu den acuten Infectionskrankheiten, namentlich zu Scharlach. Selten ist sie toxischen Ursprunges in Folge des Genusses von Mineralsäuren, kaustischer Alkalien, abgebrochener Lapisstifte etc. und mit Verschorfung der Schleimhaut combinirt. Ob durch schwere die Ernährung und den Schlingact beeinträchtigende Allgemeinleiden in Folge von Zersetzung der Secrete und Ingesta im Rachen die Disposition zu phlegmonösen Entzündungen gesteigert wird, ist nicht unwahrscheinlich, wenigstens spricht ein von Eberth einen Kranken mit Bulbärparalyse betreffender Fall einigermassen dafür.

Die Phlegmone kann zwar alle Theile des Rachens treffen, doch bevorzugt sie ganz besonders den weichen Gaumen, die Mandeln und das peritonsilläre Bindegewebe.

Die Krankheit entwickelt sich entweder aus einer Lacunärangina allmählich oder plötzlich, in letzterem Falle unter heftigen Allgemeinerscheinungen, Frost, Fieber bis zu 40·0, beschleunigtem

Puls, Kopfschmerzen, Mattigkeit und grosser Schmerzhaftigkeit beim Schlingen. Das anfänglich vorhandene Gefühl von Trockenheit macht bald der Secretion eines dicken zähen Schleimes später einer hochgradigen Salivation Platz; auch die Mundhöhle betheiligt sich an der Entzündung, die Zunge ist dick belegt, Brechneigung, Appetitlosigkeit und übler Geruch aus dem Munde vorhanden. Im weiteren Verlaufe steigert sich das Schluckweh bis zur Unerträglichkeit, so dass man behaupten kann, die Phlegmone des Rachens sei neben der Tuberculose die schmerzhafteste aller Rachenaffectionen. Durch das Fieber, die Schmerzen, die Schlaflosigkeit, Behinderung der Respiration und die auf ein Minimum reducirte Nahrungsaufnahme kommen selbst robuste Kranke in einigen Tagen sehr herunter. Speise und Trank werden entweder unter den heftigsten Schmerzensäusserungen und Verziehen des Gesichtes mühsam hinuntergepresst oder bei Oedem des Velum durch Nase und Mund wieder herausgeschleudert. Die Sprache ist in hohem Grade coupirt, klanglos und nasal, der Mund kann in Folge der entzündlichen Infiltration der Fascia buccopharyngea nicht oder sehr wenig geöffnet und so die Inspection und Medication wesentlich erschwert werden. Heiserkeit kommt nur bei Mitbetheiligung des Kehlkopfes vor, Athmungsbeschwerden sind bedingt durch Verengerung des Isthmus faucium oder durch ödematöse Laryngitis. Regelmässig findet sich beträchtliche Schwellung der Halslymphdrüsen. Im weiteren Verlaufe wird das in das submucöse Gewebe und Bindegewebe gesetzte Exsudat unter allmählichem Nachlass der Beschwerden entweder resorbirt, oder es geht unter weiterer Zunahme der Beschwerden in Eiterung über. Wird dem Eiter nicht durch Kunsthilfe Abfluss verschafft, so entleert er sich spontan, zuweilen während des Schlafes, beim Räuspern oder Gurgeln; seine Quantität ist oft sehr beträchtlich, er ist dick, mit Blut und Bindegewebsfetzen vermischt und sehr übelriechend. Mit der Entleerung des Eiters ändert sich das Krankheitsbild wie mit einem Schlage; die heftigen Schmerzen sind nahezu verschwunden, oder machen einem erträglichen Zustande Platz, die Athmung wird freier, das Schlucken wieder möglich, es tritt erquickender Schlaf ein.

Die objectiven Erscheinungen der phlegmonösen Entzündung des Nasenrachenraumes bestehen in beträchtlicher Röthung und Schwellung, namentlich des adenoiden Gewebes und der Tubenwülste. Sie ist meist so beträchtlich, dass das Lumen des Raumes vollständig aufgehoben und die Athmung durch die Nase unmöglich wird. Die Secretion ist eitrig, zuweilen blutig, öfters sind Hämorrhagien in der Schleimhaut vorhanden, die Mitbetheiligung des Mittelohres sehr häufig.

Am Gaumensegel tritt die Phlegmone meist einseitig auf. Auf der befallenen Seite erscheint das Gaumensegel von tiefrother Farbe, beträchtlich verdickt und gegen die Mundhöhle vorgewölbt, was am deutlichsten an der Grenze des harten Gaumens hervortritt; derselbe ist gleichzeitig in seiner Contractilität gestört, oft ganz unbeweglich. Die Uvula ist in einen ödematösen blauröthlichen Sack umgewandelt, die Gaumenbögen sind verdickt, bald mehr der vordere, über dessen

nächste Umgebung die Phlegmone gegen die Mundhöhle zu sich fortsetzt, bald mehr der hintere, der als fingerdicker ödematöser Wulst der hinteren Rachenwand aufliegt. Hier kann die Phlegmone Halt machen, sich aber auch längs der Hinterwand ausbreiten und dieselbe in eine geschwellte das Lumen des Schlundes verengernde Fläche umwandeln. Von hier aus verbreitet sich dieselbe auf den Kehlkopf, meist auf der der erkrankten Gaumenhälfte entsprechenden Seite, seltener auf beiden. Das Ligam. aryepigl. oder die Epiglottis nebst Taschenband sind geröthet, ödematös, das Lumen des Kehlkopfes mehr oder weniger eingeengt, bei doppelseitiger Phlegmone nahezu völlig obstruirt. (Erysipel des Larynx.)

Geht die Entzündung in Eiterung über, dann bildet sich unter weiterer Zunahme der Schwellung und des Oedems an einer Stelle eine Hervorwölbung, welche den Sitz des Abscesses anzeigt. Meist fehlt aber bei der diffusen Schwellung namentlich aber bei tiefem Sitze des Abscesses jeglicher Anhaltspunkt, wo der Eiter zu finden ist.

Die Mandeln können bei Phlegmone des weichen Gaumens völlig intact oder nur katarrhalisch afficirt sein, aber auch in die Phlegmone miteinbezogen werden. Sehr oft erkranken sie selbstständig und primär, bald einseitig bald doppelseitig, eine nach der andern. Die ergriffene Tonsille fällt durch ihre ungewöhnliche Grösse und Härte auf, sie drängt den vorderen Gaumenbogen vor sich her, drückt den Arc. pharyngopalatinus an die Hinterwand an, schiebt die Uvula auf die entgegengesetzte Seite und verkleinert den Isthmus faucium. Sind beide Tonsillen befallen, dann wird die Uvula zwischen denselben eingeklemmt oder nach vorne und oben geschoben, der Isthmus zu einem schmalen Spalt verengt oder völlig verschlossen; sehr oft besteht gleichzeitig Follicularvereiterung oder lacunäre Angina. Am intensivsten sind die subjectiven und objectiven Erscheinungen, wenn beide Tonsillen und der weiche Gaumen befallen werden. Schickt sich die Affection zur Heilung an, dann verkleinert sich die Mandel mehr und mehr; bildet sich aber ein Abscess, so nimmt die Schwellung meist noch zu, ohne dass jedoch der genaue Sitz derselben mit dem Auge erkannt werden könnte.

Wird das zwischen Tonsillen und weichem Gaumen liegende Bindegewebe befallen, dann bezeichnet man die Krankheit als Peritonsillitis.

Wenn diese auch zuweilen in Verbindung mit Phlegmone des Velum und der Tonsillen beobachtet wird, so tritt dieselbe doch sehr oft selbstständig auf. In reinen Fällen ist die Mandel selbst nur leicht geröthet, nicht oder unbedeutend vergrössert, während die Gaumenbögen und die entsprechende Hälfte des weichen Gaumens sammt Uvula hochgradig geschwellt, cyanotisch, ödematös und hervorgetrieben erscheinen. Am intensivsten ist meist die Infiltration des vorderen Gaumenbogens sowie die des Interstitium pharyngomaxillare. Durch das entzündliche Oedem der oft centimeterdicken walzenartigen Gaumenbögen sowie durch den Druck des sich ansammelnden Eiters kann die Mandel nach vorne oder nach innen zu vorgewölbt, oder auch

durch die Schwellung der vorderen Gaumenbögen völlig verdeckt werden.

Die Peritonsillitis führt in der Regel zur Abscedirung, wenn auch Rückbildung nicht ausgeschlossen ist. Zu constatiren, ob schon und wo Eiter vorhanden ist, ist zuweilen sehr schwierig; sitzt der Eiter unmittelbar hinter dem vorderen Gaumenbogen, dann ist meist Fluctuation zu fühlen; manchmal gelingt es durch Druck auf den vorderen Gaumenbogen, den Eiter nach hinten zu treiben, wo er dann unmittelbar vor dem hinteren Gaumenbogen auf der Convexität der Tonsille in Tropfen hervorquillt.

Der Verlauf der phlegmonösen Angina ist meist acut; ihre Dauer schwankt zwischen 5—14 Tagen; befällt die Affection erst die eine, dann die andere Seite, oder tritt, wie gar nicht selten, Recidive ein, dann können mehrere Wochen bis zur Heilung vergehen.

Die Diagnose stützt sich auf den objectiven Befund und ist zuweilen nur in den ersten Tagen schwierig. Recht schwer ist es meist, den Eiterheerd aufzufinden, zumal wenn die ergriffenen Theile eine gleichmässige und diffuse Schwellung zeigen. Am ehesten gelingt die Eruirung des Eiterheerdes noch durch die Palpation, besonders in der von Störk empfohlenen Weise. Man legt die eine Hand aussen unter den Unterkieferwinkel und drückt die Haut und das Zellgewebe nach innen, um eine Stütze zu haben, und gleitet mit der Spitze des Zeigefingers von oben nach abwärts an der geschwellten Partie vorüber; der Zeigefinger der andern Hand wird an den weichen Gaumen oder die Tonsillen angelegt; da wo die gegen einander drückenden Finger auf eine weiche Stelle stossen, ist meist der Sitz des Eiters. Auch durch Abtasten mittelst einer in einen breiten Knopf endigenden Sonde gelangt man öfters zum Ziele; doch ist man auch hiebei namentlich bei starkem Oedem Täuschungen unterworfen. Die Diagnose des Rachenerysipels ist nur gesichert, wenn sich die Schwellung auch auf das Gesicht ausgebreitet hat; bei Localisirtbleiben im Rachen ist die Diagnose unmöglich, zumal die gewöhnlich als charakteristisch beschriebene purpurrothe, glänzende, ödematöse Schwellung der ganzen wie lackirt aussehenden Rachenschleimhaut jeder phlegmonösen Angina zukommt; sicher wäre die Diagnose, wenn in den Gewebssäften Erysipelcoccen vorgefunden würden.

Die Prognose ist fast immer günstig, doch bleibt bei unvollständiger Resorption Hypertrophie des ergriffenen Organes namentlich der Mandeln zurück, während Atrophie derselben meist nach umfangreichen centralen Vereiterungen beobachtet wird. In seltenen Fällen pflanzt sich die Affection nach aussen fort und gibt zu Abscessen hinter dem Kopfnicker Anlass oder zu Abscedirung der Submaxillaris und der Zungenmuskeln. Von ungünstigen Ausgängen ist namentlich bei Kindern Tod durch Erschöpfung oder Erstickung durch Verlegung des Isthmus faucium oder durch Aspiration von Eiter zu erwähnen; bei Mitbetheiligung des Kehlkopfes kann in wenigen Stunden selbst Minuten Asphyxie eintreten; doch gehört Larynxödem immerhin zu den selteneren Complicationen. Todesfälle sind ferner constatirt

in Folge von Arrosion der Carotis, von Pyämie, Gangrän und Eitersenkung in das Mediastinum. Dass die Gefahr der Arrosion der Carotis am nächsten liegt bei Peritonsillitis, erhellt aus der Anatomie. Nicht selten bleibt einseitige oder doppelseitige Lähmung des weichen Gaumens zurück.

Therapie. Bei der ausserordentlichen Schmerzhaftigkeit der Pharynxphlegmone erscheint ein Versuch mit den bereits früher erwähnten Abortivmitteln zwar angezeigt, ist aber meistens erfolglos. Als relativ wirksamstes Mittel zur Linderung der Schmerzen bewährt sich, vorausgesetzt dass die Patienten sofort in Behandlung kommen, das Eis; das Tragen der Eiscravatte oder die Application aller 5 Minuten zu wechselnder Eiscompressen sowie das Schlucken von Eisstücken oder Fruchteis, Gurgelungen mit Eiswasser oder mit Alaun, Tannin, machen den Zustand noch am ehesten erträglich. Bepinselungen mit 10—20% Cocainlösung haben nur eine geringe und sehr kurze Schmerzlinderung zur Folge; besser sind die von B. Fränkel empfohlenen Injectionen von Cocain in die Gaumenbögen oder Tonsillen. Zur Beschleunigung der Eiterung empfehlen sich Kataplasmen, warme Gurgelungen und Inhalationen; zeigt sich Fluctuation, so incidire man sofort und verschaffe dem Eiter durch Einführen einer Hohlsonde Abfluss; in der Regel muss letzteres noch mehrere Tage wiederholt werden. Dass sehr frühzeitige Incision zuweilen den Kranken bedeutende Erleichterung verschaffen ist ebenso wahr, als dass sie häufig im Stiche lassen, und von den so behandelten Kranken als die Ursache der weiteren Zunahme ihrer Beschwerden gefürchtet werden. Wird die Athmung durch Verlegung des Isthmus faucium ungenügend, dann ist die Tonsillotomie, bei Mitbetheiligung des Kehlkopfs die Tracheotomie angezeigt, vorausgesetzt, dass man durch Scarification der ödematösen Theile keine Erleichterung verschaffen konnte.

Retropharyngealabscess.

Unter den entzündlichen Affectionen des vor der Wirbelsäule liegenden Bindegewebes ist der Retropharyngealabscess die häufigste.

Man unterscheidet idiopathische und symptomatische Retropharyngealabscesse.

Der idiopathische Retropharyngealabscess ist eine Krankheit des kindlichen Alters; halbjährige Kinder, zuweilen noch jüngere, werden besonders oft ergriffen. Nach den Untersuchungen von Bokai, Kormann, Schmitz, Pauly, ist derselbe die Folge einer Lymphadenitis. Nach Henle liegen nämlich in der Höhe des 2. und 3. Halswirbels zwischen beiden Seiten der Mittellinie zwei Lymphdrüsen, deren Volumen im kindlichen Alter am grössten ist, während jenseits des 5. Lebensjahres nur noch eine oder auch gar keine Drüse mehr vorgefunden wird; diese Drüsen müssen als der Ausgangspunkt der Vereiterung angesehen werden.

Als Ursachen des idiopath. Retropharyngealabscesses resp. der Lymphadenitis sind in der Mehrzahl der Fälle acute katarrhalische und phlegmonöse Entzündungen der Mundrachenhöhle sowie der Nase verantwortlich zu machen. Wiederholt wurden Abscesse in Folge von Verletzungen durch Fremdkörper sowie im Verlaufe von Otitis media und Gesichtserysipel beobachtet, ebenso von acuten Infectionskrankheiten, so namentlich bei Scharlach und Diphtherie. Schlecht genährte scrophulöse Kinder oder mit Ekzem des behaarten Kopfes und Gesichtes behaftete werden mit Vorliebe ergriffen.

Der symptomatische Retropharyngealabscess, Senkungsabscess, ist eine Folge von Krankheiten der Halswirbelsäule, so besonders von Periostitis, Ostitis, Caries auf scrophulöser, rhachitischer, tuberkulöser, syphilitischer oder traumatischer Basis.

Die durch Retropharyngealabscesse verursachten Erscheinungen können plötzlich in wenigen Tagen, aber auch erst nach Wochen und Monaten zu Stande kommen. Eine schnelle Entstehung beobachtet man, wenn der Abscess aus einer Bindegewebsphlegmone hervorgeht, eine langsame bei Lymphadenitis und bei den Senkungsabscessen.

Das erste Symptom ist stets ein Hinderniss beim Schlucken. Bei acuter Entwicklung treten unter heftigen Fiebererscheinungen, schnellem Pulse, Schluckbeschwerden, bei Kindern mit schmerzhafter Verzerrung des Gesichtes auf, welche theils in der Entzündung theils in der Hervorwölbung und Raumbeengung des Rachens begründet sind. In chronisch verlaufenden Fällen kann der Schmerz fehlen oder unbedeutend sein, dagegen tritt die Behinderung im Schlucken durch die Unmöglichkeit der Aufnahme fester Nahrung und durch Regurgitiren des Genossenen deutlicher zu Tage. Brustkinder lassen die Brust nach einigen Zügen wieder los, schreien, husten und befördern die eben genossene Milch wieder heraus. Bei kleinen Kindern ist ein beim Schlafen hörbarer schnarchender Ton eine sehr verdächtige Erscheinung. Mit der Ausbreitung des Abscesses stellen sich heftige bis zur Cyanose sich steigernde Athembeschwerden ein, durch Compression des Kehlkopfes oder seiner Nerven Heiserkeit und pfeifende Respiration. Der gleichzeitig vorhandene Husten ist bedingt theils durch Herabfliessen des reichlich producirten Schleimes, theils durch Mitbetheiligung des Kehlkopfes besonders durch entzündliches Oedem. Die Respiration ist selbst bei Freibleiben des Kehlkopfes oft stertorös, von einem schnarchenden rasselnden Geräusch begleitet, das sofort stärker wird, wenn man den Kopf des Patienten nach vorne überbeugt.

Entwickelt sich der Abscess in der Nähe des Atlas, so treten dieselben Erscheinungen auf, wie bei Hypertrophie der Rachenmandel. Es ist natürlich, dass durch die Behinderung des Schluckens besonders bei Kindern die Ernährung leidet, und dass Abmagerung, Schwäche, Anämie, bei langsamer Entwicklung der Affection unausbleiblich sind.

Als eine seltene Complication ist die Lähmung des N. facialis zu betrachten; sie ist nach Bokai durch entzündliche Schwellung des um die Austrittsstelle des Nerven liegenden Gewebes, seltener

durch directes Uebergreifen der Entzündung auf den Nerven selbst bedingt.

Bei dem secundären Retropharyngealabscess gesellen sich zu den erwähnten Beschwerden die Erscheinungen der Spondylitis cervicalis, als da sind: Unmöglichkeit, den Kopf nach den verschiedenen Seiten zu bewegen, Schmerzhaftigkeit, Steifigkeit des Nackens, Dislocation und Difformität der Halswirbelsäule. Nach Neureutter soll das Schnarchen im Schlafe gerade für die durch Wirbelerkrankungen bedingten Abscesse charakteristisch sein.

Die objective Untersuchung, die durch das jugendliche Alter der Erkrankten sehr erschwert wird, ergibt auf der hintern Rachenwand grössere oder kleinere erbsen- bis wallnussgrosse Hervorwölbungen, die von entzündeter oder normaler Schleimhaut je nach dem Verlauf der Krankheit überzogen sind. Je grösser die Abscesse, um so deutlicher sind die Hervorwölbungen des weichen Gaumens und der Tonsillen, um so enger erscheint das Lumen des untern Pharynxabschnittes. Bei der Palpation, die bei tiefsitzenden Abscessen und bei sehr kleinen Kindern allein die Diagnose sichern hilft, zeigt sich die Geschwulst prall, elastisch fluctuirend. Ist aber auch die Palpation wegen allzu beträchtlicher Enge des Isthmus faucium oder wegen der Schwierigkeit des Mundöffnens unmöglich, so kann nach Kohts die Inspection und Palpation der seitlichen Halspartien wesentlich zur Fixirung der Diagnose beitragen. Der Hals zeigt nämlich schon im Beginne der Erkrankung eine grössere Steifheit, die später immer mehr zunimmt, während sich auf einer oder beiden Seiten der obern Halsgegend in der Unterkiefergegend eine deutliche sicht- und fühlbare Anschwellung constatiren lässt. In der Tiefe fühlt man mässige Lymphdrüsenschwellung, welche ziemlich resistent und schmerzhaft ist und Fluctuation erkennen lässt. Bei stärkerem Druck auf diese Drüsen können besonders bei Anwesenheit grösserer Abscesse Suffocationserscheinungen und Athembeschwerden auftreten. Dass bei ältern Kindern und Erwachsenen die laryngoskopische Untersuchung am besten über Sitz, Grösse und Beschaffenheit des Abscesses Aufschluss geben kann, ist natürlich.

Die Diagnose des Retropharyngealabscesses ist unter Berücksichtigung der subjectiven Beschwerden und Ergebnisse der objectiven Untersuchung in der Regel nicht schwer. Besondere Schwierigkeiten bietet die Diagnose dann, wenn die Erscheinungen durch anderweitige Affectionen des Mundes und Rachens namentlich Scharlach oder Diphtherie verdeckt werden, oder wenn gleichzeitig der Kehlkopf erkrankt ist. Das Hauptgewicht ist stets auf die eventuell in der Narkose auszuführende Digitaluntersuchung zu legen, auf das Vorhandensein von Fluctuation, die ausser bei dem später zu besprechenden retropharyngealen Hämatom bei keiner andern Rachenaffection beobachtet wird. Die secundären Senkungsabscesse bieten im Hinblicke auf die gleichzeitig bestehenden Erscheinungen der Spondylitis meist keine diagnostischen Schwierigkeiten. Verwechselungen mit weichen Geschwülsten, so besonders mit retropharyngealen Lipomen,

wie Taylor einmal beobachtete, sind immerhin möglich, doch wird eine Probepunction die Diagnose sichern.

Die Prognose der idiopathischen Retropharyngealabscesse ist bei langsamer Entwicklung der Erscheinungen und bei energischem Eingreifen ziemlich günstig. Je zarter das Alter und je schwieriger der Zugang zu der Geschwulst ist, um so ungünstiger gestalten sich die Aussichten, ebenso je stürmischer und je acuter die lebensbedrohlichen Erscheinungen sich entwickeln. Dass secundäre Abscesse eine absolut schlechte Prognose geben, liegt in der Natur der denselben zu Grunde liegenden Krankheiten. Tiefer liegende Eitersenkungen sowie Perforationen in Kehlkopf und Luftröhre können durch Asphyxie oder Fremdkörperpneumonie letalen Ausgang zur Folge haben. In äusserst seltenen Fällen kann sich nach Henoch der Abscess bis unter die äussern Theile des Halses weiter verbreiten und durch langwierige Eiterung und Erschöpfung zum Tode führen; Abscesse der seitlichen Rachenwand hinter den Tonsillen, welche spontan in den äussern Gehörgang durchbrachen, wurden ebenfalls von Henoch beobachtet.

Aufgabe der Therapie ist es, der Entwicklung des Abscesses vorzubeugen; leider gelingt der Versuch, die Lymphadenitis durch Eis zu coupiren, bei der Kleinheit der Patienten nur äusserst selten. Schmitz und Gautier schlagen zur Coupirung und schnelleren Reifung des Abscesses Pinselungen des Gaumensegels und der hintern Rachenwand mit Jodtinctur oder Jodkalilösung vor.

Sobald sich Fluctuation zeigt, muss der Abscess eröffnet werden, wenn auch noch keine lebensbedrohenden Erscheinungen vorhanden sind. Die Eröffnung geschieht entweder mit dem Messer, das bis auf die Spitze mit Heftpflaster umwickelt ist, oder durch eine Cachirung durch Druck erst im Momente der Operation vorgeschoben wird, oder mittelst eines Troicart. In beiden Fällen darf mit Rücksicht auf die Carotis int. nicht mehr als 3—4 Millim. von der Mittellinie entfernt eingestochen werden. Damit der Abscess im Moment der Incision nicht ausweiche, schlug man vor, durch einen Gehilfen einen Druck auf die Gegend des Unterkieferwinkels ausüben zu lassen; um die Aspiration des Eiters zu verhüten, soll der Kopf des Operirten sofort nach der Incision nach vorne gebeugt werden; ist trotz aller Vorsicht dennoch Eiter aspirirt worden, dann empfiehlt sich nach Bokai die Anwendung des Inductionsapparates, mittelst dessen es wiederholt gelang, die drohende Asphyxie zu beseitigen.

Ob ein blosser Einstich oder eine breite Incision angezeigt sei, hängt von der Grösse und Reife des Abscesses ab, füllt sich derselbe nochmals, dann ist eine zweite Operation nöthig. Senkungsabscesse sollen nur dann eröffnet werden, wenn lebensbedrohliche Erscheinungen auftreten.

Die Nachbehandlung besteht in Ausspritzungen des Rachens mit warmem Wasser oder 4% Borsäurelösung, bei ältern Kindern in Gurgelungen oder Inhalationen.

Pharyngitis exsudativa.

Auf der Schleimhaut des Rachens kommen ebenso wie auf der der Mundhöhle Bläschen und Blaseneruptionen sowie anderweitige Exsudationen vor.

Die Miliaria hat besonders am weichen Gaumen, den Tonsillen und der Hinterwand ihren Sitz, und stellt kleine hirsekorngrosse Erhabenheiten dar, welche mit einem glänzenden durchsichtigen Inhalt gefüllt sind; sie machen keine oder leicht anginöse Beschwerden, vertrocknen und hinterlassen keine Substanzverluste oder Geschwüre.

Häufiger ist der Herpes pharyngis (Angina herpetica, Angine couenneuse). Derselbe tritt zuweilen in Combination mit Herpes facialis auf, stellt jedoch viel häufiger eine selbstständige Krankheit vor.

Hinsichtlich der Aetiologie herrscht noch grosse Meinungsverschiedenheit. Während die Einen Erkältungen und dumpfe schlechte Luft, nasskaltes Wetter, für seine Entstehung verantwortlich machen, wollen ihn Andere mit geistiger Ueberanstrengung, Uterinleiden, Störungen der Menstruation, Gemüthsaffecten, in Verbindung bringen. Für den Einfluss der Witterung spricht ausser der Ansicht der meisten französischen Autoren die Beobachtung Semon's, welcher Rachenherpes in England hauptsächlich in den Frühjahrs- und Herbstmonaten beobachtete. Herzog glaubt, dass derselbe durch Reizzustände im Bereiche des Ramus pharyngeus und N. nas. post. sowie des N. Vidianus erzeugt werde und stützt seine Ansicht von der neuropathischen Natur des Leidens auf die Einseitigkeit der Erkrankung, den heftigen einseitigen Kopfschmerz im Beginne desselben, sowie auf den Umstand, dass nach seinem Ablauf Lähmungen des Velum zurückbleiben. Auch Andere wie z. B. Ollivier und Bride glauben an den neuropathischen Ursprung desselben.

Der Rachenherpes beginnt in der Regel plötzlich, meist unter allgemeinen und gastrischen Erscheinungen, starkem Fieber und Kopfschmerz, der häufig einseitig ist und den Charakter der Migräne zeigt. Nach 12—15 Stunden entstehen brennende Schmerzen im Halse, die sich bei der Deglutition beträchtlich steigern, sowie vermehrte Speichelsecretion, Bedürfniss zum Räuspern. Bei der objectiven Untersuchung finden sich am Isthmus, auf den Tonsillen, dem harten und weichen Gaumen, den Gaumenbögen, der Uvula, in seltenen Fällen auch auf der Hinterwand, stecknadelkopf- bis linsengrosse gelbliche in Gruppen oder einzeln stehende von einem Entzündungshofe umgebene Bläschen. Ihre Zahl ist sehr verschieden, oft sind nur einige oft sehr viele vorhanden, so dass der ganze Rachen wie getüpfelt erscheint. Die Eruption ist bald einseitig, bald doppelseitig und nicht mit einem Male beendet, indem meist noch weitere Nachschübe stattfinden. Nach kurzem Bestande bersten die Bläschen, an ihrer Stelle erscheint entweder eine rothe epithelberaubte Schleimhaut, welche sich rasch überhäutet, oder es bilden sich pseudomembranöse Auflagerungen,

welche, wenn sie confluiren, Diphtherie vortäuschen und nach deren Abstossung verschieden tiefe Geschwüre zurückbleiben können. Der Schmerz ist in diesem Stadium äusserst heftig. Nach 5—10 Tagen tritt meistens Heilung ein, nachdem noch anderweitige Herpeseruptionen an der Nase, den Lippen oder dem Präputium, der Vulva oder am Larynxeingang sich eingestellt hatten. Die herpetischen Geschwüre können jedoch auch in eine sehr beträchtliche Tiefe dringen und Perforation der Gaumenbögen und des Velum, nach Hallopeau sogar durch Gangrän Tod zur Folge haben.

Der Verlauf ist stets ein acuter, doch kann ausnahmsweise die Krankheit auch einen chronischen Verlauf nehmen und einen gewissen Typus einhalten; auch ist sicher constatirt, dass dem Rachenherpes zuweilen nicht nur Lähmung des Gaumensegels sondern auch allgemeine Lähmung mit Ataxie nachfolgt.

Die Diagnose bietet keine Schwierigkeiten, wenn man neben schon ausgebildeten Geschwüren noch frische Bläschen im Mundrachenraum oder Herpeseruptionen an andern Hautstellen entdeckt; fehlen diese letzteren, dann ist die Diagnose schwierig und die Verwechselung mit Syphilis oder Diphtherie wenigstens entschuldbar.

Die Behandlung ist eine locale und eine allgemeine. Da, wo sich die Krankheit auf eclatante Erkältung und rheumatische Einflüsse zurückführen lässt, empfiehlt sich das Natr. salicyl. oder die Tinct. Colchici, Tinct. Aconiti. Bei neuropathischer Grundlage hat man gute Erfolge vom Arsenik gesehen. Die Localbehandlung beschränkt sich auf Gurgelwässer aus schleimigen einhüllenden Mitteln, eventuell unter Zusatz von Opiumtinctur oder Cocain, das zur Linderung sehr heftiger Schluckschmerzen auch eingepinselt werden kann.

Grössere Blasen im Rachen kommen ausser bei dem Erysipelas pharyngis, das wegen der vorherrschenden hochgradigen diffusen Entzündung der Schleimhaut bei der Phlegmone erwähnt wurde, besonders bei Pemphigus vor.

Derselbe tritt theils als Vorläufer des Pemphigus cutaneus theils als selbstständige Form auf.

Die Aetiologie ist noch sehr dunkel; dass derselbe auf syphilitischer Basis entstehen kann, ist zweifellos, ebenso dass er manchmal im Gefolge von Uterinleiden vorkommt.

Er beginnt wie der Herpes meist mit Fieber, Schüttelfrost, Uebligkeit und Erbrechen. Auf der Schleimhaut des Velum, der Uvula, schiessen erbsen- bis nussgrosse mit einem milchig-weissen Inhalt gefüllte Blasen auf, deren Epitheldecke sich nach kurzer Zeit trübt, macerirt und abgestossen wird. Dadurch entstehen scharf begrenzte rothe Substanzverluste, die sich mit einem weissen croup- oder aphthenähnlichen Belag bedecken und entweder rasch heilen, oder bei längerem Bestande sich in Geschwüre umwandeln. Dass der Pemphigus des Rachens ausser Schmerzen beim Schlingen und undeutlicher Sprache durch Raumbeengung die Deglutition fester Stoffe erschwert und unter Umständen Dyspnoe verursachen kann, ist erklärlich.

Eitergefüllte Blasen, Pusteln, entstehen entweder durch spätere Veränderung des Inhaltes der soeben erwähnten Eruptionen, oder durch Variola.

Die eigentliche Rachenvariola, die von der die Blattern begleitenden Entzündung der Schleimhaut zu trennen ist, ist fast stets eine Theilerscheinung der Haut-Variola, in selteneren Fällen localisirt sich, wie Verfasser an sich selbst beobachtete, die Allgemein-Infection nur oder vorzugsweise im Rachen. Nach vorausgegangenem Schüttelfrost, Kreuzschmerzen, Fieber bis zu 41°, entwickeln sich auf der gerötheten marmorirten Schleimhaut des Velum, der Hinterwand und öfters auch des Mundes, linsengrosse runde Knötchen, die meist schon am zweiten oder dritten Tage in der Mitte ein Bläschen zeigen und sich in Pusteln umwandeln. Um die Pustel herum befindet sich ein starkgerötheter Halo, die Speichel- und Lymphdrüsen schwellen an, es besteht hochgradige Salivation und heftiger Schmerz beim Schlucken, der sich beim Platzen der Pusteln noch mehr steigert; bei zahlreicher Eruption auf der Hinterwand kann durch Oedem des Kehlkopfes Erstickungsgefahr eintreten.

Im Nasenrachenraum kommt es nach Wendt zu Hyperämie, Hämorrhagie und diffuser Schwellung der Schleimhaut, zur Bildung einer membranartigen Auflagerung mit nachfolgender Verschwärung. Sowohl diese wie die aus wirklichen Pusteln hervorgegangenen Geschwüre können in die Tiefe gehen und das Velum perforiren.

Die Diagnose ist bei gleichzeitiger Variola der Haut leicht, ohne dieselbe aber nur unter Berücksichtigung des fieberhaften Beginnes, des Herrschens einer Blatternepidemie und der objectiven Untersuchung möglich.

Die allgemeine Behandlung beschränkt sich auf die Bekämpfung des Fiebers, Linderung der äusserst heftigen Hals- und Kopfschmerzen; die locale Behandlung in fleissiger Reinigung der Rachenhöhle mittelst nicht reizender antiseptischer Gurgelwässer.

Ein anderer Exsudationsprocess ist die Pharyngitis fibrinosa.

Man versteht darunter eine Affection, welche eine Steigerung des entzündlichen Processes darstellt und theils nicht theils nur in geringerem Grade infectiös ist. Das Vorkommen der Angina crouposa benigna, wie man sie im Gegensatz zu der echten Diphtherie genannt hat, wird auch von Bamberger, B. Fränkel, Henoch und Strümpell bestätigt. Nicht infectiöser Natur sind die artificiellen Croupexsudate nach Application der Chromsäure und des Galvanokauters. Wahrscheinlich in geringem Grade infectiös dagegen sind die im Verlaufe der follicularen und lacunären Tonsillitis auftretenden Flecken. Dieselben bestehen nämlich nach des Verfassers Untersuchungen nicht immer nur aus Eiterkörperchen, sondern auch aus Fibrin. So stellt zuweilen die äussere Schicht eines solchen Fleckens eine kleine Scheibe eines echten Croupexsudates vor, während die innere direct der Schleimhaut aufliegende und in dieselbe eindringende Schicht aus reinem Eiter besteht. In andern Fällen ist die Grenze

zwischen fibrinösem und eitrigem Belag weniger scharf ausgeprägt und fibrinöses und eitriges Exsudat innig und gleichmässig mit einander vermischt. Das fibrinöse Exsudat findet sich jedoch in manchen Fällen von folliculärer und lacunärer Angina nicht nur über den vereiternden Follikeln oder den aus den Lacunen hervortretenden Eiterpfröpfen, sondern auch zwischen denselben und ist so nicht selten die Ursache des Auftretens grösserer zusammenhängender Flecken, welche um so leichter mit echter Diphtherie verwechselt werden, wenn derartige schleierartige Anflüge auch auf der Uvula oder den Gaumenbögen angetroffen werden. Auch Henoch erwähnt das Vorkommen solcher Fälle und meint, sie seien rein entzündlichen Ursprungs, combinirten sich manchmal mit Tonsillarabscessen und hätten mit Diphtherie nichts gemein wie das äussere Ansehen. Strümpell hingegen glaubt, die gutartige croupöse auf den weichen Gaumen beschränkte Angina, die auch in Combination mit lacunärer und parenchymatöser Tonsillitis vorkäme, stelle wahrscheinlich nur die leichteste Form der specifischen Diphtherie vor, doch sei es möglich dass Entzündungen der Gaumenschleimhaut mit der Bildung eines croupösen Exsudates auch von andern ätiologischen Momenten abhängig seien; jedenfalls sei es eine praktisch wichtige klinische Thatsache, dass es eine leichte Form echt croupöser Angina gebe, welche gutartig verlaufe und keine Neigung zu diphtheritischer Geschwürsbildung und zum Uebergreifen auf den Larynx habe. Eine Regeneration der im Gefolge der bei folliculärer Angina oder nach galvanokaustischen Eingriffen vorkommenden Croupexsudate hat Verfasser noch nicht beobachtet.

Die Diagnose ist bei der ausserordentlichen Verbreitung der Diphtherie nur mit grösster Vorsicht und reichster Erfahrung zu stellen. Der Bacteriologie steht hier noch ein grosses bisher noch wenig bebautes Feld offen.

Die Behandlung ist dieselbe wie bei acuter katarrhalischer Angina.

Pharyngitis diphtheritica.

Mit dem Namen Pharyngitis, Angina diphtheritica, Rachendiphtherie, Diphtheria, Cynanche contagiosa, bezeichnet man eine infectiöse Krankheit, welche sich durch das Auftreten von Pseudomembranen auf der Schleimhaut des Rachens, des Kehlkopfes und der Nase charakterisirt. Die Diphtherie ist meist eine primäre selbstständige Erkrankung; secundär begleitet oder folgt sie dem Scharlach, Typhus und andern schweren Infectionskrankheiten oder sie gesellt sich zu Wunden im Rachen und den benachbarten Schleimhäuten. Sie ist eine Infectionskrankheit, welche sich localisiren aber auch von den zuerst ergriffenen Theilen aus sich über den ganzen Körper ausbreiten kann.

Ueber die Scharlachdiphtherie sind die Ansichten der Autoren getheilt. Während die Einen wie Henoch, dieselbe streng von der eigentlichen Diphtherie scheiden und die bei Scharlach auftretenden Veränderungen als nekrotisirende Angina auffassen, rechnen sie die Andern zur wahren Diphtherie, zumal das Freibleiben des Kehlkopfes nichts Charakteristisches habe. Die Verbreitung gsschieht besonders durch die Kindergärten und Schulen, entweder durch directe Uebertragung, d. h. durch die Secrete, die Exspirationsluft der Kranken oder auch durch Kleider und Gegenstände. Das Diphtheriegift kann ausserhalb des menschlichen Körpers monatelang wirksam bleiben, wie der Ausbruch der Krankheit nach dem Beziehen eines inficirten Zimmers beweist; dass auch durch diphtheritische Thiere, namentlich Hühner, Tauben, Kälber, der Mensch inficirt werden kann, wurde von Gerhardt beobachtet.

Die Incubation beträgt in der Regel 2—7 Tage, doch werden auch längere Zeiträume bis zu 14 Tagen angegeben; bei directer Uebertragung wie z. B. bei Aerzten, beginnt die Krankheit meist schon am dritten Tage.

Die Diphtherie tritt mit besonderer Vorliebe epidemisch auf; sie localisirt sich zuweilen auf ein Stockwerk, ein Haus, verbreitet sich von da über eine Strasse, eine Stadt, ja eine ganze Provinz; die einzelnen Epidemien zeigen in Bezug auf Intensität und Bösartigkeit grosse Unterschiede; in den grossen Städten des Continents herrscht sie jahraus jahrein.

Bevorzugt ist unstreitig die kältere Jahreszeit, sowie das kindliche Alter. Während Säuglinge und Kinder unter einem Jahre selten erkranken, fällt die grösste Morbidität in das Alter von 1—5 Jahren; sodann folgt die Periode der Schulpflicht von 5—12 Jahren; die späteren Jahre weisen geringere Zahlen auf und sind in den einzelnen Abschnitten ziemlich gleich vertreten. Die Constitution hat keinen Einfluss; sicher ist jedoch, dass Kinder, welche mit acuten und chronischen Entzündungen des Rachens und der Nase besonders mit Hypertrophie der Tonsillen sowie mit Bronchitis behaftet sind, dem Infectionsstoffe einen geeigneteren Boden bieten. Günstig für die Entwicklung der Diphtherie wirken nach Monti plötzlich eintretende Kälte, übermässige atmosphärische Feuchtigkeit, rapide Temperatursprünge, mangelhafte hygienische Verhältnisse, feuchte, dumpfe oder neugebaute Wohnungen, Schmutz, schlecht gereinigte Cloaken und Canäle; bei reiner, trockener sauerstoffreicher Luft und guten sanitären Zuständen hingegen kann die Krankheit weniger Boden fassen.

Zweimaliges Erkranken gehört zu den grossen Seltenheiten; die gegentheilige Behauptung, dass einmaliges Befallenwerden zu neuen Attaquen disponire, ist unrichtig und beruht auf Verwechselung mit Folliculärangina. Einige Zeit machte sich auch die Anschauung geltend, die Diphtherie könne auch sporadisch, d. h. ohne vorherige Infection entstehen. Heubner hält es nicht für unmöglich, dass ein durch einen Kältereiz auf reflectorischem Wege erzeugter Krampf der oberflächlichen Capillaren der Rachengebilde das völlige Aufhören der

Blutcirculation und croupöse Exsudation zur Folge hat; für die weitaus grösste Anzahl der Fälle muss man jedoch an einer Infection festhalten.

Keine Frage hat die ärztliche Welt in den letzten Jahren mehr beschäftigt als die nach der Aetiologie.

Ohne auf die zahllosen mehr oder weniger geistreichen Hypothesen wie z. B. auf die Entstehung der Diphtherie durch Kartoffeln oder durch verdorbene vegetabilische Nahrung, Brod oder Milch einzugehen, wenden wir uns zur Hauptfrage, ob die Diphtherie in der That durch specifische Mikroorganismen, den Micrococcus diphtheriae hervorgerufen wird. Der stricte Beweis dafür ist zwar bis heute noch nicht erbracht, doch erscheint es so gut wie sicher, dass in der That Mikroorganismen die Ursache der Krankheit sind. Heubner spricht sich dagegen aus, Löffler, welcher die Frage am gründlichsten studirte, fand in den diphtheritischen Membranen zweierlei Arten, eine bacilläre und eine Coccenform. Während er die letztere für nebensächlich hielt, erzielte er mit der erstern durch Impfen Membranen. R. Emmerich glaubte die echten Diphtheriebacterien gefunden, rein cultivirt und mit positiven Erfolgen weiter verimpft zu haben. Im Blute seien dieselben oft wegen ihrer äusserst geringen Anzahl gar nicht aufzufinden, um so zahlreicher kämen sie aber in den Nieren vor. Die Diphtheriepilze hätten ihre Keimstätten auch ausserhalb des menschlichen Körpers im Boden, besonders in den Zwischendecken der Wohnungen; die grösste Morbidität falle deshalb auch in jene Monate, wo die Menschen gezwungen seien, sich in geheizten Zimmern aufzuhalten, ausserhalb der Heizperiode verlöre die Seuche an Bösartigkeit und Gefährlichkeit.

So wenig Sicheres wir aber auch über das Krankheitsgift selbst wissen, so sind wir doch durch Heubner's classische Versuche dem Wesen der Diphtherie nähergerückt. Es kann nach Heubner keinem Zweifel unterliegen, dass die diphtheritische Schleimhauterkrankung eine innige Verquickung von Entzündung und Nekrose ist. Die Nekrose ist die Folge localer bis zu vollkommener Stase sich steigernder Circulationsstörungen mit gleichzeitiger Erkrankung der Gefässe selbst. Dadurch kommt es nicht nur zu Exsudation weisser Blutkörperchen in die Schleimhaut, sondern auch zur Entstehung einer croupösen Pseudomembran auf der Schleimhaut selbst. Localisirt sich der Process in den oberflächlichen Schichten, dann hat man die primäre genuine Oberflächendiphtherie vor sich, stirbt das Gewebe der Schleimhaut oder das Parenchym des ergriffenen Organes ab und wird dasselbe von einer faserstoffigen Exsudation infiltrirt, dann nennt man dies echte Gewebsdiphtherie. Für die Nachschübe ist das wesentliche Moment in dem fortdauernd krankhaften Zustand der Gefässwände gegeben. Sobald sich diese von der Erkrankung erholen und zur Norm zurückkehren, hört auch die Neubildung von Croupmembranen auf. Bei der eigentlichen Gewebsdiphtherie sind die Gefässe von dem abgestorbenen Gewebe allseitig umschlossen; hier hat der Gewebstod, welcher bei dem Croup die unterliegenden kranken Gefässe unbetheiligt liess, auch

den schliesslichen Tod der eingeschlossenen Blutgefässe zur Folge. So weit die Gewebsdiphtherie reicht, muss Alles zugrunde gehen; ist die Abstossung vollendet, so bleibt ein Substanzverlust, ein Geschwür zurück, während sich in der Umgebung demarkirende Eiterung bildet.

Vom anatomischen und klinischen Standpunkte aus theilt man die Diphtherie am besten in zwei Formen, in die croupöse und in die septische; für beide ist das Vorhandensein von Pseudomembranen charakteristisch.

Wenn auch nicht geleugnet werden soll, dass zuweilen die Infection mit diphtheritischem Contagium nicht eine pseudomembranöse sondern eine katarrhalische oder phlegmonöse Entzündung der Schleimhäute zur Folge hat, so ist man doch nicht berechtigt, derartige Erkrankungen gleichfalls als Diphtherie zu bezeichnen, zumal dadurch der persönlichen Willkür Thür und Thor geöffnet würde.

Die Rachendiphtherie beginnt bei Kindern zuweilen plötzlich unter Frost, allgemeinem Unbehagen, Hitze, Durst, Erbrechen, Schmerzen im Kopfe, Nacken, Rücken und in der Lendengegend, bei älteren Kindern und Erwachsenen beginnt sie mehr allmählich, mit geringem Fieber, ganz so wie eine katarrhalische Angina. Nicht selten ist der Ausbruch der Diphtherie von eigenthümlichen Erscheinungen auf der Haut begleitet, am öftesten findet sich erythematöse Röthung der Arme, des Nackens, Halses oder der Brust, der Schenkelbeuge, so dass man im Zweifel sein kann, ob nicht Scharlach vorliegt; auch urticariaartige Efflorescenzen auf der Streckseite der Extremitäten kommen zur Beobachtung. Als sicheres Zeichen für die Schwere des Falles und den meist septischen Verlauf muss das Auftreten von Petechien und Blutextravasaten am Stamm oder Extremitäten betrachtet werden.

Kurze Zeit, meist schon wenige Stunden nach dem Beginne der Allgemeinerscheinungen, treten die localen Beschwerden in den Vordergrund. Sie bestehen in Brennen, Trockenheit im Halse, Schmerzen beim Schlucken oder dem Gefühle, als ob ein Fremdkörper im Halse stecke.

Die objective Untersuchung kann, wenn man sehr frühzeitig den Kranken sieht, nur die Erscheinungen des acuten Katarrhes ergeben, meist aber sind schon deutliche Zeichen der Exsudation zu constatiren. Dieselbe kann sich auf einzelne Gebilde des Rachens beschränken aber auch vom Anfang an diffus auftreten. In leichteren Fällen localisirt sich das Exsudat auf eine oder beide Mandeln, auf das Zäpfchen, die Gaumenbögen oder die Hinterwand. Die Mandeln erscheinen geröthet, geschwellt und mit einem zusammenhängenden oder mehreren zerstreut liegenden weissen, milchigen Flecken oder reifähnlichen Anflügen besetzt. Ist die Uvula ergriffen, dann erscheint sie ödematös und ganz oder theilweise von einer weissen Masse umhüllt, welche auf die Gaumenbögen und den centralen Theil des Velum Ausläufer ausschickt. Auf der gerötheten Pars oralis der Hinterwand treten die bald punktförmigen bald flächenartigen Exsudationen besonders deutlich hervor.

In schwereren Fällen sind gleich Anfangs beide Tonsillen oder der ganze weiche Gaumen und die Hinterwand befallen. Die Pseudomembranen sitzen zwar grösstentheils auf der Epithelschichte, haften aber ziemlich fest an ihrer Unterlage und dringen sehr oft in die tieferen Schichten der Schleimhaut und das Parenchym der Organe ein. Die Speichel- und Schleimsecretion ist sehr reichlich, namentlich erscheint die Hinterwand mit einem dicken, grünen eitrigen Secret überzogen. Die Nahrungsaufnahme ist durch die beträchtliche Schwellung der ergriffenen Theile und die Lähmung des Velum nicht nur schmerzhaft sondern auch wesentlich erschwert, namentlich wenn auch die Mundhöhle so besonders die Schleimhaut des harten Gaumens, der Wangen oder Lippen diphtheritisch erkranken.

Eine constante Begleiterscheinung ist die Schwellung der Lymphdrüsen. Sie fehlt auch in den leichtesten Fällen nicht und erreicht in schweren eine ausserordentliche Intensität. Die Lymphdrüsen unter dem Unterkieferwinkel, die Gland. submaxillares, sowie die hinter und unter dem Kopfnicker befindlichen Drüsen schwellen an, werden schmerzhaft und bilden grosse harte Hervorwölbungen oder rosenkranzartige Paquete, welche zuweilen den ganzen Raum zwischen Unterkiefer und Clavicula einnehmen und die Physiognomie des Kranken in eigenthümlicher Weise verändern (Apparence proconsulaire). Sie bleiben entweder während des ganzen Verlaufes hart und bilden sich mit der Heilung zurück, oder sie erweichen und entleeren jauchigen, mit Gewebsfetzen vermengten Eiter.

Das Fieber ist zuweilen unbedeutend oder erreicht erst mit dem Fortschreiten der Exsudation die Höhe von 39·5—40·0 oder es ist gleich anfangs sehr beträchtlich. Im Allgemeinen steht das Fieber im Beginne der Erkrankung mit der Mächtigkeit der diphtheritischen Producte in directem Verhältniss, es steigt oder fällt, wenn die Exsudation zu- oder abnimmt. Macht die Exsudation Stillstand, wenn auch nur einen temporären, so fällt das Fieber zuweilen auf die Norm. So gesetzmässige typische Curven, wie sie bei anderen fieberhaften Krankheiten namentlich bei Pneumonie oder Typhus vorkommen, werden bei Diphtherie nicht beobachtet. Plötzliches Sinken der Temperatur ist bedingt durch beginnende Herzlähmung oder durch Kohlensäureintoxication in Folge Diphtherie der Luftwege.

In ähnlicher Weise verhält sich der Puls.

Anfangs meist hart, wie bei jeder febrilen Krankheit, zeigt er bei älteren Kindern eine Vermehrung bis auf 100—120 Schläge, bei jüngeren auf 130 und noch mehr, bei Erwachsenen auf 90—110. Mit dem Nachlasse des Fiebers und der Abstossung der Membranen wird er weich und weniger frequent. Bei der septischen Form ist der Puls schon anfangs sehr beschleunigt und klein selbst bei beträchtlicher Temperatursteigerung. Lässt die Herzkraft nach, oder tritt Collaps oder Kohlensäure-Intoxication ein, dann wird der Puls äusserst frequent, 130—180, kaum fühlbar und intermittirend.

Mehrfache Veränderungen erleiden die Sprache und die Respiration.

Die Sprache ist coupirt, anginös, nasal, bei Mitbetheiligung der Nase exquisit nasal und undeutlich; die Respiration ist je nach dem Grade der Schwellung der Rachentheile schnarchend und rasselnd, Dyspnoe tritt meist erst bei vollkommenem Abschluss des Isthmus sowie bei Mitbetheiligung des Kehlkopfes oder der Trachea und der Bronchien ein.

Die Verdauungsorgane sind mehr oder weniger betheiligt. Das initiale Erbrechen ist Fiebererscheinung und centralen Ursprungs; im späteren Verlauf ist es oft reflectorischer Natur, durch den Reiz der flottirenden noch nicht völlig abgestossenen Membranen erzeugt, oder es ist das erste Symptom beginnender Urämie oder Septichämie. Der Appetit liegt meist völlig darnieder und müssen die Kranken förmlich zum Essen gezwungen werden, der Durst ist vermehrt, der Stuhl angehalten, doch kommen bei einzelnen Epidemien Diarrhöen vor, meist Zeichen des Collaps oder beginnender Blutvergiftung.

Die Harnmenge ist beträchtlich vermindert, der Urin dick, concentrirt, reich an harnsauren oder phosphorsauren Salzen, zuweilen schon im allerersten Stadium eiweisshaltig.

Im weiteren Verlaufe ist fast jeder einzelne Fall verschieden.

In den leichtesten Fällen geht die Affection nach 3—6tägigem Bestande zurück, die Membranen stossen sich ab, die Kranken genesen. In mittelschweren Fällen breitet sich die Exsudation von dem ursprünglichen Herde auf die nächste Umgebung aus, oder die Membranen erneuern sich unter wiederholter Temperatursteigerung und vermehrter Lymphdrüsenschwellung, es tritt Fötor aus dem Munde auf, das Allgemeinbefinden gibt zu ernsten Befürchtungen Anlass; trotzdem kann Heilung eintreten, wenn nach Abstossung der dicken Schwarten keine weitere Exsudation oder Complication auftritt; in ganz schweren Fällen erneuern sich die Membranen zum dritten, vierten, ja selbst zum fünften Male, die Krankheit zieht sich wochen- oder wie Henoch einmal beobachtete, 2 Monate lang hin und kann so in Folge von langanhaltender Temperatursteigerung und Appetitmangel, durch Entkräftung oder durch Ergreifen des Larynx das Leben gefährden; nichtsdestoweniger kann auch hier noch Genesung eintreten, wenn auch meist Nachkrankheiten aller Art nicht ausbleiben.

Auch bei den leichtesten Formen findet meist eine Ausbreitung nach der Fläche und Tiefe statt, bei den schwereren ist dies ohnehin die Regel. Die Vergrösserung erfolgt durch Apposition mehrerer benachbarter kleiner Exsudate oder durch Mitbetheiligung neuer Schleimhautpartien. Die Membranen erreichen im weiteren Verlaufe theils durch Imbibition mit Wasser theils durch die Zersetzung eine sehr beträchtliche Dicke und bilden oft fingerdicke sulzige Schwarten oder austernschalenartige das Niveau der Schleimhaut beträchtlich überragende Häute, die sich schon zum Theil von ihrer Unterlage abhoben zum Theil noch mit derselben in Verbindung stehen. Gleichzeitig ändert sich auch ihre Farbe; die anfangs weissen oder gelbweissen Membranen werden durch Zersetzung oder Beimengung von Blut braun oder braunschwarz, missfarbig und übelriechend. Auf den

entzündeten exsudatfreien Rachentheilen sind grössere und kleinere Blutextravasate sichtbar.

Die croupöse Exsudation, welche wie bisher angenommen wurde, sich nur im Rachen ausbreitete, kann sich aber auch auf andere Organe erstrecken.

Zu den häufigsten Complicationen gehört die diphtheritische Erkrankung der Nase. Dieselbe gelangt entweder von der hintern Rachenwand oder von der Rückseite des Velum in die Choanen und ergreift zuerst die hintern Partien der Nase, um später auch die vorderen Theile in Mitleidenschaft zu ziehen; zuweilen namentlich bei Kindern ist die Diphtherie der Nase eine primäre.

Das secundäre Befallenwerden der Nase manifestirt sich durch Steigerung des Fiebers und Erscheinungen eines acuten Schnupfens; sehr oft besteht das erste Symptom in Nasenbluten und ist Folge der der Exsudation vorausgehenden Hyperämie. Ist die Exsudation erfolgt, dann ist das Schnäuzen sowie die Respiration durch die Nase sehr erschwert oder ganz unmöglich, aus den Nasenöffnungen ergiesst sich ein wässerig-schleimiges gelbes oder fleischwasserähnliches Secret, in welchem sich nach einiger Zeit deutliche pseudomembranöse Beimengungen vorfinden, und das die Nasenlöcher und Lippen excoriirt. Bei Mitbetheiligung der Tuben tritt Ohrensausen, stechender Ohrschmerz, Schwerhörigkeit auf, in den schwersten Fällen eitrige selbst diphtheritische Entzündung der Trommelhöhle mit Perforation; dringt die diphtheritische Entzündung in den Thränennasengang ein, dann kann es zu Diphtherie der Conjunctiva und Cornea kommen.

Bei fortschreitender Zersetzung der Membranen wird das Secret fötid, jauchig, blutig, die Haut der Nase, der Augenlider, Lippen, schwillt an, röthet sich, die Blutungen werden immer häufiger und heftiger.

Die objective Untersuchung ergibt Verstopfung sämmtlicher Nasengänge durch pseudomembranöse Auflagerungen auf Muscheln und Septum; die Membranen sind bald diffus bald circumscript und stossen sich in zusammenhängenden Fetzen als Ausgüsse des Naseninnern oder auch als detritusartige Massen ab; eine Erneuerung findet in derselben Weise statt wie im Rachen. Die Nasendiphtherie kann heilen, aber auch zu septischer Infection Anlass geben; auch kann es zu Gesichtserysipel, malignem Oedem, Gangrän der Haut und Meningitis mit letalem Ausgange kommen.

Weit schlimmer als die Ausbreitung auf die Nase ist die Diphtherie des Kehlkopfes, der Trachea und Bronchien. Nicht gerade die hochgradigsten Fälle von Rachendiphtherie haben diese gefährlichste Combination zur Folge, im Gegentheile dieselbe kommt fast ebenso oft bei dünnen reifähnlichen und circumscripten Exsudationen zur Beobachtung, wie überhaupt die Möglichkeit der Ausbreitung auf den Larynx bei allen Formen zu fürchten ist. Die Mitbetheiligung des Larynx tritt meist am 3. bis 8. Tage auf, doch kann dieselbe auch gleich anfangs oder später erfolgen. Wenn auch die Fortpflanzung vom Rachen nach unten (absteigende Diphtherie)

die häufigere ist, so kann doch auch umgekehrt der diphtheritische Process zuerst in Trachea und Larynx, nicht selten unter dem Bilde einer gewöhnlichen Laryngotracheitis, beginnen und in aufsteigender Richtung weiter schreiten. Die Erkrankung des Kehlkopfes kündigt sich manchmal durch Erbrechen, erhöhtes Fieber, constant aber durch Heiserkeit an (katarrhalisches Stadium). Sie ist anfangs oft so unbedeutend, dass sie nur dem geübten Ohre des Arztes erkenntlich ist, und nimmt in wenigen Stunden oder auch erst nach Tagen mehr und mehr den Charakter der Aphonie an. Gleichzeitig stellt sich trockner, bellender Husten mit spärlichem Auswurf und vermehrten Schlingbeschwerden ein. Die laryng. Untersuchung, die leider bei jüngeren Kindern meist unausführbar ist, ergibt bei älteren Kindern oder Erwachsenen ausser diffuser Röthung und ödematöser Schwellung der Schleimhaut namentlich der subchordalen Partie circumscripte, erbsen- bis bohnengrosse Auflagerungen oder zusammenhängende, die Stimmbänder, Epiglottis und Taschenbänder zuweilen den ganzen Kehlkopf auskleidende Membranen. Relativ häufig sieht man in der Regio interarytaen., an den Lig. aryepigl., Epiglottis, Taschen- und Stimmbändern Auflagerungen, ohne dass dieselben im weiteren Verlaufe sich ausbreiteten oder Dyspnoe zur Folge hätten. Die Störung der Respiration hängt sowohl von der Dicke und Ausbreitung des Exsudates und des entzündlichen Oedems als auch ganz besonders von dem Alter des Patienten ab. Bei Kindern treten die Respirationsbeschwerden durchweg schon sehr bald, je jünger um so früher, in den Vordergrund. Die Athmung ist geräuschvoll, pfeifend, stridulös, der Husten trocken und tonlos, die untern Thoraxpartien sinken ein, der Larynx wird bei jeder sämmtliche Hilfsmuskeln in Thätigkeit versetzenden Inspiration tief gegen das Jugulum herabgezogen, während die Kinder unruhig sich von einer Seite zur andern wälzen, sich im Bette aufrichten, den Kopf zurückwerfen, nach dem Halse greifen, auf den Arm der Mutter verlangen und von diesem wieder in's Bett (stenotisches Stadium).

Wie bei genuinem Croup so tritt auch bei Diphtherie die Dyspnoe anfangs in Anfällen auf; sie wiederholen sich in längeren oder kürzeren Zeiträumen, bis schliesslich die Athemnoth continuirlich wird und die Krankheit in ihr letztes (das asphyktische) Stadium tritt. Die namenlose Angst und Unruhe macht allmählich einem ruhigeren Verhalten Platz, das vorher geröthete Antlitz wird bleich, die Lippen, Finger, Ohrmuscheln und untern Extremitäten werden cyanotisch, der Körper bedeckt sich mit kaltem klebrigen Schweiss, die Temperatur sinkt, Husten tritt seltener auf oder verliert sich ganz, die Kohlensäure-Intoxication nimmt mehr und mehr zu, aus der Apathie entwickelt sich Somnolenz und Sopor; meist nach 1—2 Tagen öfters aber schon nach wenigen Stunden gehen die Kranken zugrunde.

Bei der Weite des erwachsenen Kehlkopfes kommt es bei circumscripter Exsudation selten zu hochgradiger Dyspnoe, wenn dieselbe auch selbstverständlich bei diffuser Erkrankung und beträchtlicher Dicke der Pseudomembranen nicht ausbleibt.

Die Luftröhre wird nicht selten gleichzeitig mit dem Kehlkopf, häufiger jedoch erst dann ergriffen, wenn es wegen Larynxdiphtherie zur Operation gekommen ist. Wird die Trachea früher oder intensiver als der Larynx befallen, so sind die Excursionen des Kehlkopfes und der Luftröhre nach unten zu weit geringer, als wenn das Hinderniss im Larynx allein seinen Sitz hat. Die Diphtherie der Trachea nach vollzogenem Luftröhrenschnitt kündigt sich meist durch erneuerte Temperatursteigerung an. Die Secretion durch die Canüle wird spärlich, hört schliesslich ganz auf, und ist oft mit croupösen Fetzen untermischt. Bei Mitbetheiligung der Bronchien werden öfters dendritisch verzweigte Ausgüsse, bei Tracheitis diphtheritica dicke, röhrenförmige Schläuche expectorirt. Nach Monti gibt die Lunge vor dem Manubr. sterni und den ersten Intercostalräumen einen matteren und zugleich tympanitischen Schall, die Respirationsgeräusche fehlen stellenweise oder sind durch Rasselgeräusche ersetzt.

Unter den subjectiven Erscheinungen ist das Auftreten neuer Respirationsbeschwerden trotz Tracheotomie und sorgfältiger Reinigung der Canüle charakteristisch. Dieselben werden meist am 2. bis 4. Tage, doch auch später beobachtet; die nach der Operation normale Respiration wird frequent, oberflächlich und mühevoll; es treten von Neuem Einziehungen an Rippen und Zwerchfell auf, die Athemnoth steigt, Jactation und Unruhe erreichen den höchsten Grad; allmählich macht sich eine leichenartige Blässe bemerkbar, die Kinder verfallen, nachdem zuweilen wiederholte Suffocationsanfälle sich eingestellt hatten, in Somnolenz und Sopor, und gehen an Kohlensäure-Intoxication zu Grunde.

Die diphtheritische Exsudation occupirt zuweilen auch die Sexualorgane und äussere Haut.

In manchen namentlich septischen Fällen bildet sie zuweilen die erste Localisation. Das weibliche Geschlecht wird häufiger befallen; die Schamlippen schwellen an, die Schleimhaut röthet sich und secernirt eitriges Secret. Unter brennenden und spannenden Schmerzen, Beschwerden beim Uriniren, Harndrang und Blasenkrämpfen, bilden sich auf der Innenfläche der Labien grössere und kleinere flächenartige oder zerstreut liegende weissgelbe Auflagerungen, welche sich nach einiger Zeit abstossen, wieder erneuern und heilen oder Sepsis und Gangrän zur Folge haben können. Nicht selten kriecht der diphtheritische Process auf die Analöffnung und die benachbarte Haut fort und erzeugt dort Erosionen und Auflagerungen; fast niemals wird die Schwellung der Leistendrüsen vermisst.

Beim männlichen Geschlechte etablirt sich die Diphtherie besonders auf Einrissen und Verletzungen des Präputium; die Vorhaut sowie die Haut des Gliedes schwillt ödematös an, lässt sich nicht zurückziehen, zwischen Vorhaut und Eichel erscheint eitrige Flüssigkeit; das innere Blatt der Vorhaut bedeckt sich mit einer Pseudomembran, die Inguinaldrüsen schwellen an, es ist heftiger Schmerz beim Uriniren vorhanden. Durch Zerfall der Membranen und der

unterliegenden Schleimhaut können beträchtliche Substanzverluste erzeugt werden.

Als eine sehr seltene Localisation muss die Diphtherie der Haut bezeichnet werden.

Es ist durch mehrere Autoren, namentlich durch Fr. Seitz sichergestellt, dass sich die Diphtherie auf vollkommen gesunder Haut entwickeln kann. Nach Seitz treten rothe runde oder elliptische, unregelmässig geformte Flecken auf, in deren Centrum eine gelbweisse Erhabenheit ähnlich einer Urticariaquaddel aufschiesst. An dieser Stelle bildet sich ein gelbbraunes fibrinöses Exsudat, das nach seiner Eintrocknung sich abstösst und ein Geschwür hinterlässt, nach dessen Heilung noch lange Zeit ein brauner Pigmentfleck sichtbar bleibt. Häufiger als die intacte wird die excoriirte, epithelberaubte Haut sowohl primär als secundär ergriffen. Beliebte Localisationen sind ekzematöse Stellen hinter dem Ohre oder an den Ohrmuscheln, am Mundwinkel, Naseneingange, fratte Stellen in der Inguinal-, Crural- und Perinealgegend; auch auf Blutegelstichen, Operationswunden oder da, wo Blasenpflaster sassen, entfaltet die Infection zuweilen ihre erste Wirkung.

Wir wenden uns nun zu der zweiten Form der Diphtherie, der septischen.

Sie entwickelt sich in der Regel aus der croupösen mit oder ohne gleichzeitige Gangränescenz der betroffenen Theile, oder sie tritt gleich anfangs als primäre septische Diphtherie auf.

Die Entwicklung der septischen Form aus der croupösen tritt selten vor Ende der ersten Woche, meist erst später, zuweilen nach mehreren Wochen auf und ist bedingt theils durch Aufnahme des specifisch-diphtheritischen Giftes in die Säfte, theils durch Resorption putrider Stoffe, welche in den sich zersetzenden, grauschwarzen, fötiden Pseudomembranen oder in den nekrotischen Schleimhautstellen enthalten sind. Nach A. Fränkel werden die nekrotischen Zerstörungen durch das Eindringen des Streptococcus in die Spaltöffnungen der Mandeln, aus denen beständig Leukocyten auswandern, hervorgerufen; gelangen sie von da aus in das Blut, dann entstehen schwere Allgemeinerscheinungen. Die Infection kann sowohl von der Nase, dem Rachen, Kehlkopfe, Trachea und Bronchien als auch von der Haut oder den Genitalien ausgehen.

Sie äussert sich zunächst durch eine Steigerung oder ein Wiederaufflackern des Fiebers, das jedoch nur ausnahmsweise wie bei den andern Formen der Sepsis in Schüttelfrösten auftritt, und meist den intermittirenden Charakter trägt. Die früher aufgeregten und widerspenstigen Kinder werden ruhiger und gleichgiltiger, die Haut wird blass, fahl oder mit Ecchymosen, Urticaria oder Purpuraflecken bedeckt, die Augen hohl und matt, die Klagen über Schling- und sonstige Beschwerden verstummen, die früher so schwierige Untersuchung des Rachens wird widerstandslos gestattet; der Appetit bleibt zuweilen auffallenderweise normal, wird aber in der Regel geringer, um schliesslich ganz zu verschwinden. Das anfangs freie Sensorium wird all-

mählich benommen, es tritt Somnolenz ein, die manchmal durch Blutungen aus dem Munde, dem Rachen oder der Nase, oder durch Erbrechen und Diarrhöen unterbrochen wird. Der Tod erfolgt entweder unter schweren Gehirnsymptomen oder durch Herzlähmung oder durch Lungenödem, Infarcte mit oder ohne Icterus, unter stetigem Nachlass des äusserst frequenten kleinen Pulses und Ausbruch von Schweiss. Die Schleimhaut der ergriffenen Theile ist mit Ecchymosen besetzt, im Uebrigen aber wenig verändert, an einzelnen Stellen des Epithels beraubt, leicht blutend oder mit oberflächlichen oder tief in das Gewebe eindringenden Substanzverlusten versehen. Hatte sich bislang die Lymphadenitis in bescheidenen Grenzen gehalten, so schwellen jetzt die Halslymphdrüsen, die Submaxillaris, Sublingualis, zu unförmigen grossen, die Bewegungen des Kopfes und des Halses sowie das Oeffnen des Mundes in hohem Grade behindernden schmerzhaften Tumoren an, die nicht selten zu Infiltration des Halszellgewebes führen.

Anders gestaltet sich der Befund, wenn die croupöse Form erst in die gangränöse übergeht und auf diese Weise zur septischen wird. Wenn auch die Gefahr der Gangränescenz bei sehr diffuser Exsudation und Infiltration des Parenchyms eine grössere ist als bei localisirter, so gibt es doch vielfache Ausnahmen; auch der Zeitpunkt, in welchem die Gangrän auftritt, ist sehr verschieden; in der Regel besteht die Diphtherie schon mehrere Tage oder 1 bis 2 Wochen, in seltenereren Fällen tritt die Gangrän schon sehr frühzeitig auf; so sah Verfasser einmal am zweiten Tage bei einem 12jährigen Knaben mit zerstreuten Pseudomembranen auf den Tonsillen den ganzen weichen Gaumen gangränös werden; gerade in solchen Fällen tritt die Verquickung der Nekrose mit der Entzündung besonders deutlich hervor.

Der Eintritt der Gangrän kündigt sich vorerst durch objective Erscheinungen an; die bisher mässig geschwellten und mit Pseudomembranen überzogenen Mandeln vergrössern sich in excessivster Weise, schliessen den Isthmus ab und klemmen die ödematöse oder gleichfalls exsudatbedeckte Uvula zwischen sich ein. Befällt die Gangrän den weichen Gaumen, dann entsteht an irgend einer Stelle ein blauschwarzer livider sich deutlich von der Umgebung abgrenzender Fleck, über welchem sich die Schleimhaut in Form einer mit trübem missfärbigen Inhalt gefüllten Blase emporwölbt. Bald verfärbt sich auch die Umgebung der Blase, nach deren Entleerung die ergriffene Partie sich in eine grauschwarze von Blutextravasaten durchsetzte, weiche, pulpaartige Masse umwandelt, welche spontan oder bei Berührung blutet. Erliegt der Kranke, wie dies zuweilen vorkommt, der Krankheit jetzt noch nicht, dann entstehen durch Abstossung der mortificirten Massen tiefe Substanzverluste und Perforationen; in äusserst seltenen Fällen stösst sich durch demarkirende Eiterung das Brandige ab, und der Kranke kommt mit mehr oder weniger hochgradiger Zerstörung davon. Nach Eintritt des Brandes wird der Fötor aus dem Munde unerträglich, die Salivation

äusserst profus und jauchig, das Allgemeinbefinden nimmt den bereits geschilderten adynamischen Charakter an. Die Gangrän schreitet auf die Nase weiter, deren Ausfluss blutigjauchig wird und die Haut excoriirt; die Blutungen aus Rachen und Nase wiederholen sich und die Patienten gehen meist im Verlaufe von 3—8 Tagen zuweilen an gleichzeitigen Metastasen in Lunge und Milz zu Grunde.

Wenn auch in manchen Punkten verschieden, so ist der Verlauf der primär septischen Diphtherie doch ein sehr ähnlicher.

Warum in manchen Epidemien diese Form besonders häufig, in manchen gar nicht beobachtet wird, wissen wir nicht. Die Krankheit beginnt unter heftigem Fieber und Erbrechen, das sich mehrmals wiederholt und mit Uebelkeit verbunden ist. Die Temperatur erreicht 40·0 selbst 41·5, der Puls ist sehr frequent und von Anfang an klein und leicht unterdrückbar, die Respiration beschleunigt; das Allgemeinbefinden liegt von der ersten Stunde an schwer darnieder, die Patienten sind ruhig, apathisch, somnolent. Schmerzen beim Schlucken werden wenig geklagt.

Die objective Untersuchung ergibt livide blaugraue Verfärbung und Ecchymosirung der ergriffenen Theile, welche mit fibrinösen, schmierigen, übelaussehenden Exsudaten von geringerer oder grösserer Ausdehnung bedeckt sind. Die Schwellung der Lymphdrüsen ist auch bei dieser Form sehr ausgeprägt. Der weitere Verlauf ist derselbe wie bei den bereits geschilderten anderen septischen Formen, nur tritt das letale Ende in der Regel noch früher, meist schon nach 2—3 Tagen ein.

Mit den bisher besprochenen Erscheinungen ist aber das Krankheitsbild der Diphtherie noch nicht erschöpft. Die Diphtherie ist eine äusserst maligne Erkrankung, welche nicht nur während ihres Verlaufes mannichfache Complicationen setzt, sondern auch viele Wochen nach scheinbar vollkommener Genesung eine Reihe von Nachkrankheiten zur Folge hat.

Eine der häufigsten Complicationen ist die Affection der Nieren.

Dieselbe äussert sich zunächst durch Albuminurie. Der Eiweissgehalt des Harns der ersten Tage ist wohl als Fiebererscheinung aufzufassen und auf Hyperämie der Nieren zurückzuführen; die Anhänger der Pilztheorie lassen denselben durch Einwanderung von Mikrococcen resp. durch eine von ihnen erzeugte parenchymatöse Entzündung entstehen; die Albuminurie tritt um so sicherer und um so frühzeitiger auf, je intensiver die Exsudation ist, in septischen Fällen fehlt sie niemals, so dass Unruh behauptet, die Albuminurie sei das erste und einzige absolut sichere Kennzeichen der stattgehabten Allgemeininfection, welche sich ausschliessen lasse, wenn Albuminurie fehle. Doch können ganz leichte und sehr schwere croupöse Formen mit Albuminurie verlaufen, ohne dass es zu Allgemeininfection kommt. Die Eiweissmenge ist sehr verschieden und schwankt mit den localen und allgemeinen Erscheinungen.

Die schwereren Formen der Albuminurie sind, wie jetzt allgemein angenommen wird, durch parenchymatöse Nephritis, Schwellung und

fettige Degeneration der Nierenepithelien bedingt, auch Fischl fand durchweg parenchymatöse und interstitielle Nephritis, aber keine Mikrococcen. Die Harnsecretion ist vermindert, selbst vollständig sistirt, die Eiweissmenge ist sehr beträchtlich, der Harn enthält Blutkörperchen, fettig degenerirte Nierenepithelien und die verschiedenen Formen von Cylindern.

Wenn von manchen Autoren der Nierenerkrankung eine ziemlich untergeordnete Bedeutung zugewiesen wird, so muss Verfasser umsomehr zur Vorsicht mahnen, als derselbe wiederholt Kinder und junge Leute an Urämie zu Grunde gehen sah. Alle diese Kranken zeigten sehr ausgebreitete Localerscheinungen, in einem Falle waren nicht nur beide Mandeln sondern auch der ganze weiche und harte Gaumen mit fingerdicken Schwarten bedeckt. Der Verlauf war stets der gleiche. Nachdem sich mehrere Tage nach Beginn der diphtheritischen Exsudation Albuminurie eingestellt hatte, verminderte sich die Harnmenge stetig, während der Eiweissgehalt progressiv zunahm; das erste Symptom der Urämie war stets Uebelkeit und Erbrechen, sowie vollständige Appetitlosigkeit; der Puls war theils hart und gespannt, theils weich, klein und frequent, dann stellte sich unter wiederholtem Erbrechen Somnolenz und Sopor, in einem Falle Eclampsie ein; der Tod erfolgte unter Abnahme der Herzkraft bei völliger Bewusstlosigkeit; die Thatsache, dass es im Verlaufe der Diphtherienephritis sehr selten zu Oedem oder Hydrops kommt, kann Verfasser bestätigen.

Sehr häufig sind Complicationen von Seite des Herzens.

Sowohl während des Verlaufes als auch in der Reconvalescenz können die Kranken plötzlich oder nach einigen Stunden unter den Erscheinungen der acuten Herzparalyse zu Grunde gehen. Zuweilen gehen dieser Katastrophe keine oder keine auffallenden Erscheinungen voraus. In anderen Fällen jedoch klagen die Kranken über Herzklopfen, Athemnoth, Beengung, äusserste Prostration der Kräfte, sie werden blass, cyanotisch, kühl, der Puls äusserst frequent, kaum zählbar, das Sensorium benommen. In den weniger rapid verlaufenden Fällen stellen sich die Symptome der Herzparalyse allmählich ein und führen erst nach einigen Tagen zum letalen Ende. Man erklärt diese plötzlichen Todesfälle theils aus der Verfettung des Herzmuskels oder Thrombose der Ventrikel, theils aus einer Lähmung des Vagus und der Herzganglien oder aus Blutungen in die lebenswichtigen Centren der Medulla oblongata.

Weit häufiger als die acuten Herzaffectionen sind die chronischen. Nach Leyden beginnt die Myocarditis selten vor Ablauf der ersten, öfters erst nach 4—6 Wochen gleichzeitig mit anderen Lähmungserscheinungen, und äussert sich durch Kleiner- und Frequenterwerden des Pulses, der die Zahl von 120—180 Schlägen in der Minute erreicht oder intermittirt, welche Erscheinungen namentlich bei Körperbewegung deutlicher hervortreten. Der Herzstoss ist schwächer, mit der Zeit stellen sich Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts, Unreinheit der Töne und blasende Geräusche ein. Subjective Beschwerden fehlen oder sind gering, stets ist grosse Muskelschwäche, Apathie und

Abneigung gegen körperliche Anstrengungen, nach Unruh zuweilen Albuminurie vorhanden. Die Affection kann nach mehrwöchentlichem selbst mehrmonatlichem Bestande heilen oder durch Oedem und Hydrops allmählich oder durch Herzparalyse plötzlich letal enden. Nach des Verfassers Ansicht liegen vielen Fällen von angeblicher Myocarditis nicht Degeneration des Herzmuskels, sondern paretische Zustände der Herznerven speciell Neuritis des Herzvagus zu Grunde.

Unter den Complicationen von Seite der Respirationsorgane ist Pneumonie relativ die häufigste. Man sieht dieselbe hauptsächlich bei Larynx- und Trachealdiphtherie sowie einige Tage nach der Tracheotomie in Folge der Aspiration von Blut oder Membranen, oder erst nach Wochen in Folge von Fehlschlucken resp. mangelhaftem Verschluss des Kehlkopfes. In der Regel ist sie lobulär, einseitig oder doppelseitig und hat meist in den untersten Partien ihren Sitz. Mehrmals sah Verfasser letale Fremdkörperpneumonie in Folge von doppelseitiger Recurrenslähmung und Kehlkopfanästhesie. Bei sehr langer Dauer des stenotischen Stadiums, kommt es zu Emphysem der oberen, Hypostase der unteren Lungenabschnitte, oder zu putrider Bronchitis oder circumscripter Gangrän.

Als häufige Complicationen müssen die Veränderungen der Trachealwunde erwähnt werden.

Am häufigsten ist Diphtherie der Wundränder, die nicht selten gangränös zerfallen, und zu grossen Substanzverlusten und Trachealfisteln Anlass geben. Auch kann durch unpassende Canülen oberflächliche Verschorfung und Decubitus des Wundcanals sowie der tieferen Theile der Trachea entstehen. Phlegmonöse und erysipelatöse Entzündung der Wundränder sowie ihrer näheren und entfernteren Umgebung, Blutungen aus Decubitusgeschwüren der vorderen oder hinteren Trachealwand gehören gleichfalls zu den ungünstigen Complicationen.

Als locale Nachkrankheiten müssen Stenosen des Kehlkopfes und der Trachea sowie Heiserkeit und Aphonie erwähnt werden. Die ersteren sind in der Regel durch Granulationen oberhalb oder unterhalb der Trachealwunde oder durch Narbenretraction geheilter Ulcerationen oder durch membranöse Verwachsungen und chronische Verdickung und Infiltration der Stimmbänder bedingt; auch Lähmung der Glottiserweiterer wurde beobachtet. Die Veränderungen der Stimme beruhen theils auf Entzündungsvorgängen so namentlich auf Chorditis vocalis oder auf Substanzverlusten oder auf Lähmung der Muskeln oder Nerven des Kehlkopfes.

Zu den häufigsten Nachkrankheiten gehören ohne Zweifel die Lähmungen.

Im Allgemeinen kann es als Regel gelten, dass, je schwerer der Fall, um so wahrscheinlicher dieselben auftreten werden; doch gibt es zahlreiche Ausnahmen und können selbst ganz leichte Fälle dieselben nach sich ziehen. Die diphtheritischen Lähmungen treten selten vor der zweiten, häufiger erst in der dritten, vierten, ja selbst sechsten Woche auf. Während man früher über ihre Ursache und ihr

Wesen getheilter Ansicht war, weiss man jetzt durch zahlreiche anatomische Untersuchungen, dass die diphtheritische Lähmung als infectiöse Polyneuritis aufgefasst werden muss, deren Ausgangspunkt der diphtheritische Process im Rachen ist. Von diesem werden, wie namentlich v. Ziemssen betont, zunächst die Endausbreitungen des N. glossopharyngeus und Laryngeus superior und inferior betroffen; von diesen letzteren Nerven aus schreitet dann die Infection auf den Stamm des Vagus, um theils centrifugal auf die Herzfasern des Vagus theils centripetal auf Gehirn und Rückenmark sich auszubreiten.

Ziemlich häufig sind Störungen des Sehvermögens durch Lähmung des Accomodationsmuskels. Sie äussert sich durch das Unvermögen, kleine Gegenstände in der Nähe deutlich zu sehen; sie erscheinen trübe und verschwommen. Lesen ist unmöglich, auch ermüden die Augen schnell; die Pupille ist in der Regel weit. Ergreift die Lähmung die Augenmuskeln, dann tritt Strabismus und Doppelsehen auf.

Unstreitig am häufigsten ist die Lähmung der Muskeln des weichen Gaumens und des Schlundes. Die Symptome derselben sind in dem Capitel „Nervenkrankheiten" nachzusehen. In schweren Fällen kommt es zu Lähmung der Gesichtsmuskeln.

Theils in Verbindung mit den Muskeln des Rachens theils mit jener der Extremitäten werden die Nerven und Muskeln des Kehlkopfes gelähmt.

Die Lähmung des sensibeln Nerv. laryng. sup. ist bald einseitig bald doppelseitig. Sie gehört namentlich in Combination mit motorischer Lähmung insoferne zu den gefährlicheren, als die damit Behafteten ziemlich oft an Fremdkörperpneumonie zu Grunde gehen; objectiv äussert sich dieselbe durch Aufhebung der directen und Reflexerregbarkeit. Die motorische Kehlkopflähmung ist gleichfalls ein- oder doppelseitig; sie betrifft einzelne Muskeln und ganze Muskelgruppen, sehr oft sämmtliche vom N. recurrens versorgten Muskeln; in letzterem Falle liegt die Gefahr einer Fremdkörperpneumonie sehr nahe.

Auch die Extremitätenmuskeln werden nicht selten paralytisch. Die beginnende Lähmung derselben kündigt sich durch perverse Sensationen in den Fingerspitzen und Zehen, Pelzigsein, Ameisenlaufen, Kribbeln sowie durch ziehende Schmerzen an. Allmählich tritt Schwäche und mangelhafte Bewegung, unsicherer taumelnder Gang (Ataxie), zuletzt völlige Lähmung ein.

Werden auch die Muskeln des Halses, Nackens und Stammes ergriffen, dann liegen die Kranken unbehilflich im Bette, müssen gehoben und gefüttert werden; der Kopf kann nicht gerade gehalten werden, er fällt nach vorne oder hinten. Bei Lähmung der Rumpfmuskeln ist das Aufsetzen im Bette unmöglich. Zuweilen schreitet die Lähmung auch auf die Respirationsmuskeln fort, das Athmen wird oberflächlich, es tritt Dyspnoe ein und die Kranken sterben asphyctisch, nachdem auch noch zuweilen die Muskeln der Blase und des Darms gelähmt worden waren.

Zu den theilweise selteneren Complicationen und Nachkrankheiten, welche der Vollständigkeit wegen hier Erwähnung finden mögen, gehören: Anämie, Neuralgien, Empfindlichkeit gegen lautes Sprechen, gegen Kälte und Wärme, Otorrhoe und Gehörstörungen, Angina pectoris, Chorea, Krämpfe der Extremitäten, Singultus, Lähmung des Oesophagus, Niese- und Gähnkrämpfe, psychische Störungen, allgemeine Paralyse, Idiotie, Exaltation sowie Nachtwandeln (Seitz). Auch acuter Gelenkrheumatismus, gestörte Assimilation, diphtheritische Verschorfung der Magenschleimhaut, letztere von Seitz und Wertheimber, wurden beobachtet.

Die Diagnose der Diphtherie kann in den einigermassen entwickelten Fällen keinen Schwierigkeiten unterliegen. Dass namentlich bei Kindern im Beginne Verwechselungen mit andern Affectionen möglich sind, ist richtig. Am häufigsten findet eine solche mit Lacunärangina statt, deren Differentialdiagnose bereits früher besprochen wurde. Weniger leicht aber doch möglich ist eine Verwechselung mit Pharyngomykosis benigna oder Herpes, sowie mit künstlich erzeugten Aetzschorfen. Der Anfänger möge es sich zum Principe machen, bei jedem Kinde, das unbestimmte Krankheitssymptome, Fieber, schnellen Puls etc. zeigt, genau den Rachen zu untersuchen und in verdächtigen oder zweifelhaften Fällen die Isolirung des Erkrankten anzuordnen.

Die Prognose der Diphtherie ist stets eine dubiöse; mag die Affection noch so harmlos beginnen, niemals lasse man sich zu einer günstigen Voraussage verleiten, denn zu oft folgt die Enttäuschung auf dem Fusse nach. Keine Krankheit ist in Bezug auf den weiteren Verlauf und unvorhergesehene Zwischenfälle und Complicationen so unberechenbar wie die Diphtherie.

Relativ günstig ist die Prognose bei localisirtem Auftreten auf einer oder beiden Mandeln, an Velum oder Zäpfchen; die Erkrankung der Hinterwand trübt schon die Prognose wegen der Gefahr der Infection der Nase und des Kehlkopfes. Ein günstiger Ausgang darf auch erwartet werden bei gutem Kräftezustand und bei genügender Ernährung; von grösster Wichtigkeit ist das Alter der Erkrankten; Erwachsene, junge Leute und ältere Kinder bis herab zu 6 Jahren geben im Allgemeinen eine bessere Prognose; Kinder unter 6 Jahren geben eine mittlere, solche unter drei Jahren eine sehr schlechte Prognose. Dass nur schlecht genährte, dyskrasische, scrophulöse oder tuberculöse Kinder der Diphtherie zum Opfer fallen, ist eine arge Täuschung; sicher ist, dass die Prognose grossentheils auch von dem Charakter der Epidemie abhängt. Diphtherie der Nase kann nicht als eine unbedingt lebensgefährliche Complication gelten; dagegen gehört die Diphtherie des Kehlkopfes, der Trachea und Bronchien, zu den gefährlichsten aller Complicationen. Bei den septischen Formen ist die Prognose fast absolut infaust namentlich bei der septisch-gangränösen Diphtherie, die nur ganz ausnahmsweise in Genesung endet. Einen ungünstigen Ausgang lassen ferner alle jene Fälle erwarten, bei denen die Herzthätigkeit schon Anfangs in namhafter Weise

alterirt ist oder Anorexie besteht. Sehr trübe wird auch die Prognose bei schwerer Nephritis, sowie bei Pneumonie; unter den Nachkrankheiten gelten die Lähmungen mit Recht im Allgemeinen für günstig, wenn auch durch Kehlkopflähmung sowie durch Weiterschreiten der Paralyse auf die Respirationsmuskeln zuweilen der Tod herbeigeführt wird.

Die Mortalität ist bei Kindern unter einem Jahre am grössten und beträgt nach Monti und Herz circa 80%, bei Kindern von 1—3 Jahren 45%, von 3—5 Jahren 40%, von 5—10 Jahren 17%; vom 10. Jahre nimmt die Mortalität allmählich ab und ist jenseits der Zwanziger nur noch eine geringe (5—10%).

Mit diesen statistisch begründeten Zahlen und den Veröffentlichungen des Reichsgesundheitsamtes stehen freilich die von den allerorten sich wichtigmachenden Diphtheriespecialisten angegebenen Todesfälle in grellstem Widerspruche. Man kann jetzt kaum mehr eine Publication über Diphtherie in die Hand nehmen, ohne am Schlusse die stereotype Bemerkung zu finden, dass der Autor seit der Zeit, wo er dieses oder jenes Mittel anwendet, keinen einzigen Todesfall mehr zu beklagen hatte. Verfasser kann hier nur die Worte Henoch's citiren, der sagt, er fordere alle jene Herren, welche nur minimale Bruchtheile ihrer Kranken verloren haben und jene Aerzte, welche so leichtgläubig derartigen Angaben Vertrauen schenken, auf, zunächst einmal in die Klinik zu gehen und dort zu lernen, was man eigentlich unter Diphtherie zu verstehen hat.

Die Therapie der Diphtherie ist nicht zum geringsten Theil eine prophylaktische, insoferne als sie bestrebt sein muss, die Verbreitung der Krankheit zu verhindern. Das einzige und beste Schutzmittel ist die Isolirung der Kranken von den Gesunden. Wenn auch zugegeben werden muss, dass dieselbe sehr oft illusorisch ist, da bereits die übrigen Kinder inficirt sein können, ehe dieselbe angeordnet wird, so sollen doch die gesunden Kinder das inficirte Haus sofort verlassen, jeden Verkehr mit demselben und den dort befindlichen Personen vermeiden und dann erst zurückkehren, wenn die inficirte Wohnung genügend desinficirt ist. Ueber die Wahl des Desinfectionsmittels herrschen allerdings Meinungsdifferenzen. Statt der fast allgemein angewendeten Dämpfe der schwefeligen Säure empfiehlt Monti die Reinigung des Bodens, der Möbel, kurz aller waschbaren Gegenstände mit grüner Seife und Lauge, sowie die Erneuerung der Tapeten oder Malereien des Krankenzimmers. Ist dies nicht möglich, dann sollen die Wände und der Boden mit 1% Carbolsäure oder 1% aethylxanthogensauren Kali gereinigt oder wenigstens im Zimmer mittelst Dampfspray eine Lösung von 1·0 Sublimat zu 1000 Wasser verstäubt werden; in allen grösseren Städten bestehen übrigens Desinfectionsanstalten, denen man am besten dies Geschäft übergibt.

Mit denselben Lösungen soll die Wäsche des Kranken gereinigt und der Kranke sowie alle Personen, welche mit ihm während der Krankheit verkehrten, am ganzen Körper mit Carbolseife gewaschen

und bevor sie mit Gesunden zusammenkommen, durch ein warmes Bad gereinigt werden. Ob die vielfach angewendeten prophylaktischen Gurgelungen mit Kali chloric., Carbolsäure oder Borsäure die Infection verhindern können, ist zu bezweifeln.

Um die epidemische Ausbreitung unter den Kindern zu verhüten, schlug man auch sanitätspolizeiliche Massregeln vor, so z. B. die Anzeigepflicht der Aerzte oder Angehörigen, ebenso das Fernhalten der gesunden Kinder aus einer bereits inficirten Familie vom Schulbesuche, Isolirung der Kranken in eigenen Spitälern und Pflegeanstalten. Dass durch die die Schule besuchenden gesunden Kinder einer inficirten Familie das diphtheritische Gift verschleppt werden kann, ist unzweifelhaft; gegen die namentlich von Henoch empfohlene Ausschliessung derselben vom Schulbesuche sprachen bisher ausser socialen hauptsächlich pädagogische Gründe, zumal in grossen Städten die Schulen das ganze Jahr hindurch geschlossen werden müssten. Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, dann ist auf ausgiebige Ventilation des Krankenzimmers auch bei Nacht Rücksicht zu nehmen. Es empfiehlt sich daher, wenn irgendwie möglich, das grösste und geräumigste Zimmer zum Krankenzimmer zu wählen, oder noch besser zwei nebeneinander befindliche Räume abwechselnd, das eine bei Tag das andere bei Nacht, zu benützen; die Temperatur derselben soll 12° R. nicht übersteigen.

Ein überaus wichtiger Punkt ist die Ernährung sowohl in qualitativer als quantitativer Hinsicht. Wenn es auch richtig ist, dass wegen mangelnden Appetits und Schlingbeschwerden die Nahrungsaufnahme eine geringe ist, so soll doch das Wenige, was genommen wird, nahrhaft und zweckentsprechend sein. Besondere Schwierigkeiten bereiten die Kinder; da es bei diesen ohne Zwang überhaupt nicht geht, so ist die Nachgiebigkeit der Eltern gerade hier an unrichtiger Stelle. Natürlich darf die Nahrung Anfangs nur flüssig sein und aus Milch, kräftigen Suppen, Bouillon mit Ei, Thee, Kaffee mit etwas Weissbrod, Kinderzwieback, Biscuits bestehen.

Alcoholica und andere Reizmittel erst bei Herzschwäche anzuwenden, ist sicher unrichtig; ein vorsichtiger Arzt wird bei Zeiten so viel als möglich dafür sorgen, dass dieselbe überhaupt nicht eintrete. Man gestatte deshalb von Anfang an kleine Quantitäten Wein mit Wasser, Milch mit Cognac (sogenannten Milchpunsch), Weinsuppen, eventuell Bier; bei drohendem Collaps gehe man zu den kräftigeren Weinen Marsala, Sherry, Portwein, Champagner über; in der poliklinischen Praxis empfehlen sich verdünnter und mit Zucker versetzter Rum oder Cognac. Nach Abstossung der Membranen und Rückgang der entzündlichen Erscheinungen kann festere Nahrung, weiche Eier, weiches Fleisch, Hachée, Geflügel und Wildpret gestattet werden.

Die medicamentöse Behandlung ist eine locale und eine allgemeine. Zweck der localen Behandlung ist, die entzündlichen Erscheinungen zu bekämpfen, die Exsudate zu entfernen resp. unschädlich

zu machen, und die Ausbreitung des diphtheritischen Processes auf andere Schleimhäute zu verhindern.

Zur Bekämpfung und Linderung der Localerscheinungen eignet sich besonders die Kälte in Form kalter Compressen oder Eisblasen nach den früher angegebenen Methoden. Es sei ausdrücklich bemerkt, dass die Kälte äusserlich und innerlich, in letzter Form von Eispillen etc. nur so lange angewendet werden darf, bis die entzündlichen Erscheinungen nachgelassen haben. Ist die Exsudation vollendet, dann sind warme erregende Umschläge am Platze.

Der zweiten Indication, der Entfernung und Unschädlichmachung der Pseudomembranen, genügt man am besten durch fleissige Reinigung der Rachenhöhle mit gewissen meist der Gruppe der Desinficientien angehörigen Stoffen.

Die Zahl derselben ist eine so grosse, dass es unmöglich ist, alle aufzuführen. Wenn dieser Autor die besten Erfolge von diesem, jener von einem anderen Mittel gesehen hat, so beweist dies nur, abgesehen von zahllosen Fällen, die gar keine Diphtherieen waren, dass man bei jeder Behandlungsmethode günstige Resultate haben kann, ebenso, dass man bei jeder auch Misserfolge und Todesfälle zu beklagen haben wird.

Das früher vielfach geübte Verfahren, die Membranen durch Aetzungen mit Lapis in Substanz, Galvanokaustik und andere ähnliche Proceduren zu zerstören, ist mit Recht jetzt allgemein als schädlich verlassen. Je mehr man den Rachen reizt und die Membranen insultirt, um so sicherer und schneller regeneriren sie sich. Meist bedient man sich zur Lockerung der Membranen der heissen Dämpfe; es soll durch dieselbe eine demarkirende Eiterung erzeugt und die Abstossung beschleunigt werden. Man setzt die Kinder entweder in ein Dampfbad, oder wie auf der Kinderstation in Dresden üblich, in ein eigens construirtes, mit warmen Wasserdämpfen erfülltes Zimmer, oder man lässt die aus einem mit siedendem Wasser oder Camillenthee gefüllten Topfe sich entwickelnden Dämpfe mittelst eines passenden Trichters möglichst lange und heiss einathmen. Zweckentsprechender sind die Dampfsprays, deren gläsernes Zuleitungsrohr direct in den Mund gehalten wird. Ihr Vorzug besteht in der Möglichkeit, zugleich mit der Wärme auch desinficirende Stoffe auf den Rachen einwirken zu lassen. Von Manchen wird die Carbolsäure in 1—5% Lösung als das wirksamste aller Mittel gepriesen. Bei jüngeren Kindern oder solchen mit reizbarer Haut verdient die 4% Borsäure den Vorzug, bei Erwachsenen und älteren Kindern eine 1—3% Kali chloricumlösung; von anderen Mitteln sind zu erwähnen: das Chinolin, Resorcin, Natr. benzoicum, Natr. subsulfur, Acid. salicyl, Natr. salicyl. Thymol, Kali hypermang. Sublimat, Ol. Eucalypt., Ol. terebinth.

Die Inhalationen sollen je nach der Schwere des Falles halbstündlich oder stündlich, und worauf hauptsächlich zu dringen ist, auch während der Nacht unausgesetzt zur Anwendung kommen. So nützlich auch dieselben richtig und consequent durchgeführt sind, so nutzlos sind sie bei widerspänstigen Kranken, zumal wenn dieselben

kaum den Mund öffnen, geschweige die Zunge hervorstrecken oder die längere Einwirkung der Dämpfe gestatten; bei den letzteren verzichte man deshalb ganz auf dieselben und lasse den Rachen stündlich energisch mit desinficirenden Wässern mittelst einer einfachen Wundspritze reinigen.

Die chemische Lösung der Pseudomembranen ist neuerdings wieder mehr in Aufnahme gekommen. Ueberraschende faserstoffverflüssigende Wirkungen wollte man namentlich vom Papayotin gesehen haben, das als Inhalation und als Bepinselung in 5% Lösung angewendet wird. Heute ist dasselbe fast wieder vergessen, auch steht dem allgemeinen Gebrauch ausser dem hohen Preise ganz besonders auch die Unsicherheit und völlige Wirkungslosigkeit so vieler Präparate im Wege.

Aehnlich wirkt das Pepsin, das gleichfalls inhalirt oder mittelst Pinsel aufgetragen wird.

Rp. Pepsini 4·0, Acid. mur. dil. gutt. V, Aq. dest. 120·0. DS. Zur Inhalation.

Als Bepinselung, die stündlich vorzunehmen ist lautet die Formel (Rp. Pepsin. german. 4·0, Acid. muriat. dil. gutt. 15—20, Aq. dest. 180·0.)

Als membranlösende Mittel gelten ferner das Kalkwasser, rein oder zu gleichen Theilen mit Aq. destill., die Milchsäure in 5% Lösung, das Natr. carbon., Kali carbon.

Die erwähnten Medicamente müssen, falls Inhalationen unmöglich sind oder auch neben denselben, als Gurgelwässer und Pinselflüssigkeiten in Anwendung kommen. Dass erstere nur bei Diphtherie des Isthmus einen Werth haben, wurde bereits erwähnt. Zu Touchirungen, wozu man am besten einen dicken aber feinhaarigen Haarpinsel oder ein Stück eines an einem Holz- oder Fischbeinstäbchen befestigten feinen Badeschwammes oder Verbandwatte benützt, müssen die in Anwendung kommenden bereits erwähnten Stoffe eine stärkere Concentration besitzen. Auch Chloralhydrat 3 : 15 Glycerin wurde empfohlen. In England sind Bepinselungen mit einer 2% Lösung von Liq. ferri sesquichl. sehr beliebt; Morell Mackenzie benützt nach sorgfältiger Abtrocknung der Schleimhaut mit Fliesspapier Firnisse, namentlich alkoholische oder ätherische Lösungen von Peru- und Tolubalsam 1 : 5. Verletzungen beim Pinseln sind sorgfältigst zu vermeiden.

Der Hauptindication, das Weiterschreiten der Exsudation zu verhindern, sind wir nicht im Stande zu genügen; alle gegentheiligen Behauptungen beruhen auf falscher Beobachtung oder Einbildung. Zu der von Frisch vorgeschlagenen prophylaktischen Tracheotomie mit Tamponade behufs Verhütung der Larynxdiphtherie wird wohl Niemand sein Kind hergeben.

Von Manchen wird die Insufflation pulverförmiger Substanzen als noch mildere Procedur vorgezogen. Man benützt dazu die reine pulverisirte Borsäure, das Jodoform rein oder mit Borsäure, das Jodol, Tannin, Alaun, Flor. Sulfuris, Resorcin, Kali chloricum, Natr. benzoic. und das Calomel, letzteres nachdem der Rachen mit 5—10% Koch-

salzlösung gereinigt wurde. Die Entfernung der Pseudomembranen ist nur gestattet, wenn sie im Rachen flottiren oder nur noch fadenförmig mit ihrer Unterlage verbunden sind. Bei Scharlachdiphtherie empfiehlt Heubner parenchymatöse Einspritzungen von $^1/_2$ Kubikcentimeter einer 3% Carbollösung.

Auch bei Diphtherie der Nase ist die sorgfältige Reinigung die Hauptsache. Sie geschieht entweder durch Eingiessen mit dem Löffel, das sog. Nasenbad, oder mittelst eigens construirter Spritzen, oder wie bei Kindern mit einem Gummiballon, dessen wohl abgerundete Spitze aus Bein oder gleichfalls aus Gummi besteht. Die Injectionsflüssigkeit muss lauwarm sein und bei völliger Verstopfung der Nase unter starkem Drucke ein- bis dreistündlich eingetrieben werden. Besonders geeignet erscheinen Kalkwasser mit Carbolsäure oder Spiritus vini, 4% Borsäure, 2—3% Kali chloricum, Milchsäure, Natr. carb., bei fötidem Ausflusse $^1/_{10}$% Kali hypermang.-Lösung. Bei Blutungen verdienen Injectionen mit Tannocarbollösung, Alaun oder Liq. ferri sesquichl. den Vorzug. Nach der Reinigung wird Borsäurepulver, Jodoform, Jodol mit Magnes. carbon. $\overline{aa}$ insufflirt. Zum Schutze der umliegenden Haut gegen die excoriirende Wirkung des Secretes empfiehlt sich Bestreichung mit Borvaselin.

Die Behandlung der Larynxdiphtherie mit Kälte hat sich nicht bewährt, indem sich weder die Entwicklung der Krankheit aufhalten noch die bereits entwickelte Affection irgendwie beeinflussen lässt. Auch von den früher vielfach empfohlenen forcirten Einreibungen mit Ung. ciner. ist nichts zu erwarten. Wenn auch der Nutzen der warmen erregenden Halsumschläge sowie der Inhalationen heisser medicamentöser Dämpfe namentlich der oben erwähnten membranlösenden Mittel in der Regel kein auffallender ist, so ist doch in Ermangelung einer besseren Therapie von denselben stets Gebrauch zu machen. Die bei Larynxcroup sehr beliebten Brechmittel sind bei Diphtherie nicht nur völlig nutzlos, sondern sogar schädlich, dagegen verdient das Apomorphin als Expectorans Beachtung.

Nimmt die Athemnoth zu, so ist die mechanische Entfernung der Membranen angezeigt. Bei älteren Kindern und Erwachsenen muss man versuchen, unter Leitung des Kehlkopfspiegels mittelst eines Pinsels oder eines an einen Neusilberdraht befestigten trockenen oder mit Kalkwasser, Carbolsäure, Papayotin oder Pepsin imprägnirten Schwämmchens unter rotirenden Bewegungen die den Larynx und die Trachea auskleidenden Membranen mechanisch zu entfernen. Dass diese Versuche nicht ganz aussichtlos sind, hat Verfasser einige Male erfahren; es gelang demselben so unter Anderm auch einmal, einen förmlichen Ausguss des Kehlkopfes und der Trachea zu entfernen und die Tracheotomie zu vermeiden. Auch mittelst O'Dwyer's Intubation oder der Schrötter'schen Dilatationsrohre aus Hartgummi, welche man zur Tubage des Kehlkopfes benützt, und die eventuell unter Leitung des Fingers in den Kehlkopf eingeführt werden, gelingt es wenigstens momentan, die Athmung zu erleichtern. Da jedoch bei Kindern alle diese Proceduren in der Regel nicht ausführbar und auch bei Erwachsenen sehr oft erfolglos sind,

so bleibt als letztes Mittel nur noch die Tracheotomie übrig. Sie ist dann indicirt, wenn continuirliche Dyspnoe sowie Einziehungen am Thorax und Zwerchfell auftreten; noch länger warten, hiesse die Operation an einer Leiche ausführen. Ohne auf die Technik der Tracheotomie einzugehen, sei hier besonders erwähnt, dass, wenn die Erfolge der Operation auch nicht so glänzende sind wie beim genuinen Larynxcroup, doch in manchen Epidemien ein Drittheil selbst die Hälfte der Operirten gerettet wird, und dass es Pflicht jedes gewissenhaften Arztes ist, die Angehörigen auf dieses einzige Rettungsmittel aufmerksam zu machen und dasselbe in Anwendung zu bringen.

Die Nachbehandlung ist fast ebenso wichtig, wie die Operation selbst. Dass die Schnittwunde mit Carbol- oder Jodoformgaze oder Borlint bedeckt und streng antiseptisch behandelt werden muss, ist natürlich; die Zimmerluft werde durch Aufstellen von offenen Wassergefässen beständig feucht erhalten, auch müssen stündlich Inhalationen mit 1% Natr. bicarb. und Carbolsäurelösung durch die Canüle gemacht und die letztere fleissig von den antrocknenden Secreten und Pseudomembranen gereinigt werden; die Entfernung der Canüle hat sobald als möglich zu geschehen.

Von derselben Wichtigkeit wie die locale ist die allgemeine Behandlung der Diphtherie. Man war von jeher bemüht, ein Mittel zu finden, das specifisch wirkt, d. h., das einerseits die gesetzten Exsudate beseitigt und das Virus zerstört, andererseits das Weiterschreiten und die Bildung neuer Pseudomembranen verhindert. Ein solches Mittel gibt es zur Zeit noch nicht, an solchen aber, denen man eine specifische Wirkung vindicirt, ist kein Mangel. Als solche gelten besonders das Kali chloricum; seine Dosirung ist bei Kindern 2 : 120·0, bei Erwachsenen 5 : 150, stündlich 1 Kaffee- resp. Esslöffel voll. Doch ist grösste Vorsicht nöthig, da leicht Vergiftung eintreten kann. Grosse Hoffnungen setzte man ferner auf das Pilocarpin; es ist nicht nur wirkungslos, sondern bei Herzschwäche sogar gefährlich, wie auch Henoch bestätigt. Ebenso illusorisch ist die Wirkung des innerlich genommenen Terpentinöls (1—2 Kaffeelöffel in Milch) oder des Arseniks, des Sublimats und anderer plötzlich auftauchender und ebenso rasch wieder verschwindender Mittel, wie z. B. der in Italien gebräuchlichen Sauerstoffinhalationen.

Das Rationellste bleibt immerhin, mit den angeblichen Specificis keine Zeit zu verlieren, sondern die einzelnen Symptome zu bekämpfen. Gegen Fieber empfiehlt sich besonders bei Kindern das Antipyrin und Antifebrin, bei der septischen Form das Chinin oder Chininum ferrocitricum 0·5—1·0 pro die. Als Roborans kann man Decoct. Chinae oder den in England gebräuchlichen Liquor ferri sesquichl. gutt. XX, Aq. destill. 50·0, Syr. simpl. 30·0 zweistündlich 1 Kaffeelöffel voll oder die Tinct. ferri acet. aether. verordnen. Plötzlich auftauchenden Collaps bekämpfe man mit warmen Bädern, warmen Eipackungen, Alcoholicis, Liq. ammon. anis., Liq. anodynus Hofm. eventuell mit Campherinjectionen. Drohende Urämie behandle man je nach der Beschaffenheit des Pulses mit Digitalis oder Reizmitteln; die Nephritis

erfordert Anregung der Diurese und Diaphorese, lauwarme Bäder, Milchdiät. Pneumonische Infiltrate oder Bronchitiden erfordern Expertorantia und warme Brustumschläge, Diarrhöen Opium. Bei Myocarditis ist jede Körperbewegung strengstens zu verbieten und Bettruhe, ferner wie bei Anämie Eisen, Alcoholica, nahrhafte Kost und Landaufenthalt zu verordnen.

Gegen Diphtherie der Trachea und der Bronchien ist in der Regel jede Therapie machtlos. Immerhin versuche man, durch Aspiration der Pseudomembranen mittelst Katheter und Saugspritze sowie durch Einträufelungen und Inhalationen von Papayotin, Pepsin oder Kalkwasser die Membranen zu lösen und ihre Ausstossung durch Expectorantia (Apomorphin, Infus. Senegae mit Liq. ammon. anis.) zu beschleunigen.

Die Affectionen der Sexualorgane sowie der Haut und die Diphtherie der Trachealwände müssen mit den bereits Anfangs angegebenen desinficirenden Mitteln nach chirurgischen Regeln behandelt werden.

Wenn auch die leichteren Grade von diphtheritischer Lähmung in der Regel von selbst zurückgehen, so erscheint es doch bei den schwereren und gefährlicheren Formen, wie bei der Kehlkopflähmung, Herzvagusparese, Lähmung der Extremitäten, nöthig, durch therapeutische Eingriffe die Heilung zu unterstützen. Das souveräne Mittel ist die Elektricität, sowohl der constante als inducirte Strom. Durch wechselweise endolaryngeale und spinale Faradisation und Galvanisation erzielt man bei Schlundkehlkopflähmungen die schnellsten Erfolge. Für die hartnäckigeren Formen passen die von Ziemssen empfohlenen subcutanen Strychnininjectionen (0·001—0·002 bei Kindern), bei Erwachsenen bis zu 0·005 pro dosi. Bei Herzschwäche verweise man die Patienten, selbst wenn sie keine subjectiven Beschwerden haben, unerbittlich in's Bett und verbiete ihnen jede Muskelanstrengung, so das Sichaufrichten, Umdrehen etc., da erfahrungsgemäss durch körperliche Anstrengungen sofortiger Tod eintreten kann. Zur Nachkur empfehlen sich namentlich bei Ataxie und Extremitätenlähmung die Thermen von Wildbad, Gastein, Wiesbaden, Ragaz, Teplitz; ferner die Moorbäder von Aibling, Franzensbad, zur Winterzeit die Riviera.

Granulome der Trachea müssen entfernt, membranöse Verwachsungen vom Larynx oder der Trachealwunde aus mit Messer oder Galvanokauter getrennt, narbige Stenosen mittelst der Schrötter'schen Röhren beseitigt, Kehlkopfkatarrhe local behandelt werden.

Pharyngitis gangraenosa.

Wie in der Mundhöhle so kommt auch im Rachen die Gangrän als Modification resp. Ausgang der verschiedenen Formen der Entzündung zur Beobachtung.

Wenn auch der Brand in Folge von Diphtherie der häufigste ist, so tritt er doch auch unabhängig von derselben als primäre Er-

krankung auf. Er ist bald circumscript bald diffus, nicht gar selten befällt er heruntergekommene, schlecht genährte, kachectische Kinder und Erwachsene, oder er gesellt sich zu phlegmonösen Anginen, retropharyngealen Abscessen, oder zu den secundären Anginen des Scorbuts, Scharlachs, der Masern, des Typhus und der Variola, oder er entwickelt sich nach Verletzungen und operativen Eingriffen, oder auch nach Blutungen in der Schleimhaut. Pitha beobachtete ein epidemisches Auftreten von Angina nosocomialis phagedaenica bei Hospitalbrand, ebenso Browne. Nach Barthez und Rilliet soll Pharynxgangrän auch in Folge von Keuchhusten und Pharynxtuberculose auftreten können. Semon sah auf den Tonsillen localisirte Gangrän.

Die Krankheit beginnt in primären Fällen mit Vorliebe am weichen Gaumen und den Tonsillen, seltener auf der Hinterwand, unter den Erscheinungen einer katarrhalischen oder phlegmonösen Entzündung mit Fieber und heftigen Localerscheinungen. Nach kürzerer oder längerer Zeit, meist schon nach 2—3 Tagen, treten die ersten Symptome der Nekrose in Form von grauen oder bräunlichen, schwärzlichen Flecken auf, über welchen sich zuweilen die Schleimhaut in Gestalt von Brandblasen emporwölbt. Der Inhalt der letzteren ist Anfangs serös, später missfarbig, sanguinolent, jauchig. Gleichzeitig schwellen die Lymphdrüsen an und die Affection verläuft von nun an meist unter dem Bilde der Adynamie. Das bisherige Fieber macht einer normalen öfters subnormalen Temperatur Platz, der Puls sinkt zuweilen sogar bis auf 15 Schläge in der Minute, die Welle ist klein, die Haut blass, kalt, cyanotisch, mit Schweiss bedeckt. An Stelle der ursprünglichen Flecken und Brandblasen tritt eine schmutzige, zunderartige, leicht blutende schwarzgraue Masse, nach deren Abstossung übelaussehende Geschwüre und tiefe Substanzverluste und Perforationen, oft völlige Abrasion des Velum zurückbleiben. In Folge der localen Beschwerden, des Appetitmangels, der oft sehr profusen Blutungen oder in Folge von Pyämie gehen die meisten Kranken nach 8 Tagen oder auch schon früher oder erst später zugrunde. Das Sensorium kann erhalten sein, ist aber öfters getrübt und Coma und Sopor vorhanden, der Geruch aus dem Munde ist äusserst penetrant, die Secretion reichlich, blutig, mit Jauche vermischt, manchmal treten Petechien der Haut und Blutungen innerer Organe auf. Auch Gangrän entfernter Körpertheile, der Lunge, des Kehlkopfes, der Geschlechtsorgane, besonders beim weiblichen Geschlechte, sowie Brand in der Umgebung des Afters wurden beobachtet.

Die Prognose der Rachengangrän sowohl der primären als secundären ist eine äusserst infauste, fast stets letale, doch wurden auch Heilungen so besonders von Musset, Trousseau und Morell Mackenzie mitgetheilt.

Die Therapie ist zwar ziemlich machtlos, doch darf der Versuch, den Brand zu localisiren und die Local- und Allgemeinerscheinungen zu lindern, nicht unterlassen werden. Die in Betracht kommenden Mittel sind dieselben wie bei Mundgangrän oder Rachendiphtherie.

Syphilis.

Unter den secundären Rachenaffectionen ist keine von grösserer praktischer Bedeutung wie die Syphilis.

Abgesehen von den selteneren Fällen von Primärinfection erkrankt der Rachen erst dann, wenn das syphilitische Gift in der Lymph- und Blutbahn Aufnahme gefunden hat.

Die erste Aeusserung desselben ist das Erythem, die syphilitische Angina. Meist gleichzeitig mit Roseola der Haut tritt auf der Schleimhaut des weichen Gaumens, der Tonsillen und der Hinterwand eine fleckige oder verwaschene, gleichmässige mehr oder weniger ausgesprochene Röthung und Schwellung auf, die zuweilen einen acuten meist aber chronischen Verlauf nimmt und letzteren Falles mit sehr geringen Beschwerden einhergeht. Die Unterscheidungsmerkmale der syphilitischen Angina, als da sein sollen: mehr bläulichrothe Farbe der Schleimhaut, gleichmässige Röthung und scharfes Begrenztsein auf dem weichen Gaumen, sind nicht stichhaltig; eine sichere Diagnose kann nur bei Anwesenheit anderer syphilitischer Erscheinungen gestellt werden. Trübungen des Epithels sind, weil hauptsächlich bei syphilitischen Schleimhautentzündungen vorkommend, immerhin verdächtig aber nicht beweiskräftig.

Eine fast täglich vorkommende Erscheinung sind die Schleimhautplaques oder Papeln und die aus ihnen hervorgehenden Geschwüre des Rachens.

Wenn sich auch dieselben meist gleichzeitig mit jenen der Mundhöhle vorfinden, so kann doch der Rachen allein und zuerst befallen werden. Ihre Lieblingsstandorte sind der weiche Gaumen, besonders die Gaumenbögen, die Uvula, die Tonsillen; auf der Hinterwand hat Verfasser ebenso wie Zeissl dieselben noch nie gesehen.

Die objective Untersuchung ergibt auf normaler meist aber mehr oder weniger hyperämisirter und geschwellter selbst ödematöser Schleimhaut kleinere und grössere, rundliche oder längliche milchige, bläulich-weisse Flecken und Streifen, welche wenig über die Schleimhaut erhaben und von einer gelockerten, macerirten Epitheldecke überzogen sind. Stösst sich die letztere ab, dann entstehen oberflächliche linsen- bis mehrere Centimeter grosse öfters unregelmässig gestaltete Geschwüre, welche die freien Ränder der Gaumenbögen gezackt und eingekerbt erscheinen lassen. Besonders deutlich treten diese Einkerbungen an der Basis der Uvula und den Gaumenbögen in die Augen. Auf den Mandeln stehen die Plaques bald isolirt bald gleichmässig über die meist vergrösserte Tonsille vertheilt, bald bilden sie confluirende Flecke und Flächengeschwüre, selbst tiefe Risse und Spalten, deren Grund und Ränder zuweilen mit spitzigen papillären Wucherungen besetzt sind.

Die Beschwerden sind sehr oft gering oder mit denen der acuten Angina identisch; sehr heftiges Schluckweh, besonders beim Genusse gewürzter oder saurer Speisen tritt ein, wenn die Papeln ulceriren oder in grösserer Anzahl vorhanden sind.

In den späteren Stadien der Syphilis verdienen die gummösen Infiltrate, auch Knoten, Syphilome genannt, und die aus ihnen hervorgegangenen Geschwüre wegen ihrer ausserordentlichen Häufigkeit besonderes Interesse.

Die gummöse Neubildung tritt bald diffus als Infiltrat bald circumscript als Knoten auf. Im Nasenrachenraum sitzt dasselbe mit Vorliebe in der Plica salpingopharyngea, dem Tubenwulste, und repräsentirt sich in Gestalt einer glatten, rundlichen, gelbrothen Einlagerung oder Geschwulst von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Haselnuss. Nach kürzerem oder längerem Bestande erweicht dieselbe und gibt zu einem kraterförmigen, mit wallartigen Rändern umgebenen, sich mehr und mehr vergrössernden Geschwür Anlass, nach dessen Heilung Verengerung oder völliger Verschluss der Tuben zuweilen mit Zerstörung des Tubenknorpels oder membranöser Verwachsung der Choanen zurückbleibt. Auch am Rachendache sowie dem obersten Theile der Hinterwand kommen ausgebreitete und sehr tiefgehende Ulcerationen vor.

Weniger charakteristisch verlaufen die syphilitischen Infiltrate auf der Hinterwand der Pars oralis und laryngea. Bald mehr in der Mitte, bald auf der Seite hinter dem hintern Gaumenbogen, entwickeln sich schmerzlos oder nahezu symptomlos länglich-runde Leisten und Erhöhungen, welche conglomerirten Granulationen oder hypertrophischen Seitensträngen täuschend ähnlich sehen. Ihr wahrer Charakter entpuppt sich oft erst dann, wenn sie an irgend einer Stelle erweichen und sich in Ulcerationen umwandeln. In schweren oder vernachlässigten Fällen überschreiten die Geschwüre die Grenzen der Schleimhaut und geben zu Caries und Nekrose der Halswirbel unter Umständen sogar zu Entblössung der vorderen Fläche des Rückenmarks Anlass. Ja es sind sogar von L. Fischer und Mackenzie Fälle beobachtet, bei denen es zu Ausstossung nekrotischer Theile des Atlas und Epistropheus kam.

In nicht zu verkennender Weise tritt das Gumma am weichen Gaumen auf.

Die ersten Anfänge entziehen sich zwar öfters deshalb der Beobachtung, weil die Syphilome mit besonderer Vorliebe die Rückfläche des Velum einnehmen; vergrössern sie sich jedoch und erreichen die Vorderfläche des Velum, oder entwickeln sie sich gleich von vorneherein auf der letzteren, namentlich auf der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen oder in den Gaumenbögen, so stellen sie circumscripte, dunkelblau-rothe, die Schleimhaut emporwölbende Einlagerungen vor; die nächste Umgebung des Infiltrates ist stark hyperämisch, oft das ganze Velum und Uvula ödematös. Bei sehr diffuser Infiltration erscheinen das Velum, Uvula und Gaumenbögen verdickt blauroth wie bei Phlegmone. Nach kürzerem oder längerem Bestande treten im Centrum der Infiltrate weisse oder gelbliche Streifen und Punkte auf, die sicheren Zeichen der beginnenden Erweichung, welche sich immer mehr vergrössern, in Geschwüre umwandeln und oft unerwartet schnell Perforation zur Folge haben. Die Oeffnung entspricht

Anfangs so ziemlich dem Umfange des Erweichungsheerdes, vergrössert sich jedoch immer mehr, besonders wenn die Kranken ihrem Schicksal überlassen bleiben. Nicht selten sind mehrere Knoten vorhanden, welche gleichzeitig oder nacheinander perforiren und zu ausgedehnten Geschwüren Anlass geben. Vollständige Abrasion des Velum ist nicht gar selten; meist wird jedoch nur ein Theil desselben zerstört; entwickelten sich die Knoten in der Nähe der Basis der Uvula, so kann dieselbe ganz abgetrennt oder bis auf eine dünne fadenförmige Brücke abgeschnürt werden. Häufig kommt es zu Verlöthungen der Uvula mit der Hinterwand oder der Rückfläche des Velum, zu Verwachsungen des weichen Gaumens mit der Hinterwand, zu ringförmigen Stenosen und membranösen Verwachsungen des untern Pharynxabschnittes, die bereits früher besprochen wurden. Nach der Heilung tiefergehender Geschwüre bleiben weisse, glänzende, strahlige Narben zurück, die je nach ihrer Mächtigkeit die benachbarten Theile heranziehen und zu den gleichfalls schon besprochenen Formveränderungen Anlass geben. Durch Narbenbildung am Velum sowie durch interstitielle Myositis der Gaumenmuskeln wird die Schwingungsfähigkeit und Contractilität desselben verringert, ja ganz aufgehoben, durch abnorme Kürze der Verschluss des Nasenrachenraumes unmöglich; kleinere Perforationen verengern sich mit der Zeit durch Narbenbildung und können sogar völlig schwinden, grössere verkleinern sich zwar ebenfalls, lassen aber fast immer Störungen der Sprache zurück; doch hängen die letzteren nicht ausschliesslich von der Perforation sondern von der Verödung der contractilen Substanz des Velum ab.

Schlagen die Gummata auf den Mandeln ihren Sitz auf, dann erscheinen die letzteren geschwellt, zuweilen bis zur gegenseitigen Berührung und Abplattung hypertrophisch. Bei oberflächlichem Sitze der Knoten erscheint die Mandel uneben und höckerig; bei längerem Bestande erweichen die Höcker und lassen tiefe, kraterförmige Geschwüre zurück, welche mit einander confluiren und die Tonsille in eine zerfetzte, ausgefressene, stellenweise granulirende Masse umwandeln. Nicht selten entwickeln sich in den Vertiefungen und Lacunen weisse sich kreuzende Streifen, welche theils aus Narbengewebe theils aus wucherndem jungen Bindegewebe bestehen (interstitielle schrumpfende Tonsillitis).

Die subjectiven Beschwerden der syphilitischen Infiltrate und Geschwüre beziehen sich meist auf die Deglutition. Im Beginne fehlen meist die Beschwerden ganz, mit der weiteren Entwicklung entsteht das Gefühl eines Fremdkörpers im Halse, Trockenheit oder vermehrte Secretion. Der Schluckact ist, besonders wenn Zerfall eingetreten ist, nicht nur schmerzhaft, sondern auch insoferne behindert, als gröbere Bissen nicht oder nur mit Mühe geschluckt werden. Meist ist das Timbre der Stimme nasal oder anginös, bei grösseren Infiltraten des Velum sowie bei Perforation oder beträchtlicheren Substanzverlusten tritt Regurgitiren des Genossenen ein. Verlust der Uvula hat ebensowenig wie Perforation eines Gaumenbogens weder auf die Sprache noch das Schlingen nachtheiligen Einfluss.

Die Diagnose der ausgebildeten Rachensyphilis speciell der Geschwüre ist namentlich bei sorgfältiger Untersuchung aller Theile in der Regel leicht und gründet sich auf die beschriebenen Veränderungen und gleichzeitige anderweitige Erscheinungen oder Ueberreste von Lues. Auf das Velum und die Gaumenbögen localisirte Katarrhe mit Volumzunahme und Cyanose der Schleimhaut müssen stets den Verdacht auf Syphilis erwecken, zumal wenn sie der Localtherapie hartnäckig trotzen. Anfängern kann man nur rathen, beim Anblicke eines Geschwüres im Rachen an ein dyskrasisches Leiden in erster Linie an Syphilis, dann an Tuberculose, Lupus oder Carcinom zu denken. Schwierig ist zuweilen die Unterscheidung syphilitischer Plaques und Angina lacunaris, zumal wenn beide mit Fieber verlaufen. Herpes wird gleichfalls oft mit syphilitischen Papeln verwechselt. Der acute meist fieberhafte Verlauf, das plötzliche Entstehen der Veränderungen, die grosse Schmerzhaftigkeit, die rasche Heilung spricht für Herpes; der allmähliche Beginn, die lange Dauer, der Wechsel in Form und Sitz, die Fieberlosigkeit und geringe Schmerzhaftigkeit spricht für Syphilis.

Die Prognose ist günstig, vorausgesetzt, dass die Kranken nicht zu spät oder mit irreparablen Zerstörungen in Behandlung kommen. Dass selbst noch in verzweifelten Fällen nach Ausstossung nekrotischer Halswirbel Heilung erfolgen kann, beweist ein bereits oben citirter Fall von L. Fischer; doch vergesse man nicht, dass Rachensyphilis eine grosse Neigung zu Recidiven zeigt.

Die Behandlung zerfällt in eine allgemeine und eine locale. Es wäre gewissenlos, die eine Methode auf Kosten der andern bevorzugen zu wollen; die besten und schnellsten Erfolge erzielt man durch Vereinigung beider. Für frühsyphilitische Erscheinungen — Angina, Plaques, Condylome — eignet sich am besten das Quecksilber, sei es in Form von Inunctionen oder Injectionen oder intern. Für die gummösen Formen und Zerstörungen gibt es kein besseres Mittel als das Jodkali und gelingt es oft, bereits total erweichte Gummata durch energische Dosen zurückzubilden und die Perforation zu vermeiden. Ist diese einmal erfolgt, dann gilt es zu retten, was noch möglich ist.

Die locale Behandlung besteht in Gurgelungen, Inhalationen, Bepinselungen und Cauterisationen. Der wohlthätige Einfluss des Sublimats und des Kali chloricum als Gargarisma tritt auch hier zu Tage. Zu Pinselungen eignen sich für Plaques Sublimat oder Höllensteinlösungen, am schnellsten werden sie durch Ueberstreichen mit Lapis in Substanz beeinflusst.

Zur Touchirung gummöser Geschwüre kann Verfasser die Mandl'sche Jodsolution mit Carbolsäurezusatz empfehlen; tiefergehende Ulcera sowie die Ränder perforirter Gaumengeschwüre müssen mit Lapis in Substanz oder Chlorzink cauterisirt werden; oft gelingt es, die Löcher bis auf ein Minimum zu verengern oder so zu verkleinern, dass die Stimme keinen Schaden leidet. Grössere besonders knöcherne Perforationen sowie Abrasionen des Velum können durch

Obturatoren und Gaumenplatten verdeckt oder durch chirurgische Eingriffe beseitigt werden; die Wiederherstellung einer normalen Sprache wird aber in den seltensten Fällen erzielt.

Tuberculose.

Eine relativ seltene Localisation der allgemeinen Tuberculose ist die des Rachens. Bedenkt man die ausserordentliche Häufigkeit derselben in dem unmittelbar angrenzenden Kehlkopf, so muss die geringe Betheiligung des Pharynx sehr auffallen. Leider bleibt uns bis heute die Wissenschaft die Antwort auf die Frage nach der Ursache dieser Erscheinung schuldig.

Wie beim Larynx so erhebt sich auch beim Pharynx die Frage, ob es eine primäre Rachentuberculose gibt; die Möglichkeit, dass sich das tuberculöse Virus zuerst im Rachen localisirt, muss zugegeben werden; dass der Rachen früher als die Lunge und Kehlkopf erkranken kann, hat Verfasser wiederholt gesehen; doch zwingen ihn seine Beobachtungen zu der Annahme, dass der Rachen nur scheinbar primär erkrankt, d. h. dass schon vor dem Ausbruche der Rachentuberculose käsige Herde oder Tuberkeldepôts in andern Organen bestehen, wenn sich dieselben auch nicht immer objectiv nachweisen lassen oder Erscheinungen machen. Das tuberculöse Virus kann ebenso wie das syphilitische jahrelang schlummern und dann plötzlich seine deletären Wirkungen entfalten.

Beispielshalber will Verfasser erwähnen, dass einer seiner Kranken, der in seinem 28. Lebensjahre an linksseitigem Spitzenkatarrh mit Hämoptoe gelitten hatte, nach 15jähriger vollkommener Gesundheit plötzlich an Otitis media und Tuberculose des Velum und der Wangen erkrankte, während ein anderer Patient, dem in seinem 63. Lebensjahre der rechte tuberculös entartete Hoden exstirpirt worden war, zwei Jahre später von Tuberculose der hinteren Rachenwand befallen wurde und durch Weiterverbreitung des Processes auf den Kehlkopf und schliesslich auf die Lunge zugrunde ging.

Meist gesellt sich jedoch die Tuberculose des Rachens zu bereits bestehender nachweisbarer Lungentuberculose. Die Jahre von 20—50 sind besonders bevorzugt, wie es scheint, auch das männliche Geschlecht, bei Kindern ist Rachentuberculose sehr selten.

Die Veränderungen, welche sich bei Pharynxtuberculose finden, sind sämmtlich auf tuberculöse Infiltration der Schleimhaut zurückzuführen. In der Regel sitzen die Tuberkel wie jene des Kehlkopfes unter dem Epithel, sind also dem blossen Auge unsichtbar. Oefters jedoch entwickeln sie sich auf der Schleimhaut und stellen dann kleine, hirsekorngrosse, graue, graugelbe Knötchen vor; ihr Lieblingssitz ist der weiche Gaumen, die Gaumenbögen, die hintere Rachenwand, die Tonsillen und der Nasenrachenraum, in welchem besonders die Rachentonsille, die Umgebung der Rosenmüller'schen Grube

und der Fornix ergriffen werden. Nach Strassmann ist die Tuberculose der Gaumenmandeln eine sehr häufige jedoch klinisch symptomlos verlaufende Begleiterscheinung der Lungentuberculose.

Im Stadium der Infiltration oder Knötchenbildung kommt die Rachentuberculose selten zur Beobachtung, meist erst im Stadium der Ulceration, d. h. nach Erweichung und Abstossung der Tuberkel. Nach der ausgezeichneten Schilderung B. Fränkel's, der zuerst in Deutschland wieder die Aufmerksamkeit auf dieses Leiden lenkte, sind die tuberculösen Rachengeschwüre Lenticulärgeschwüre; sie gehen mehr in die Fläche als in die Tiefe, haben einen speckigen, mit blassrothen, stecknadelkopfgrossen Granulationen besetzten und mit dünnem, schlechtem Eiter bedeckten Grund, ausgefressene, unregelmässige Ränder; in der Nachbarschaft oder an den Rändern der Geschwüre finden sich oft miliare Knötchen, papilläre Excreszenzen und warzenartige Auswüchse; die Lymphdrüsen des Halses sind in der Regel geschwellt. Bald ist die Hinterwand allein befallen, bald nur die Tonsillen oder die Gaumenbögen, bald sind sämmtliche Gebilde des Rachens mit Geschwüren besetzt.

Unter den subjectiven Beschwerden nimmt der Schmerz die erste Stelle ein. Derselbe ist äusserst heftig zumal bei der Deglutition, und strahlt meist in das eine oder in beide Ohren aus, durch Uebersprungen der schmerzhaften Sensationen auf den N. Jacobs., N. glossopharyngeus und N. auricularis vagi. Das Schluckweh ist meist so intensiv, dass die Kranken lieber hungern und dürsten, besonders wenn in Folge der Infiltration des Velums die genossenen Speisen durch die Nase wieder herausgeschleudert werden. Die Schleimsecretion ist vermehrt, beständiger Reiz zum Räuspern und Schlucken vorhanden, der Athem übelriechend. Neben diesen localen Beschwerden, die längere Zeit die einzigen sein können, stellen sich Appetitlosigkeit, Abmagerung, Kräfteverfall, abendliches Fieber mit meist sehr unregelmässigem Typus, Pulsbeschleunigung, Schweisse sowie Husten und Heiserkeit ein.

Nach kürzerem oder längerem Bestande verbreitet sich die Rachentuberculose längs des Zungengrundes und der Lig. glosso- und aryepiglottica auf den Kehlkopf, die Mundhöhle oder die Lunge, oder es entsteht Darm- oder Gehirntuberculose, um meist nach 3- bis 10monatlicher Dauer zum Tode zu führen. In seltenen Fällen kann Heilung eintreten, wie Verfasser selbst einmal sah. Die Ansicht Volkmann's, dass Verwachsungen des weichen Gaumens, Perforationen, Narben etc. ebenso häufig oder noch häufiger tuberculösen Ursprungs seien als syphilitische, dürfte bei den Fachgenossen auf entschiedenen Widerspruch stossen.

Die Diagnose bietet nicht nur dem Anfänger sondern auch dem Geübteren zuweilen grosse Schwierigkeiten; in der Regel wird die Rachentuberculose mit Syphilis verwechselt, zumal wenn noch keine oder geringe Lungenerscheinungen vorhanden sind. Ein solcher Irrthum lässt sich jedoch vermeiden, wenn man im Auge behält, dass die tuberculösen Rachengeschwüre nur äusserst selten so in die Tiefe

greifen wie die syphilitischen, dass die tuberculösen Geschwüre einen atonischen Charakter und so gut wie keine Neigung zur Heilung haben, und dass meist noch andere Erscheinungen, Hodentuberculose, Mastdarmfisteln, schlechtes Aussehen, Dämpfungen der Lungenspitzen etc. vorhanden sind. Absolut sicheren Entscheid gibt die mikroskopische Untersuchung auf Tuberkelbacillen. Im Uebrigen kann man B. Fränkel nur beistimmen, wenn er sagt, dass, wer nur einmal eine Rachentuberculose sah, das Bild derselben niemals vergessen wird.

Die Prognose ist eine sehr ungünstige, wenn auch zuweilen temporäre Heilungen, Stillstände ja sogar dauernde Heilungen vorkommen.

Die Therapie ist in der Regel ziemlich machtlos und muss man sich ausser auf Verbesserung der Constitution hauptsächlich auf Reinigung der Geschwüre und Beseitigung der Schmerzen beschränken. Am meisten Aussicht auf Heilung der Geschwüre geben Bepinselungen mit 20—80% Milchsäure; auch versuche man das Creosotglycerin 0·5 : 50·0, sowie Auflösungen von Jodoform, Jodol, ferner desinficirende Inhalationen und Gurgelwässer von Borsäure, Carbolsäure, Sublimat, Kali chloricum. Zur Linderung der oft unerträglichen Schmerzen empfiehlt sich das Touchiren mit 10—20% Cocainlösung oder das Aufblasen von Morphiumpulver 0·02 : 0·2 Amylum pro dosi. Dass grösste Vorsicht in Bezug auf die Consistenz, Form und Temperatur der Speisen beobachtet werden muss, ist selbstverständlich.

Scrophulose, Lupus, Lepra, Rotz.

Bei der Durchsicht der Literatur begegnet man namentlich bei französischen Schriftstellern auch der **Scrophulose** des Rachens.

Homolle und Isambert unterscheiden eine leichte und eine schwere Form der Rachenscrophulose. Unter ersterer verstehen sie die superficielle scrophulöse Angina, ein Analogon der chronischen Rhinitis lymphatischer Personen. Auf der Schleimhaut des Nasenrachenraumes zeigen sich zahlreiche Follikel und Granula, die sich nach Abstossung ihres Epithels allmählich in unregelmässige Geschwüre mit gelbem Grund, sinuösen Rändern und blaurothem Saum umwandeln, so dass die ganze Schleimhaut wie marmorirt erscheint. Die Geschwüre sind mit fest antrocknendem, blutigem, fötidem Secret bedeckt und zum Unterschiede von den syphilitischen absolut schmerzlos. Bei der schweren Form hingegen ergreift die Erkrankung, welche Isambert mit Lupus identificirt, einestheils die Epiglottis und die Aryknorpel, es entsteht Athemnoth und durch Verwachsung der Ränder der Epiglottis mit den benachbarten Rachengebilden Dislocation des Kehlkopfes; anderntheils gehen die Geschwüre auf die Gaumenbögen und das Velum über, durchlöchern das letztere und trennen die ersteren ab, so dass Verwachsungen mit der Hinterwand zu Stande kommen.

Der Verlauf solcher scrophulöser Rachengeschwüre ist nach Isambert ein sehr hartnäckiger; sie können das ganze Leben über bestehen, oder auch nach Monaten und Jahren mit Hinterlassung sternförmiger Narben heilen und zu starken selbst tödtlichen Blutungen Anlass geben.

Wenden wir uns zur deutschen Literatur, so erwähnt Wendt, offenbar im Einklange mit Isambert, dass man auf der Hinterwand des Nasenrachenraumes sowie auf der Rachentonsille bei Scrophulösen und Tuberculösen ebenso auch bei allem Anschein nach Gesunden eine tuberculisirende, verkäsende, scrophulöse Entzündung der Follikel, die Pharyngitis scrophulosa, finde. Die Follikel seien meist in grosser Anzahl vorhanden, von graugelblicher bis gelblicher Farbe, von trockener käsiger Beschaffenheit oder in einer Auflösung von fettigem Detritus begriffen. Bei dem Zerfalle der Oberfläche bilden sich kleine Geschwürchen, beim Untergange der tiefer eingebetteten Follikel bleiben zahlreiche runde Lücken im Parenchym zurück, durch Confluenz mehrerer benachbarter Geschwüre kann es zu tiefen Zerstörungen und Verwachsungen des weichen Gaumens kommen. Auch B. Fränkel, Lewin, Michel und besonders Löri erwähnen das Vorkommen scrophulöser Rachengeschwüre. Nach Letzterem sieht man dieselben selten vor dem zweiten Lebensjahre, um so häufiger bis zur Pubertät; sie gehen theils von der hypertrophischen Plica salpingopharyngea theils von der hintern Rachenwand und dem Velum aus, und haben bald glatte anämische bald unebene gewulstete und geröthete Ränder, und einen mit schlecht aussehenden Granulationen bedeckten Grund; auch können sie zu Perforationen führen.

In Bezug auf die Diagnose sind alle zur Unterscheidung scrophulöser Rachengeschwüre von andern angegebenen Kriterien zu unsicher und zu wechselnd, als dass sich dieselben mit Erfolg verwerthen liessen. Man wird deshalb sehr vorsichtig sein müssen, zumal wie E. Wagner treffend bemerkt, ein guter Theil der scrophulösen Geschwüre einen syphilitischen, tuberculösen, lupösen oder leprösen Ursprung hat. Namentlich die Syphilis hereditaria tarda, von der noch bei der Scrophulose der Nase die Rede sein wird, localisirt sich mit besonderer Vorliebe im Rachen und dem Nasenrachenraum.

Die Behandlung hat zuerst die Verbesserung der Constitution durch Eisen, Jodeisen, Leberthran, Tonica, Chinin, Kochsalz- oder Schwefelbäder in's Auge zu fassen; bei Verdacht auf Syphilis leite man eine antisyphilitische Behandlung ein, welche bei der rein scrophulösen Form als schädlich zu vermeiden ist. Local empfehlen sich Bepinselungen der Geschwüre mit Mandl's Solution, Reinigung des Nasenrachenraumes, bei Ulcerationen, die mit Vegetationen besetzt sind: Aetzmittel, besonders Chromsäure, Chlorzink, Milchsäure.

Dass Lupus mit besonderer Vorliebe bei Scrophulösen auftritt, ist sicher. Er kommt primär und secundär d. h. in Gesellschaft mit Lupus der äusseren Haut, besonders der Nase und des Kehlkopfes vor. Er befällt hauptsächlich jüngere Individuen weiblichen Geschlechtes

und localisirt sich gerne auf den Mandeln und dem weichen Gaumen. Die Tonsillen erscheinen vergrössert, ihre Oberfläche uneben, mit Knoten und Excrescenzen bedeckt, zwischen denen sich Ulcerationen bemerkbar machen. Wird das Velum ergriffen, dann entwickeln sich auf normaler oder blasser Schleimhaut kleinere und grössere confluirende Knötchen, welche entweder schrumpfen oder zerfallen und tiefe Geschwüre bilden, die theils vernarben, theils zu Defecten und Perforationen sowie zu Verwachsungen und sonstigen Formanomalien Anlass geben.

Die Diagnose des Lupus ist zuweilen schwer, da er mit Syphilis grosse Aehnlichkeit hat. Für Lupus sprechen das papillärknotige Aussehen, der sehr langsame und schmerzlose Verlauf, die Gegenwart von Lupus der Haut und anderen scrophulösen Erscheinungen, sowie die Jugend der Kranken; doch vergesse man nicht, dass die hereditäre Syphilis zuweilen erst sehr spät selbst zur Zeit der Pubertät in Erscheinung tritt.

Die Behandlung des Lupus muss eine allgemeine und eine locale sein. Da derselbe zuweilen theilweise auf syphilitischer Basis beruht, so ist jedenfalls ein Versuch mit Jodkali indicirt; der Lupus der Scrophulösen wird durch dasselbe meist nicht beeinflusst. Bei diesem empfehlen sich Verbesserung der Ernährung und Blutmischung durch passende Diät, Land- und Seeluft, China, Eisen, Leberthran. Local suche man durch Aetzungen mit Milchsäure oder Liq. ferri sesquichl. 1 : 4 oder durch Einbohren von Lapisstiften oder mittelst Galvanokauter und Auskratzen mit Curetten und scharfen Löffeln alles Krankhafte zu zerstören.

Ueber die **Lepra** des Rachens liegen bei der grossen Seltenheit dieser Affection in Europa nur spärliche Mittheilungen vor.

Dieselbe scheint im Rachen nur secundär d. h. erst dann aufzutreten, wenn die äussere Bedeckung bereits befallen ist. Mit Vorliebe werden der weiche Gaumen und die Tonsillen befallen. Auf dem ersteren entstehen, wie ein von F. Müller mitgetheilter Fall beweist, verschieden grosse zum Theil confluirende, unregelmässig begrenzte, leicht prominente Infiltrate von glänzender gelbweisser Farbe, wodurch das Velum in eine starre unbewegliche Masse umgewandelt wird; dieselben Veränderungen finden sich auch an Gaumenbögen und Uvula. Nach längerem oder kürzerem Bestande kommt es an den knotigen Infiltraten zu Geschwüren, Substanzverlusten, Perforationen und Verwachsungen. Wird auch die Nase mitergriffen, so findet sich ausser Trockenheit im Rachen näselnde Stimme, Störung des Geschmackes und Geruchs, mehr oder weniger hochgradige Verlegung einer oder beider Nasenhöhlen.

Die Diagnose stützt sich auf die Anwesenheit von Zerstörungen und Lepraknoten auf der äusseren Haut, die fast nie fehlende Anästhesie und den Nachweis der charakteristischen Leprabacillen.

Die Prognose ist absolut infaust.

Die Therapie besteht in Ortswechsel, nährender Diät, Kaltwassercuren; innerlich Creosot (1·5 : 50 Pillen) oder Natr. salicyl. 2—5·0 pro die; die locale Behandlung ist dieselbe wie bei Lupus.

Grosse Aehnlichkeit mit den bisher besprochenen Affectionen hat ferner das **Rhinosclerom**, das relativ häufig auch den Rachen befällt. Die ausführlichere Beschreibung desselben ist bei den Krankheiten der Nase nachzulesen.

Endlich localisiren sich auch die **Maul-** und **Klauenseuche** sowie der **Rotz** im Rachen. Die Formen, unter welchen sie auftreten, sind dieselben, wie sie bei den Krankheiten der Mundhöhle geschildert wurden.

Mykosen.

Wie die Mundhöhle so ist auch der Rachen der Tummelplatz zahlreicher niedriger Organismen. Der Pharynx erkrankt selten allein, häufiger gemeinsam mit der Mundhöhle, weshalb wir auch meistens dieselben Parasiten wiederfinden.

Dass der Soor bei Kindern sehr oft auf weichen Gaumen und hintere Rachenwand fortschreitet, wurde früher betont; bei Erwachsenen findet sich Rachensoor hauptsächlich bei schweren Krankheiten und marantischen Zuständen. Relativ am häufigsten kommt er im Verlaufe schwerer Typhen vor; so beschrieb unter Anderen Damaschino eine Soorepidemie in Paris; das Mycelium des Soorpilzes dringt nicht nur in das Epithel sondern auch in die Muskelschichte ein. Nach Duguet, der gleichfalls seine Beobachtungen an Pariser Typhuskranken machte, verbreitet sich der Soor der Typhösen vom Rachen aus nach der Mundhöhle, während bei Kindern das umgekehrte Verhältniss stattfindet. Aber nicht nur bei Schwerkranken sondern auch bei Gesunden kann primärer Rachensoor vorkommen. So sah Verfasser ausgebreiteten Soor bei einem älteren jedoch völlig rüstigen Manne im untersten Theile des Pharynx sowie auf den Ligam. aryepigl.; auch Freudenberg publicirte zwei hiehergehörige Fälle; der eine betraf einen stimmlich sehr überanstrengten Gymnasiallehrer, der andere einen Mann, dessen carcinomatöse Frau an ausgebreitetem Mundsoor gelitten hatte.

Die Klagen der Kranken beschränken sich, insoferne sie nicht soporös oder sonstig geistig gestört sind, auf Schluckbeschwerden; heftige brennende, stechende Schmerzen im Halse, das Gefühl der Anwesenheit eines Fremdkörpers, Brech- und Würgbewegungen; bei Kindern besteht bei massenhafter Entwicklung des Pilzes hochgradige Dysphagie mit Regurgitiren der Ingesta.

Die Diagnose kann nur mit dem Mikroskope gestellt werden.

Die Behandlung ist dieselbe wie bei Mundsoor; französische Beobachter empfehlen ausser Borax besonders Vichywasser. In den unteren Partien des Rachens muss der Soor mit Pinsel und Schwamm entfernt und die befallene Stelle mit dem desinficirenden Spray — Carbol-, Bor-, Salicylwasser, 1 pro mill. Sublimatlösung — berieselt werden.

Eine andere durch Pilze bedingte Affection ist die zuerst von B. Fränkel beschriebene Mykosis tonsillaris benigna, die

mit der Hering'schen Pharynxmykosis leptothricia identisch ist.

Man versteht darunter eine Erkrankung des Rachens und des Zungengrundes, welche sich durch weissliche oder gelblich-graue, weiche, manchmal hornartige, öfters gestielte Knötchen oder stachelartige Excrescenzen äussert. Sie haben ihren Sitz auf der Oberfläche und in den Lacunen der Mandeln, oder auf den Gaumenbögen und der hinteren Rachenwand, deren Seitentheile zuweilen tief herab mit ihnen besetzt sind. Auf der Zunge sitzen sie ausnahmslos in der Gegend der Pap. circumvall. und bilden dort 2—8 Millim. lange und bis zu 2 Millim. dicke Fäden und Bündel. Frauen scheinen etwas häufiger zu erkranken, ebenso scheint das Alter von 28—35 Jahren besonders bevorzugt.

Die subjectiven Erscheinungen bestehen meist in Kitzel, Trockenheit, Brennen, geringem Schluckweh, Reiz zum Räuspern und Husten; in einzelnen Fällen, so auch bei einem vom Verf. beobachteten Kranken, geht dem Ausbruche der Flecken Fieber mit allgemeinem Unbehagen, Mattigkeit und Appetitlosigkeit voraus; in andern Fällen fehlt jede Beschwerde und die Kranken werden zufällig durch Inspection ihres Rachens auf die Affection aufmerksam. Zieht sich dieselbe sehr in die Länge, dann kann in Folge ungeeigneter Eingriffe oder durch hypochondrische Gemüthsstimmung der Appetit leiden, Dyspepsie und Abmagerung eintreten.

Die mikroskopische Untersuchung der erwähnten Flecken ergibt die Anwesenheit äusserst zahlreicher Mikroorganismen, über deren Benennung zur Zeit noch keine Einigkeit herrscht. In dem von B. Fränkel mitgetheilten, ebenso in dem vom Verf. untersuchten Falle, bestanden die Knötchen ausschliesslich aus Stäbchen und rundlichen Coccen, in dem von E. Fränkel publicirten und von Sadebeck analysirten Falle fand sich ein eigenthümlicher Bacillus, der wegen seines Auftretens in Büscheln Bacillus fasciculatus genannt wurde. Hering, der selbst 6 Fälle untersuchte, kam zu dem Resultate, dass die aufgefundene Pilzmasse aus Leptothrix bestehe, zumal sich die Fäden und Stäbe mit Jodlösung blau färbten. Jacobson nannte die Affection, weil der Leptothrix zu den Algen gehört, Algosis faucium.

Der Verlauf ist sehr hartnäckig, indem die künstlich entfernten Massen sich sofort wieder ersetzen.

Die Diagnose ist für den, der die Affection zum erstenmale sieht, nicht leicht; er verwechselt sie, zumal wenn Allgemein- und stärkere Localerscheinungen vorhanden sind, constant mit Diphtherie; gegen letztere spricht der gewöhnlich fieberlose Verlauf, der Mangel entzündlicher Schleimhautveränderungen und Lymphdrüsenschwellungen, das discrete Auftreten und die Consistenz der Herde sowie das gleichzeitige Mitergriffensein der Zunge. Einer Verwechselung mit Angina lacunaris wird durch den stets fieberhaften und acuten Verlauf der letzteren sowie durch die bröckelige Consistenz der Flecke vorgebeugt; Concremente in den Tonsillen unterscheiden sich von

mykotischen Herden durch ihre steinige, kalkige Härte sowie durch ihre Zusammensetzung aus verfetteten Epidermisschollen, Kalkbestandtheilen, Cholestearinkrystallen und die weitaus geringere Zahl der Bacterien.

Die Behandlung muss eine sehr energische sein, da alle Beobachter darüber einig sind, dass die definitive Beseitigung der Pilzherde mittelst der gewöhnlichen antibacteriellen Mittel so gut wie unmöglich ist. Immerhin erscheint ein Versuch — Bestreichen der Herde mit 10% alkoholischer Salicylsäure oder Sublimatlösung angezeigt. Am meisten empfiehlt sich die mechanische Entfernung und Zerstörung mittelst scharfer Löffelzangen oder dem Galvanokauter. Bei Solchen, welche sich durch die Anwesenheit des durchaus ungefährlichen Parasiten nicht beunruhigt fühlen, kann jede Medication unterbleiben, da sich die Affection meist spontan besonders durch starkes Rauchen zurückbildet.

Auch die Sarcine kann massenhaft im Rachen auftreten und von da in die Lunge oder umgekehrt von der Lunge in den Rachen gerathen. Lieblingsaufenthalt derselben scheint der Raum zwischen Zungengrund und Epiglottis sowie der Sinus pyriformis zu sein. Beschwerden macht die Sarcine keine, auch ist sie nach H. Fischer nicht im Stande, noch vorhandene andere Krankheitsprocesse zu beeinflussen.

Nach einer Beobachtung von Schubert kann sich ferner der Aspergilluspilz aus der Nase in den Rachen fortsetzen.

Eine eigenthümliche Mykose beobachtete endlich Klamann. Auf der gerötheten und geschwellten Schleimhaut des rechten hintern Gaumenbogens und der Uvula fand sich eine graugelbe aus Mycelien und Coccenhaufen bestehende Auflagerung; die gekörnten Pilzfäden hatten ein keulenförmiges Ende und waren in das Epithel hineingewuchert.

Dass nach E. Fränkel ein Theil der bei Typhösen vorkommenden Geschwüre im Rachen und Kehlkopf der mykotischen Epithelnekrose der massenhaft wuchernden normalen Mundhöhlen-Mikroorganismen seine Entstehung verdankt, wurde bereits auf Seite 113 erwähnt.

Blutungen.

Blutungen auf die Oberfläche und in das Gewebe der Rachenschleimhaut gehören zu den selteneren Vorkommnissen.

Freie Blutungen kommen am häufigsten nach Verletzungen, so besonders bei Kindern nach Zerreissungen des Gaumensegels durch in den Mund gehaltene Gegenstände oder Fremdkörper vor, ebenso nach chirurgischen Eingriffen, besonders bei der Tonsillotomie. Kleinere capilläre Blutungen treten äusserst häufig in Folge heftigen Hustens und Räusperns auf, zumal wenn sich die Schleimhaut im Zustande activer oder passiver Hyperämie befindet, wie bei Emphysem, Herzfehlern, Granulationen oder bei adenoiden Wucherungen, Ulcerationen

und Gangrän, doch sind wiederholt auch tödtliche Blutungen durch Arrosion der Carotis bei ulcerirender Pharynxsyphilis beobachtet worden. Scheinbar aus dem Rachen stammender Blutauswurf kommt gewöhnlich in Folge von Blutung aus dem hinteren Theile der Nase vor.

Ecchymosen und Sugillationen, Hämatome, sind nicht selten Begleiter acuter Anginen sowie der Diphtherie oder Variola; zu den selteneren Ursachen gehören Scorbut, Purpura rheumatica, Morb. macul. Werlhofii. Bei Bluterguss in die Uvula (Staphylhämatom), der durch Quetschungen, ungeschicktes Handhaben von Instrumenten, oder durch Schlucken grosser, fester Gegenstände entsteht, senkt sich das Blut nach unten und gibt so der Uvula eine keulenförmige Gestalt.

Die Prognose der Rachenblutung richtet sich nach Ursache und Heftigkeit; die Blutungen bei der Tonsillotomie wurden bereits besprochen. Durch submucöse Blutungen können Verengerungen des Rachens mit Schling- und Athembeschwerden sogar mit dem Ausgange in Gangrän zu Stande kommen.

Die Behandlung besteht bei geringfügigeren Hämorrhagien in Gurgelungen oder Inhalationen, Zerstäubungen von Eiswasser, 2 bis 3% Alaun-, Tannin- oder Liq. ferri-Lösungen. Cauterisation mit Lapis zeigt sich besonders bei blutenden Ulcerationen wirksam; bei profuseren Blutungen ist die Digitalcompression angezeigt oder das Aufdrücken von mit styptischen Flüssigkeiten imprägnirten Wattetampons, die unbekümmert um Schluck- und Würgebewegungen möglichst lange auf der blutenden Stelle fixirt werden müssen. Dass bei Carotidenverletzung die Blutung nur durch Unterbindung gestillt werden kann, wurde bereits erwähnt. Hämatome bedürfen in der Regel keiner besonderen Behandlung; verursachen sie durch ihre Grösse Beschwerden, dann muss der Inhalt derselben entleert werden.

Blutergüsse in das retropharyngeale Bindegewebe, Hämatoma retropharyngeale, wurden namentlich von Störk beobachtet.

Als Ursache liess sich Druck auf einen schon länger bestehenden Kropf nachweisen; durch zu enge Halsbinden wird offenbar nicht nur in der Schilddrüse selbst, sondern auch in den mit der Thyreoidea anastomosirenden Gefässen der Rachenwand eine Stauungshyperämie hervorgerufen, die zu Blutaustritt in das submucöse Gewebe führt. Die Erkrankung entsteht meist ganz plötzlich, öfters in wenigen Minuten, kann aber auch allmählich sich entwickeln.

Objectiv äussert sich das Hämatoma retropharyngeale durch das Vorhandensein einer mehr oder weniger grossen, teigigen, fluctuirenden Geschwulst, welche die Schleimhaut der hinteren Rachenwand emporwölbt. Die subjectiven Beschwerden bestehen in Behinderung des Schluckens, dumpfer, undeutlicher, klangloser Stimme, bei stärkeren Ergüssen in Respirationsbeschwerden.

Die Therapie kann nur eine operative sein; Störk öffnet mittelst Bistouri die Höhle, aus der manchmal helles, rothes Blut im Strahle hervorspritzt, so dass man glauben könnte, ein Aneurysma eröffnet zu haben; nach der Eröffnung empfehlen sich antiseptische Gargarismen und Inhalationen.

Fremdkörper und Concretionen.

Die Fremdkörper des Rachens sind wegen ihrer Häufigkeit von grossem praktischen Interesse. Am öftesten bleiben Fischgräten, scharfkantige Knochenstücke, Hühnerbeine, Borsten von Zahnbürsten, Strohhalme, Kornähren, Münzen, Nadeln, falsche Zähne und ganze Gebisse, Knöpfe, Obstkerne etc. im Rachen stecken.

Am seltensten gelangen sie in den Nasenrachenraum, wie in einem von Urbantschitsch mitgetheilten Falle, wo ein Haferrispenast durch die Tuba in's Mittelohr und von da in den äusseren Gehörgang gelangte.

Am häufigsten werden spitzige Gegenstände im Isthmus faucium und da wieder mit Vorliebe von den Mandeln aufgefangen. Fischgräten oder spitzige Knochenstücke, Borsten von Zahnbürsten, spiessen sich oft so tief ein, dass ein kaum sichtbares Stück hervorragt; sind dieselben sehr gross, so können sie sich quer über den Pharynx legen; ausser den Mandeln sind die seitlichen Rachenwände, besonders die Sinus pyriformes, sowie der Eingang in den Oesophagus die Orte, wo Fremdkörper zurückgehalten werden. Grössere rundliche Gegenstände bleiben meist hinter den Aryknorpeln oder zwischen Zunge und Epiglottis stecken.

Die Erscheinungen, welche Fremdkörper des Rachens hervorrufen, sind bedingt durch ihre Beschaffenheit, ihre Grösse und ihren Sitz. Spitzige Gegenstände verursachen durchwegs das Gefühl stechender Schmerzen beim Schlucken und Sprechen; sie haben Verletzung der Schleimhaut zur Folge mit reactiver Entzündung, Blutung, Oedem, Ulceration, Abscedirung und Fieber, und können durch Eröffnung eines Blutgefässes selbst tödtliche Blutungen verursachen. Grössere Fremdkörper, welche in der Pars laryngea stecken bleiben, erzeugen ausser Beschwerden beim Schlucken durch Oedem der Lig. aryepigl. auch noch Athemnoth oder können durch Aufdrücken des Kehldeckels auf den Aditus laryngis Suffocation erzeugen.

Fremdkörper können unglaublich lange Zeit im Rachen und Kehlkopf zurückgehalten werden, ohne besonders schwere Erscheinungen zu machen. In der Regel treibt die Angst den Kranken sofort zum Arzte, mit der Bitte, denselben baldmöglichst zu entfernen, was selbstverständlich nach Constatirung desselben das Rationellste ist.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig, doch darf man nicht vergessen, dass unter Umständen Fremdkörper namentlich solche in den unteren Abschnitten des Pharynx grosse Gefahren ja selbst den Tod zur Folge haben können.

Da bei der Diagnose und Behandlung der Fremdkörper sehr viele Kopflosigkeiten vorkommen, so soll das Wichtigste in Kürze erwähnt werden.

Kommt ein Kranker mit einem Fremdkörper im Halse zum Arzte, so lasse man sich kurz über die Beschaffenheit, Grösse und den muthmasslichen Sitz desselben unterrichten. Wenn auch das Localisationsgefühl im Rachen ein geringes ist, so wird in der Regel

doch die Seite, auf der der Fremdkörper steckt, richtig angegeben. Dann unterziehe man den Kranken eventuell nach Cocainisirung einer sorgfältigen Inspection der Rachenhöhle sowie der laryngoskopischen und rhinoskopischen Untersuchung. Gelingt es auf diese Weise nicht, den Fremdkörper sich zu Gesicht zu bringen, so kann derselbe, wie dies sehr oft der Fall ist, bereits den Rachen wieder verlassen haben, verschluckt oder ausgeräuspert worden sein; der Kranke empfindet eben wohl auch aus psychischen Gründen die Folgen der Verletzung unter Umständen noch sehr lange Zeit. Bevor man aber dieses Urtheil abgibt, wobei man niemals vergessen soll, dass zwei Fremdkörper hineingelangt sein können, von denen nur der eine bereits wieder entfernt, der andere aber noch gegenwärtig ist, versäume man auf keinen Fall, mit dem Finger alle Theile des Rachens auf das Genaueste zu palpiren und die Sinus pyriformes und den Oesophagus mit Steinsonden zu sondiren. Sehr oft gelingt es so, tief in die Mandeln und Schlundwände eingespiesste Fremdkörper zu entdecken und zu entfernen; das Gefühl gibt namentlich bei kleinen Fremdkörpern sicherere Anhaltspunkte als das Auge.

Die Entfernung spitziger, kantiger Gegenstände geschieht am einfachsten mittelst gekrümmter Kehlkopfzangen oder Pincetten; für Fremdkörper der Pars oralis genügt eine einfache längere Pincette oder Kornzange.

Rundliche Gegenstände, wie Glasperlen, Münzen, Knöpfe müssen, wenn sie im Sinus pyrif. liegen, zuweilen erst mit hakenförmig gekrümmten Sonden gelockert und in andere Lage gebracht werden, ehe sie mit Zangen etc. extrahirt werden können. Aeusserst schwierig ja oft unmöglich ist die Entfernung von Fischgräten, Nähnadeln und anderer spitzer Gegenstände in der Tiefe des Sinus pyriformis oder im Niveau des Ringknorpels und im Anfangstheil des Oesophagus, d. h. an allen jenen Theilen, an welche das Auge nicht hinzudringen vermag. Man hüte sich hier vor allzu energischen oder allzu lange fortgesetzten Extractionsversuchen.

Weiche Körper, besonders Speisetheile — Brod, Gemüse, Fleisch — welche im Anfangstheil des Oesophagus stecken blieben, werden am besten mit der Schlundsonde in den Magen befördert; harte, kantige Gegenstände ohne weiteres in den Schlund hinabzustossen, ist unverantwortlich; hier müssen unter allen Umständen zuerst biegbare Zangen oder Münzenfänger oder der Schirmprobang oder die Schwammsonde in Anwendung gebracht werden.

Zeigen sich bedrohliche Erstickungserscheinungen, dann versäume man nicht lange Zeit mit Extractionsversuchen, sondern schreite zur Tracheotomie. Nach Beseitigung der Lebensgefahr kann die Aufsuchung und Extraction des Fremdkörpers mit mehr Ruhe vorgenommen werden. Liegen keine bedrohlichen Erscheinungen vor, dann kann man mit der Extraction zuwarten, zumal sich Fremdkörper sehr oft ohne Kunsthilfe lockern und durch Räuspern und Gurgeln eliminirt werden. Spitze Fremdkörper, so namentlich Fischgräten oder Knochenstücke, welche wegen ihrer verborgenen Lage in dem untersten

Theile des Pharynx nicht extrahirt werden konnten, verursachen unter Zunahme von Schmerzen und Schluckbeschwerden Fieber und Abscedirung, durch welche sie gelockert und dann oft ohne Anstand weiter befördert werden. Expectoration von Blut und übelriechendem Eiter können dabei vorhanden sein aber auch fehlen. In den schlimmsten Fällen kommt es zu septischer Phlegmone oder durch Arrosion grösserer arterieller oder venöser Gefässe zu tödtlicher Blutung. Aeussersten Falles müssen die Fremdkörper mittelst Pharyngotomie oder Oesophagotomie entfernt werden.

Aehnliche Erscheinungen wie Fremdkörper: Drücken, Stechen, Beschwerden beim Schlingen, verursachen Concremente, welche sich in den Mandeln festsetzen. Nach häufigen Attaquen von follicularer Angina bleiben, wie bereits erwähnt, auf den theils hypertrophischen theils atrophischen Mandeln schüssel- und napfförmige Vertiefungen, Spalten und sackartige Höhlen zurück, in welchen sich Speisereste und Secrete ansammeln und verkalken. Am bekanntesten sind die Mandelpfröpfe, jene gelbgrünen, gelbweissen, beim Zerreiben höchst übelriechenden Bröckeln, welche von ängstlichen Personen als ausgehustete Lungentuberkel oder diphtheritische Membranen dem Arzte zur Untersuchung überbracht werden. Durch Kalkniederschläge verwandeln sich dieselben ebenso wie centrale Abscesse nach Eindickung des Eiters in Mandelsteine, welche die Grösse einer Erbse bis einer Wallnuss erreichen. Sie bestehen aus kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk und haben, wie man früher meinte, nichts mit gichtischen Ablagerungen zu thun. Ausser den obenerwähnten Beschwerden geben Secretansammlungen und Steine Anstoss zu häufigen Anginen und Hypertrophie und Abscessen der Mandeln.

Die Diagnose ist nur dann zu stellen, wenn zeitweise Stücke der beschriebenen Gebilde abgehen, oder wenn dieselben gesehen und durch das Gewebe hindurch gefühlt werden können.

Die Behandlung muss darauf gerichtet sein, die Höhlen und Oeffnungen, in welchen sich weichere Concremente und Speisetheile ansammeln, zu veröden. Man kann entweder durch Abtragen brückenartiger Stränge, sowie durch wiederholtes Einführen des Galvanokauters oder der Chromsäure in die Oeffnungen adhäsive Entzündungen und Obliteration erzeugen, oder durch Amputation der zerklüfteten Mandeln die Beschwerden auf einmal beseitigen.

Grössere Mandelsteine müssen mit der Zange oder löffelartigen Instrumenten herausgeschält werden; ist die Mandel hypertrophisch, dann empfiehlt sich die Amputation, welche hier sicherer mit dem Bistourie vorgenommen wird, da man mit demselben die Steine umgehen kann, was bei dem Tonsillotome nicht ohne Gefahr der Zertrümmerung des Ringmessers möglich ist.

Neubildungen und Geschwülste.

Neubildungen im Rachen nehmen in Bezug auf Häufigkeit eine untergeordnete Stelle ein.

Zu den Neubildungen des Nasenrachenraumes werden von Manchen die adenoiden Wucherungen gerechnet; wir haben dieselben als Hypertrophien eines normalen Gewebes betrachtet und wie die Cysten der Bursa pharyngea bereits früher besprochen. Die Polypen des Nasenrachenraumes werden gemeinsam mit den Neubildungen der Nase abgehandelt werden.

Sarcome und Carcinome, welche die Schädelbasis perforiren und in die Kiefer- und Nasenhöhle fortwachsen, sowie Gehirntumoren, welche durch das Keilbein in den Rachen vordringen, sind glücklicherweise sehr selten, ebenso Enchondrome oder Echinococcusblasen.

Sehr selten sind Neubildungen auf der Hinterwand der Pars oralis; von Schuchardt wurde hier bei einem 5monatlichen Kinde ein behaarter Polyp gesehen.

Ein Lieblingssitz der Neubildungen ist der weiche Gaumen; Schleimcysten, Fibrome, Lipome, Papillome, Angiome, besonders an der Uvula und den Gaumenbögen, gehören zu den relativ häufigsten Geschwülsten; zu den Seltenheiten hingegen gehören die Myxome und Adenome. Die letzteren auch als abgekapselte Drüsenepitheliome bekannt, sitzen constant seitlich von der Mittellinie der Vorderfläche des Gaumensegels; sie entwickeln sich aus submucösen Drüsen und gehen mit den benachbarten Geweben keine Verwachsungen ein. Ihre Oberfläche ist glatt oder leicht höckerig, ihre Consistenz derb elastisch, ihre Grösse schwankt zwischen der einer Haselnuss und eines Hühnereies; sie stecken in einer fibrösen Kapsel, welche ihre Ausschälung sehr erleichtert. Zu den grossen Seltenheiten gehören primäre Carcinome des weichen Gaumens; sie stellen unebene, knotige Verdickungen dar, welche zuweilen auf der Hinterfläche des Velum entspringen und so einige Zeit der Diagnose entgehen können. Im weiteren Verlauf bilden sich auf den Knoten Ulcerationen und Zerstörungen, während in der Nachbarschaft neue Knoten entstehen, durch deren Zerfall der ganze weiche Gaumen zerstört wird.

Nicht selten werden auch die Gaumenmandeln befallen, wie es scheint, mehr von bösartigen Neubildungen, Sarcomen, Cancroiden, Epithelialcarcinomen, doch kommen auch alle gutartigen Neoplasmen, Fibrome, Cysten, Echinococcus, Fibroenchondrome, Atherome vor.

Sehr selten sind die tieferen Abschnitte des Rachens Sitz von Geschwülsten. Noch jetzt gelten die Mittheilungen von Luschka und Sommerbrodt über Papillargeschwülste und die von Ehrendorfer über ein plexiformes Sarcom der Pars laryngea als Raritäten; Verfasser beobachtete einmal ein grosses gestieltes Fibrom auf der pharyngealen Seite des Lig. aryepigl.; ferner einen diffusen flachen Papillarkrebs der Hinterwand, welcher auf den Larynx übergriff und zuerst Abductoren- dann doppelseitige Recurrenslähmung zur Folge hatte; endlich sah Verfasser noch ein thalergrosses, flach

der Hinterwand gegenüber dem Kehlkopf aufsitzendes in Zerfall begriffenes Spindelzellensarcom.

Die Erscheinungen, welche Neubildungen des Rachens verursachen, sind bedingt durch ihren Sitz, ihre Grösse und Form. Kleinere Neubildungen am weichen Gaumen und den Tonsillen verlaufen fast stets symptomlos und werden meist zufällig entdeckt. Grössere Neubildungen verursachen Störungen der Sprache, Schwierigkeiten beim Schluckacte, Fremdkörpergefühl, und wenn sie die Epiglottisinnenfläche berühren, Hustenreiz, eventuell Respirationsbeschwerden. Maligne Tumoren des Velum oder der Mandeln machen Anfangs dieselben Erscheinungen wie der chronische Rachenkatarrh; wenn sie zerfallen, manchmal auch schon vorher, heftige in die Ohren ausstrahlende Schmerzen; sie bleiben selten localisirt, sondern greifen meist auf die Nachbarschaft, besonders die Nase ja selbst auf die Aussenfläche des Halses über. Am beträchtlichsten sind die Schmerzen und Störungen der Deglutition bei Neubildungen der Pars laryngea; zerfallende Carcinome erzeugen Foetor, profuse Secretion und Lymphdrüsenschwellungen von oft kolossaler Grösse und geben zu Blutungen Anlass, nebstdem stellt sich im weiteren Verlaufe Schwäche, Abmagerung und Kachexie ein.

Die Diagnose ist in der Regel leicht, zumal für den im Rhinoskopiren und Laryngoskopiren Geübten; schwer ist zuweilen die Bestimmung der Geschwulst in Bezug auf ihren histologischen Bau.

Zerfallende bösartige Neubildungen haben die grösste Aehnlichkeit mit syphilitischen und lupösen Geschwüren. Bei ihrem meist sehr frühzeitigen Zerfall fehlt der für Krebsgeschwüre charakteristische Befund: das Besetztsein der Ränder und des Grundes mit Geschwulsttheilen in Form von Knoten oder papillären Wucherungen. In zweifelhaften Fällen kann nur das Mikroskop oder der therapeutische Versuch entscheiden.

Die Prognose richtet sich nach dem Sitze, der Grösse und histologischen Beschaffenheit. Dass Sarcome und Epitheliome eine schlechte Prognose geben ist natürlich.

Die Behandlung kann nur eine operative sein. Kleine gestielte Neubildungen entfernt man mit der kalten Schlinge, der Scheere oder dem Kehlkopfringmesser, grössere und breitaufsitzende mit der galvanokaustischen Schlinge, flachaufsitzende mit dem scharfen Löffel und nachträglicher Aetzung mit Chromsäure etc.; sehr grosse Angiome mit der Elektrolyse. (Keimer.) Dass der mit der laryngoskopischen Technik Vertraute beträchtlich im Vortheile ist, ist selbstverständlich.

Bei bösartigen Neubildungen sind je nach Umfang und Sitz schwere chirurgische Eingriffe, Exstirpation des weichen Gaumens, Resection des Unterkiefers, seitliche Eröffnung des Pharynx, nothwendig; doch sind Recidiven nicht ausgeschlossen.

Zu den Geschwülsten des Rachens gehört auch das Emphysem und die retropharyngeale Struma.

Das Emphysem entsteht am häufigsten durch Verletzungen der Schleimhaut namentlich nach ungeschickter Katheterisirung der

Tuba. Es hat demgemäss auch seinen Hauptsitz im Nasenrachenraum und dessen nächster Umgebung. Es erstreckt sich von den Seitenwänden auf das Gaumensegel, die Uvula und Hinterwand der Pars oralis ja selbst bis zum Kehlkopfe herab, nicht selten auch auf die äussere Haut des Halses, des Gesichtes und Oberkörpers.

Die Erscheinungen bestehen in Schlingbeschwerden, Gefühl eines Fremdkörpers, Schwerathmigkeit. Objectiv äussert sich dasselbe durch die Anwesenheit durchsichtiger weissgelber Blasen, welche comprimirt ein knisterndes Geräusch geben. Meist bilden sich dieselben nach einigen Tagen spontan zurück, doch erscheint es bei besonderer Hochgradigkeit der Beschwerden angezeigt, die Blasen zu eröffnen, narkotische Gurgelwässer zu verordnen, oder mit Cocain zu pinseln und dem Kranken das Schneuzen zu verbieten.

Die Struma retropharyngea, auch accessoria, retrooesophagea genannt, entwickelt sich aus einem präformirten Hinterhorn der Schilddrüse, welches vom oberen manchmal auch unteren Pol der Seitenlappen nach hinten und innen in den retrovisceralen Spaltraum in der Höhe des Kehlkopfeinganges vordringt.

Da sich die Krankheit allmählich entwickelt, so können längere Zeit alle Erscheinungen fehlen. Nach und nach stellen sich nun Hindernisse beim Schlingen ein, indem festere Speisen und grössere Bissen schwer geschluckt oder wieder ausgewürgt werden, während kleinere sowie flüssige noch gut passiren, bis auch diese nicht mehr geschluckt werden können. Meist ist das Gefühl eines Fremdkörpers im Halse, starke Verschleimung und häufiges Bedürfniss zum Räuspern sowie weit hörbares Schnarchen und Rasseln im Schlafe, selten Schmerz vorhanden. Bei sehr blutreichen oder ulcerirten bösartigen Strumen können zeitweise heftige Blutungen auftreten, welche den Verdacht einer Lungenaffection erwecken. Mit dem weiteren Wachsthum der Geschwulst stellen sich Respirationsbeschwerden ein, die sich bei Körperbewegung oder gewissen Stellungen des Kopfes steigern. Nach Kaufmann treten zuweilen plötzliche Erstickungsanfälle auf, welche wahrscheinlich durch interstitielle Blutung und momentane Volumzunahme der Geschwulst bedingt sind. Durch Compression der V. jugulares entstehen Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Funkensehen und Cyanose des Gesichts, durch Druck auf die Kehlkopfnerven kann Heiserkeit, durch Druck auf die Ringknorpelplatte Lähmung der Glottisöffner entstehen. Sehr selten ist die retropharyngeale Struma maligner Natur. So beobachtete Verfasser einmal eine carcinomatöse Degeneration des retropharyngealen Theiles eines Kropfes, dessen mittlerer und linker Lappen völlig normal waren; die Kranke starb an ausgebreiteten Krebsmetastasen in beiden Lungen.

Die objective Untersuchung lässt im Spiegelbilde eine mehr oder weniger beträchtliche Hervorwölbung der hinteren und seitlichen Wand zuweilen eine fast völlige Ausfüllung des unteren Rachenabschnittes erkennen, die Geschwulst ist rund, zuweilen sehr gefässreich, von glatter kugeliger Oberfläche, der Larynx mehr oder weniger zur Seite gedrängt, die Lig. aryepigl. gegen das Larynxinnere

vorgewölbt, die Glottis verengt, ebenso der Eingang zu Trachea und Oesophagus. Die Palpation ergibt, dass die Geschwulst auf Druck unempfindlich und von der Consistenz der gewöhnlichen Struma ist, und sich beim Schlucken mit der aussen am Halse befindlichen Geschwulst hebt.

Nach Kaufmann ist das sicherste Zeichen, dass der Tumor durch den palpirenden Finger nur nach einer Seite verschiebbar oder vollständig aus dem Rachen verdrängbar ist, und aussen am Halse in der Höhe der Schildknorpelplatte zum Vorschein kommt.

Die Diagnose stützt sich auf den erwähnten Befund und auf den Umstand, dass die vom Periost der Wirbel oder dem prävertebralen Bindegewebe ausgehenden Geschwülste und Abscesse beim Schlucken nicht oder nur andeutungsweise in die Höhe steigen und sich nach beiden Seiten verschieben lassen. Ausserhalb jeglichen Zweifels liegt die Diagnose dann, wenn sich das Verbindungsstück des retropharyngealen Tumors mit der seitlichen Schilddrüsengeschwulst palpatorisch nachweisen lässt.

Die Prognose ist eine ungünstige; denn wenn auch die Beschwerden lange Zeit fehlen oder geringfügig sind, so treten doch meist im späteren Verlauf lebensbedrohliche Erscheinungen auf.

Die Behandlung ist eine palliative und eine radicale. Jedenfalls ist, vorausgesetzt dass die Beschwerden nicht schon sehr hochgradig sind, eine energische innerliche Jodcur zu versuchen; man kann mit derselben die von M. Schmidt vorgeschlagene Eisbehandlung mittelst des Leiter'schen Kühlapparates oder der bequemeren Eiscravatte combiniren. Bei hochgradigen Schlingbeschwerden muss die Ernährung mit der Schlundsonde geschehen, bei Dyspnoe die Tracheotomie ausgeführt werden. Um das Uebel radical zu heilen, schlug man parenchymatöse Jodinjectionen vom Munde aus vor; bei der niemals ausbleibenden reactiven Schwellung muss jedoch, namentlich bei schon bestehenden Respirationsbeschwerden, dringend vor denselben gewarnt werden, es könnte in wenigen Stunden Asphyxie auftreten. Dass selbst durch eine einfache Probepunction Athembeschwerden und durch Abscedirung Tod durch Pyämie eintreten können, beweist ein von Chiari mitgetheilter Fall. Da auch die Exstirpation der Geschwulst vom Rachen aus unthunlich und ungenügend erscheint, so bleibt nur die Exstirpation von aussen übrig. Nach Kaufmann wird dieselbe folgendermassen ausgeführt.

Durch einen Schnitt, welcher vom vorderen Rand des Kopfnickers die Haut, das Platysma und die Fascie durchtrennt, kommt man auf den M. omohyoideus, der entweder nur am Rande oder ganz getrennt wird; sodann wird die Art. thyreoid. sup. doppelt unterbunden und durchschnitten. Jetzt wird der Tumor vom Rachen aus vorgedrängt, die ihn noch überdeckende Fascie wird sammt seiner Kapsel soweit als möglich gespalten und die Ausschälung mit dem Finger vorgenommen, der noch übrigbleibende Stiel wird unterbunden und der seitliche Schilddrüsenlappen exstirpirt.

Nervenkrankheiten.

Bei dem ausserordentlichen Reichthum des Rachens an Nerven ist es nicht auffallend, dass Krankheiten derselben ganz gewöhnlich sind.

Wir beginnen, der Eintheilung der Nerven in sensible und motorische treu bleibend, mit den Sensibilitätsneurosen des Rachens.

Anästhesie der Rachenschleimhaut kann centralen und peripheren Ursprungs sein. Unter den centralen Störungen spielen Blutungen, Tumoren des Gehirns, encephalitische Herde, Sclerosen und Atrophien, Bulbärparalyse, Lateralsclerose, die Hauptrolle. Nebstdem kommt Anästhesie des Rachens auch vor nach epileptischen Anfällen, im asphyktischen Stadium der Cholera, namentlich aber bei Hysterie; Jurasz sah dieselbe einmal in Verbindung mit motorischer Lähmung nach croupöser Pneumonie. Unstreitig am häufigsten ist sie Nachkrankheit der Diphtherie. Ferner können gewisse Medicamente besonders Cocain, Morphium, Chloral, Bromkali, Carbolsäure, Menthol, bei localer und interner Application die Empfindlichkeit der Schleimhaut herabsetzen. Nach Fr. Seitz bleibt Anästhesie des Rachens manchmal nach Influenza zurück.

Die subjectiven Erscheinungen bestehen zuweilen in einem Gefühle von Pelzigsein im Halse, öfters in Verbindung mit Schmerzgefühlen (Anästhesia dolorosa). Meist fehlen jedoch alle Beschwerden.

Die Diagnose lässt sich nur durch die objective Untersuchung stellen. Bei halbseitiger Anästhesie ist die betreffende Rachenhälfte gegen mechanische, thermische oder chemische Reize unempfindlich, in der Regel sind auch die Reflexe aufgehoben oder herabgesetzt; bei Doppelseitigkeit der Erkrankung ist die Schleimhaut überall und vollständig empfindungslos. Sehr oft combinirt sich die diphtheritische Anästhesie mit halb- oder doppelseitiger Anästhesie und motorischer Lähmung des Kehlkopfes.

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache; bei diphtheritischer Grundlage ist, wenn auch der Larynx sensibel oder motorisch mitgelähmt ist, die künstliche Ernährung mittelst der Schlundsonde eventuell durch subcutane Nährinjectionen und ernährende Klystiere zur Verhütung der Speisepneumonie unerlässlich; leider scheitert dieselbe nicht nur zu oft an der Widerspänstigkeit und Unvernunft kleiner und grosser Patienten, sondern schützt auch nicht absolut vor der Gefahr. Ausserdem empfiehlt sich die locale Application der Elektricität, sowohl des constanten als inducirten Stromes mittelst der Ziemssen'schen Doppelelektrode. Die von Ziemssen in die Praxis eingeführten subcutanen Injectionen von Strychnin 0·001 bis 0·005 pro dosi wirken oft noch dann, wenn alle anderen Mittel im Stiche lassen.

Unter Hyperästhesie versteht man eine gesteigerte Reizbarkeit des Rachens, welche durch einen centralen oder peripheren

Reiz zu Stande kommt; durch einen solchen Reiz wird eine gesteigerte Empfindung hervorgerufen, die entweder als Schmerz wahrgenommen oder von Reflexerscheinungen so namentlich von Husten, Würgen, Erbrechen, explosivem Aufsteigen von Magengasen, begleitet wird. Die Hyperästhesie des Rachens ist eine ganz gewöhnliche Erscheinung, wie man sich täglich bei der laryngoskopischen oder rhinoskopischen Untersuchung überzeugen kann; sie ist oft so hochgradig, dass nicht nur die Berührung sondern schon die Annäherung eines Gegenstandes an den Rachen, ja schon das Oeffnen des Mundes und Herausstrecken der Zunge die heftigsten Reflexe hervorruft. Sie ist sehr häufig bei völlig Gesunden, ferner bei Fettleibigen, Trinkern, Rauchern, Bonvivants, nervösen Personen; ausserdem müssen örtliche Erkrankungen des Rachens, acute und chronische Katarrhe, allgemeine Hyperästhesie und psychische Erregungen, ganz besonders aber die Lungenphthise als ätiologische Momente erwähnt werden.

Die Affection ist einer radicalen Therapie sehr schwer zugänglich; palliativ empfiehlt sich am meisten das Cocain in 5—20% Lösung zur Pinselung, ferner das Menthol, Chloralhydrat, Bromkali, letzteres auch als Spray, ferner Gurgelungen mit kaltem Wasser, Tannin, Alaun.

Neuralgie des Rachens ist in ihrer reinen Form selten, doch hat Verfasser eine ziemliche Anzahl solcher Fälle gesehen; sie betrafen einigemale ganz gesunde Männer, hauptsächlich aber hysterische Frauen, welche bei völliger Intactheit der Schleimhaut über blitzartig durchschiessende von der hintern oder seitlichen Rachenwand in die Gaumenbögen, Zunge, Nasenrachenraum und Kehlkopf ausstrahlende, in Anfällen auftretende Schmerzen klagten. Fast immer liessen sich Schmerzpunkte an den Seitentheilen der Zunge, an den Mandeln oder aussen am Zungenbein oder am Kehlkopfe dem Eintritt des N. laryngeus superior entsprechend nachweisen.

Die häufigste aller Sensibilitätsstörungen ist die Parästhesie. Man versteht darunter abnorme Empfindungen, welche sich meist als Brennen, Drücken, Kitzeln, Kratzen, Trockenheit, Wundsein, namentlich aber als Gefühl der Anwesenheit eines Fremdkörpers im Rachen äussern. Hinsichtlich des letzteren begegnet man je nach dem Bildungsgrade und der Beschäftigung der Kranken den mannigfaltigsten Verschiedenheiten; bald ist es ein Knochenstück oder eine Gräte, ein Haar, eine Haut, eine Glasscherbe, bald eine Nadel, ein Stückchen hartes Brod, oder ein Sandkorn oder Staubtheile, die im Halse stecken sollen. Am häufigsten ist bei Hysterischen oder Nervösen beiderlei Geschlechtes das Gefühl eines auf- und absteigenden Gegenstandes (Globus hystericus), oder Klagen über brennende Schmerzen oder ein Gefühl eisiger Kälte während des Einathmens. Die meisten Kranken quälen unaufhörlich den Arzt, sie ja recht genau zu untersuchen, da er sicherlich etwas im Rachen finden würde, was er bisher übersehen, sie inspiciren tagtäglich ja stündlich ihren Rachen, oder betasten den Kehlkopf und werden durch das bei der Verschiebung desselben beim Schlucken auftretende Geräusch zur Verzweiflung gebracht.

Parästhesie ist die constante Begleiterin des chronischen Rachenkatarrhs, namentlich der Pharyngitis granulosa und lateralis hypertrophica, ebenso trifft man sie häufig nach spontaner oder künstlicher Entfernung von Fremdkörpern oder im Gefolge von äusserst geringfügigen Veränderungen der Schleimhaut. Nach Swain soll die häufigste Ursache des Globus hystericus die Hypertrophie der Zungenbalgdrüsen sein (vergleiche Seite 22). Reine von Schleimhauterkrankungen unabhängige Parästhesie ist am häufigsten bei Anämie, Chlorose, Phthise, Neurasthenie, Hypochondrie, in letzterem Falle, wie Verfasser mit Jurasz bestätigen kann, oft in Folge der Lectüre medicinischer Bücher oder der Furcht vor Diphtherie, Wiederausbruch geheilter alter Syphilis, Halsschwindsucht. Am stärksten werden jene Stände befallen, deren Beruf den ausgiebigen Gebrauch der Stimmorgane erfordert, ebenso uterinleidende Frauen, leicht erregbare Personen beiderlei Geschlechtes. Selten ist Parästhesie durch entzündliche Veränderungen der Nerven oder durch Gehirnkrankheiten so namentlich Bulbärparalyse bedingt.

Der Verlauf ist ein sehr chronischer; es gibt keine Affection, welche die Geduld des Patienten und Arztes härter auf die Probe stellte, als diese.

Die Behandlung der Parästhesie und Neuralgie soll zuerst eine causale sein; Rachenkatarrhe, Hypertrophien der Zungenbalgdrüsen sowie anderweitige selbst unscheinbare Localerkrankungen, Anämie, Chlorose, müssen beseitigt werden. Oefters gelingt es, Hypochonder und Furchtsame durch vernünftige Belehrung oder Wegnahme der jetzt massenhaft circulirenden populär-medicinischen Schundliteratur gründlich und dauernd zu heilen. Bei allgemeiner Nervosität oder bei Hysterie empfiehlt sich der innerliche Gebrauch der Nervina, wenn dieselben auch meist nur vorübergehende Erleichterung gewähren, so besonders des Bromkali 3·0—5·0 pro die, ferner des Zinc. valer. und des Arseniks; Roth empfiehlt gegen Globus hyster. 4mal täglich 20 Tropfen von Tinct. rad. Pyrethri. Gute Erfolge sieht man zuweilen von leichten hydropathischen Curen, Abreibungen, Waschungen, lauwarmen Bädern mit kalten Uebergiessungen, Douchen-, Salz- oder Seebädern. Jedenfalls ist auch ein Versuch mit der Galvanisation angezeigt; man legt den positiven Pol an den weichen Gaumen oder die Hinterwand, den negativen an die Haut des Halses in die Gegend des Zungenbeins, des Laryngeus superior oder auf den Schmerzpunkt; Andere empfehlen das Anlegen der Elektroden in umgekehrter Weise. Vor der inneren oder subcutanen Anwendung der Narcotica muss dringend gewarnt werden, zumal dieselben fast immer im Stiche lassen und man obendrein noch Gefahr läuft, die Kranken zu Morphinisten zu machen. Dagegen ist ein Versuch mit Cocainbepinselungen gerechtfertigt; wenn auch durch Cocain selbst wieder eine künstliche Parästhesie erzeugt wird, welche den Kranken zuweilen weit unangenehmer erscheint als die originäre, so können doch nicht selten durch das Cocain die abnormen Sensationen definitiv beseitigt werden. Auch Brunnen- und Badecuren, so namentlich solche in Ems, Gleichenberg,

Karlsbad, Vichy, Kissingen, Marienbad, Schwalbach, sind zuweilen von gutem Erfolge.

Als secretorische Neurose möchte Verfasser einen Zustand bezeichnen, der äusserst häufig vorkommt und darin besteht, dass Individuen mit völlig normalen Schleimhäuten über vermehrte Schleimsecretion und Schleimansammlung im Rachen, Nasenrachenraum oder Kehlkopf klagen. Objectiv lässt sich zuweilen, wenn auch nicht constant, eine geringere oder grössere Menge gewöhnlichen schaumigen Schleimspeichels constatiren.

Die Therapie ist in der Regel völlig erfolglos und verschwindet die Affection zuweilen spontan nach verschieden langem Bestande oder nach der Ermahnung an die Kranken, sich aus dieser Erscheinung nichts zu machen, da sie völlig ungefährlich sei.

Als vasomotorische Neurose ist die bei einzelnen weiblichen Personen regelmässig zur Zeit der Menses auftretende und mit allen subjectiven und objectiven Erscheinungen der katarrhalischen Angina verlaufende Entzündung der Tonsillen und deren Umgebung aufzufassen (Angina vasomotoria, sympathetica). Verfasser sah dieselbe auch alterniren mit Bronchialasthma, Hemicranie und Cardialgie.

Zu den vasomotorischen Neurosen gehört ferner die von Rossbach beobachtete plötzlich auftretende, einige Minuten bis eine halbe Stunde dauernde und dann einer normalen Färbung Platz machende Röthung und Injection der Rachenschleimhaut. Die betreffenden Personen litten an ausgesprochener Hyperästhesie des Schlundes; wenn auch ein unmittelbarer Zusammenhang der letzteren mit der stärkeren Injection der Schleimhaut nicht nachgewiesen werden konnte, so glaubt Rossbach doch, dass zwischen beiden Zuständen insoferne ein Zusammenhang besteht, als die sensiblen wie die vasomotorischen Halsnerven und deren Centren in gleicher Weise ausserordentlich leicht erregbar waren.

Fast ebenso häufig wie die Störungen der Sensibilität sind die der Motilität.

Krämpfe der Constrictoren gehören zu den selteneren Erkrankungen. Manchmal kommen sie im Verlaufe des chronischen Rachenkatarrhs oder bei Helminthiasis vor, ferner bei Kranken, welche an Dyspepsie oder Magendarmaffectionen leiden, ferner bei Hysterischen, Hypochondern, Onanisten oder Solchen, welche glauben, von einem wüthenden Hunde gebissen worden zu sein. Bei den verschiedenen Formen des Tetanus sind sie ziemlich häufig, bei Hundswuth fehlen sie niemals, und werden hier die Anfälle schon durch den blossen Anblick des zu Geniessenden oder den Gedanken an eine Schluckbewegung hervorgerufen. Selten sind Schluckkrämpfe Folgen von Gehirnkrankheiten, so besonders von Reizzuständen, Hyperämien und Tumoren des Gehirns und seiner Häute. Am häufigsten sind sie tonische, namentlich bei Hysterischen (Dysphagia hysterica), auch wird in der Regel die Muskulatur des Oesophagus mitergriffen (Oesophagismus).

Durch jeden Krampf der Schlingmuskeln wird das Schlucken resp. die Weiterbeförderung der Speisen mehr oder weniger behindert. Bei der Dysphagia hysterica wird das Geschluckte entweder plötzlich unter schmerzhaften drückenden Gefühlen im Halse oder hinter dem Brustbein festgehalten und dann ohne weitere Behinderung hinabgeschluckt, oder unter dem Gefühle der Erstickung mit Würgen, Erbrechen, Explosion von Magengasen, wieder herausgeschleudert.

Sehr selten sind Krämpfe der Muskeln des weichen Gaumens.

Bei dem tonischen Krampf wird das Velum fest an die hintere Rachenwand angepresst, wobei die Gaumenbögen entweder senkrecht in die Höhe gezogen werden oder gegen die Mittellinie vorspringen; zuweilen wird auch der Kehlkopf und der Zungenrücken für einige Minuten höhergestellt und das Gesicht von Zuckungen befallen; durch die Abhebung der Tubenwände von einander entsteht Verstärkung der eigenen Stimme, Autophonie. Bei dem klonischen Krampfe betheiligen sich entweder alle oder nur einzelne Muskeln des Velum, wie es scheint mit Vorliebe der Levator und Tensor veli palatini oder der Azygos uvulae. Der weiche Gaumen wird ruckweise je nach der Stärke der Anfälle 20—140mal in der Minute nach oben gezogen und an die hintere Rachenwand angestossen, wobei ein eigenthümliches knackendes oder knisterndes Geräusch entsteht, das dem wechselweisen Oeffnen und Verschliessen der schleimbedeckten Tubenwände seine Entstehung verdankt. Nicht selten lässt sich ein mit dem Heben des Velum isochrones und rythmisches Vorwölben und Einsinken des Trommelfelles constatiren (Krampf des Tensor tympani).

Aetiologisch kommen Neuralgien des Trigeminus in Folge von Erkrankung seiner Wurzeln (Neurome, Neurogliome des Ganglion Gasseri) oder periphere Reizung seiner Aeste durch Tumoren oder Caries des Siebbeins (Schech), Rhinitis hypertrophica (Seifert), ferner Reizzustände im Bereiche des Accessorius, Glossopharyngeus und Facialis, sowie neuropathische Disposition, Herderkrankungen des Gehirns etc. in Betracht.

Die Diagnose der verschiedenen Krampfformen ist nicht immer leicht, namentlich kann die Dysphagia hysterica zu mannigfaltigen Verwechselungen Anlass geben. Von der Lähmung der Rachenmuskeln und des Oesophagus unterscheidet sie sich hauptsächlich durch die Intermittenz; die Kranken schlingen manchmal ganz gut, während sie im nächsten Augenblicke Nichts hinunterbringen; die Schlingbeschwerden sind bei Lähmungszuständen meist geringer; während ferner bei Lähmungen die Sondirung sehr leicht von Statten geht, gelingt sie während eines Krampfes sehr schwer oder gar nicht. Von materiellen Verengerungen des Pharynx oder Oesophagus, namentlich vom Carcinom, unterscheidet sich der Krampf dadurch, dass das Carcinom dem Eindringen der Sonde jedesmal und zwar mit Zunahme der Krankheit ein stärkeres Hinderniss bereitet — bei eingetretenem Zerfall wird das Sondiren hingegen öfters wieder leichter — während beim Krampf in der anfallfreien Zeit die Passage stets frei befunden wird.

Die Prognose der Krämpfe richtet sich nach ihrer Aetiologie; absolut infaust ist sie bei Lyssa, nahezu infaust bei Tetanus sowie bei den organischen Gehirnerkrankungen; günstig ist sie bei Hypochondrie, Hysterie, Neurasthenie, bei Erkrankungen der Nase oder des Rachens, bei manchen Formen von Trigeminusneuralgie.

Die Behandlung muss sich zuerst nach der Ursache richten. Sehr wichtig ist die Herabsetzung der Reflexerregbarkeit durch warme Bäder, Morphiuminjectionen, Chloral, Bromkali, Valeriana, Asa foetida; die Verbesserung der Constitution durch Eisen, Kaltwasser- und Luftcuren, die Behandlung localer Veränderungen etc. Gegen Dysphagia hysterica erweist sich meist die methodische Einführung der Schlundsonde am wirksamsten; auch ist der galvanische Strom zu versuchen. Bei grosser Intensität der Krämpfe soll nur breiige oder dickflüssige sowie lauwarme Nahrung genossen eventuell mit der Schlundsonde applicirt werden.

Klinisch am wichtigsten sind die Lähmungen der Rachenmuskeln.

Sie sind meist centralen Ursprunges; acute und chronische Krankheiten des Gehirns, so besonders jene, welche zu Compression des N. vagus, accessorius, glossopharyngeus führen, sowie degenerativ-atrophische Processe des Gehirns und der Medulla besonders Bulbärparalyse, Tabes, progressive Muskelatrophie, sind die häufigsten Ursachen; ebenso hat auch die Facialparalyse sowie Bleiintoxication öfters Motilitätsstörungen des weichen Gaumens zur Folge. Unter den peripheren Ursachen nimmt die Diphtherie die erste Stelle ein, dann schliessen sich örtliche Erkrankungen an, welche durch seröse Durchtränkung und Entzündung sowie Schwielenbildung oder Degeneration der Muskeln (Myositis syphilitica) Functionsstörungen hervorrufen und von den eigentlichen Lähmungen getrennt werden müssen. Sehr oft sind sensible und motorische Lähmungen gleichzeitig vorhanden.

Die Lähmung des weichen Gaumens ist die häufigste, sie ist einseitig und doppelseitig, unvollständig oder vollständig.

Bei einseitiger Erkrankung steht das Zäpfchen nach der gesunden Seite hin, der Gaumenbogen der gelähmten Seite steht meist tiefer und ist abnorm gross und breit, jener der gesunden steht höher und ist eng und klein; bei der Phonation tritt deutliche Verziehung des Velum nach der gesunden Seite hin ein. Bei Lähmung der Uvula, einer häufigen Begleiterscheinung acuter Rachen- und Kehlkopfkatarrhe und Stimmbandlähmungen, weicht dieselbe gleichfalls nach der gesunden Seite hin ab. Bei doppelseitiger Lähmung des Velum hängt die Uvula schlaff herab und zeigt keine Spur von activer Bewegung, während sie von dem Respirationsstrom wie ein schlaffer Vorhang vor- und rückwärts getrieben wird. Während der Phonation macht sich bei incompleter oder partieller Lähmung ein langsameres und trägeres Hinaufsteigen des Velum sowie eine mangelhafte Annäherung desselben an die Hinterwand bemerkbar, bei completer Paralyse besteht absolute Unbeweglichkeit.

Die Beschwerden bei unvollständiger Lähmung des Velum beschränken sich nur auf die Stimme, welche nasal klingt; zuweilen ist nur die Bildung der Nasenlaute unmöglich oder erschwert.

Auffallend sind die Störungen bei completer doppelseitiger Gaumensegellähmung. Die Sprache ist in höchstem Grade nasal, bei gewissen Worten nahezu unverständlich; am ausgesprochensten ist die Unverständlichkeit dann, wenn gleichzeitig wie bei Bulbärparalyse, auch Zungen- und Lippen- oder Kehlkopflähmung besteht. Dass bei der Unmöglichkeit, den Nasenrachenraum von der Mundhöhle abzuschliessen, flüssige Ingesta durch die Nase herausgeschleudert werden, ist leicht zu begreifen.

Lähmung der Constrictoren mit oder ohne Betheiligung des Velum und des Oesophagus wird meist in Folge von Diphtherie und Bulbärparalyse beobachtet; auch kann die progressive Muskelatrophie zuerst die Schlundmuskeln ergreifen. Beschränkt sich die Lähmung auf die Constrictoren, so äussert sich dieselbe erst im Moment des Schluckens. Festere Bissen passiren zwar den Zungenrücken, bleiben aber auf der Zungenwurzel und in den Zungenkehldeckelgruben liegen und müssen, wenn ihre Weiterbeförderung nicht gelingt, der entstehenden Respirationsbeschwerden wegen mit dem Finger entfernt werden. Flüssigkeiten gerathen leicht in den Kehlkopf und erzeugen dort Husten und Erstickungsgefühle. Bei halbseitiger Lähmung sind die Kranken nicht im Stande, auf der gelähmten Seite herabrückende Ingesta zu schlucken; ist der Constrictor pharyng. superior allein gelähmt, so kann, da derselbe mit dem Gaumensegel den Abschluss des Nasenrachenraums bewirkt, das Genossene durch die Nase heraustreten.

Die Diagnose der Lähmungen der Rachenmuskeln ist zwar im Hinblick auf die beschriebenen subjectiven und objectiven Erscheinungen eine sehr leichte, wird aber nach des Verfassers Erfahrung sehr häufig selbst von Geübteren übersehen; namentlich geben die incompleten Lähmungen wegen der Veränderung der Stimme häufig zu Verdacht auf Nasenpolypen oder sonstige Nasenrachenaffectionen Anlass. Die Diagnose der Lähmung der einzelnen Muskeln des Velum, wie sie Duchenne zuerst versuchte, ist zur Zeit noch nicht mit Sicherheit möglich.

Die Behandlung der Schlinglähmung muss vorzugsweise eine elektrische sein. Am besten wird die eine Elektrode auf die Halswirbelsäule, die andere innen im Rachen auf die gelähmten Muskeln aufgesetzt. Ueber passende Ernährung eventuell mit der Schlundsonde, Bade- und Luftcuren etc. wurde das Nähere bereits auf Seite 176 mitgetheilt.

III. Abtheilung.

Die Krankheiten der Nase.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen.

Die Nasenhöhle stellt eine durch die Stellung der beiden Oberkiefer zu einander bedingte vorne und hinten weit geöffnete Aushöhlung dar, welche durch eine dünne Scheidewand in zwei Hälften getrennt wird. Der hintere Abschnitt ist allseitig von Knochen umgeben, während der vordere Theil, die äussere Nase, aus Knochen und gefässlosen Knorpelstücken besteht.

Die äussere Nase hat zur Grundlage mehrere hyaline Knorpel, welche unter sich und mit der Apertura pyriformis durch starkes Bindegewebe vereinigt und so gestellt sind, dass bei Einwirkung der Muskeln auf dieselben die Nasenlöcher verengert und erweitert werden können. Mit dem Knorpel der Scheidewand, welcher die viereckige Lücke zwischen dem Pflugscharbein und der Lamina perpendicularis des Siebbeins ausfüllt, hängen die dreieckigen Knorpel zusammen. Dieselben stellen nach Rüdinger vordere umgebogene Lamellen des Scheidewandknorpels dar und verhalten sich zu den unten liegenden Knorpeln der Nasenflügel derart, dass letztere einen weiten Bogen bilden und über die oberen geschoben werden können. Die beiden Knorpel der Nasenflügel sind vorne und innen stark umgerollt, so dass man in der Furche zwischen beiden das untere Ende des Scheidewandknorpels fühlen kann. In dem Winkel zwischen Cartil. alar. inf. und Cartil. triangul. liegen die Cartil. sesamoideae, einige kleine Knorpel, welche in dichte Fasermassen eingebettet sind.

Die äussere Nase erhält ihre Stütze durch die Nasenbeine, zwei länglich-viereckige in der Mitte aneinanderstossende Knochen, welche den convexen Rücken und die Wurzel der Nase bilden. An ihrer Vereinigungsstelle legt sich rückwärts oben die senkrechte Siebbeinplatte und abwärts der Knorpel der Scheidewand an; auch die Proc. frontal. der Oberkiefer haben Antheil an der Bildung der Nase. Ihre inneren Flächen sowohl wie auch jene der Nasenbeine und deren Knorpel stellen die von Schleimhaut überkleidete vordere obere Wand der Nasenhöhle dar.

Die Haut der Nase zeichnet sich durch ihren grossen Reichthum an Talgdrüsen aus, deren zurückgehaltener Inhalt die bekannten Comedonen bildet; sie setzt sich in das Innere der Nase noch eine Strecke weit fort meist bis zu dem vorderen Ende der unteren Muschel; der

Aditus narium ist ringsum namentlich bei Männern mit äusserst zahlreichen kurzen dicken Haaren, Vibices oder Vibrissae genannt, besetzt.

Die Muskeln, welche die Nasenlöcher erweitern und verengern, sind der Musc. levator alae nasi, depressor alae nasi und Levat. alae nasi propr. und der M. apicis.

Die Arterien der äusseren Nase stammen aus den Aesten der Art. facialis; die Art. dorsal. nasi, die Maxillar. externa und Zweige aus der Ophthalmica versorgen die äussere Nase. Zahlreicher sind die Venen. Sie vereinigen sich mit der Vena facial. ant.; nach Rüdinger liegt symmetrisch am Eingang in die Nasenhöhle tief unter der Haut ein Venenplexus, in welchen das Blut der vorderen Abtheilung der Nasenhöhle seinen Abfluss hat. Die Muskeln der Nase werden vom Facialis innervirt, die Sensibilität der Haut wird durch den Nerv. infraorbit., die der Haut der Nasenspitze durch den Nasenast des ersten Astes des Trigeminus vermittelt.

An der Bildung der Nasenhöhlen nehmen verschiedene Knochen Antheil.

Die obere Wand, das Nasendach, wird vorne gebildet von den beiden Nasenbeinen, in der Mitte von der Siebbeinplatte, hinten von der vorderen Wand der Keilbeinhöhle. Die untere Wand, der Nasenboden, wird gebildet vom Gaumenfortsatz des Oberkiefers und der horizontalen Platte des Gaumenbeins. Der Boden der Nase ist glatt und etwas nach hinten abschüssig. Die innere Wand stellt das Septum vor; sein knöcherner Theil wird vom Pflugscharbein gebildet, von der verticalen Platte des Siebbeins, von der Crista palatina und Crista nasalis anter.; der knorpelige Theil von der Cartilago septi, welcher am häufigsten Formveränderungen besonders Verbiegungen und Auswüchse zeigt. Die äussere Wand ist die complicirteste. Sie wird gebildet vom Oberkieferknochen, der Pars perpendicularis des Gaumenbeins und den flügelförmigen Fortsätzen des Keilbeins. Zuckerkandl unterscheidet eine obere bis zum Ansatz der unteren Muschel herabreichende und eine untere, von der unteren Muschel bis zum Nasenboden sich erstreckende Partie. Die obere Partie ist hinter dem Proc. frontalis des Oberkiefers mit einer grossen unregelmässigen Lücke versehen, deren theilweise Deckung das Gaumenbein, der Proc. pterygoid. und der Proc. ethmoid., die untere Muschel sowie der Proc. uncinatus des Siebbeins übernehmen. Von da bis an die Schädelbasis bilden die Lamina papyracea ossis ethmoid. und das Os lacrymale die äussere Wand. In der äusseren Wand liegen mehrere an Zahl, Form und Grösse verschiedene Lücken, welche von Schleimhaut überzogen sind; die grösste, eine 2 Centimeter lange halbmondförmige Oeffnung, heisst Hiatus semilunaris oder Bulla ethmoidalis, und führt in eine trichterförmige Höhle, das Infundibulum, welches in seinem vorderen und oberen Theile mit den Sin. frontal. und in seinem unteren und hinteren Theile mittelst des Ostium maxillare mit dem Sinus maxillaris in Verbindung steht.

Die wichtigsten Gebilde der seitlichen Nasenwand sind die Nasenmuscheln.

Die grösste, die untere Muschel (Fig. 9 UM), stellt einen selbstständigen dünnen, an der Innenfläche des Oberkiefers angehängten Gesichtsknochen vor, dessen unterer Rand frei in die Nasenhöhle hineinragt. Ihr vorderes Ende ist weniger gewölbt als ihre mittlere Partie, während ihr hinteres Ende spitz zuläuft; sie ist sehr verschieden gekrümmt, zuweilen mit einer Schleimhautfurche oder mit Einsenkungen und Einschnitten versehen. Der zwischen unterer Muschel und Septum einerseits und dem Nasenboden andererseits freibleibende Raum ist der untere Nasengang (Fig. 9 UN), dessen Grösse hauptsächlich von der Configuration der unteren Muschel abhängt; durch



Fig. 9. Ansicht der rechten Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes.

S.	Stirnbein mit Stirnhöhle.	ON.	Oberer Nasengang.
NB.	Nasenbein.	MN.	Mittlerer Nasengang.
K.	Keilbeinhöhle.	UN.	Unterer Nasengang.
HG.	Harter Gaumen.	AG.	Adenoides Gewebe.
WG.	Weicher Gaumen.	RGr.	Rosenmüller'sche Grube.
HWS.	Halswirbelsäule.	Tm.	Tubenmündung.
OM.	Obere Muschel.	Tw.	Tubenwulst.
MM.	Mittlere Muschel.	Psph.	Plica salpingopharyngea.
UM.	Untere Muschel.		

denselben werden alle in der Nase und im Nasenrachenraum zur Verwendung kommenden Instrumente eingeführt. Unter dem Dache der unteren Muschel befindet sich nach auswärts vorne eine kleine ovale Oeffnung, der Ausführungsgang des Thränennasencanals. Die mittlere Muschel (Fig. 9 MM) ist ein Theil des Siebbeins und liegt nicht nur höher, sondern auch weiter nach hinten als die untere; sie ragt mit ihrem vorderen Ende 10—12 Millimeter meist frei in die Nasenhöhle herein. Ihr unterer abgerundeter Rand bildet mit dem vorderen Rand

einen mehr oder weniger stumpfen Winkel, im mittleren Theile ist sie häufig stark eingerollt und endet nach rückwärts gleichfalls mehr zugespitzt. Der von ihrem unteren Rande bis zur unteren Muschel herabreichende freie Raum ist der mittlere Nasengang (MN); die zwischen ihr und Septum liegende enge Spalte wird Rima olfactoria genannt, welche in ihrer Schleimhaut die Endigungen des Nerv. olfactorius enthält. Die Riechspalte wird zuweilen durch blasige Auftreibungen oder Verkrümmungen der mittleren Muschel oder durch Deviationen des Septum ganz verschlossen. Im mittleren Nasengange liegen die Communicationsöffnungen für den Sinus maxillaris und frontalis. Die kleinste der Nasenmuscheln ist die obere (OM); sie gehört gleichfalls dem Siebbein an, ist noch viel kürzer und schwächer eingerollt, als die mittlere und differenzirt sich von der letzteren nur im mittleren und hinteren Drittel, vorne fliessen beide Muscheln zusammen; theilt sich die obere Muschel, dann kommt noch eine oberste oder vierte Nasenmuschel zu Stande, die nach Zuckerkandl bei Neugeborenen constant ist. Der zwischen mittlerer und oberer Muschel übrig bleibende Raum ist der obere Nasengang (ON); in ihm münden die Siebbeinzellen mit mehreren Oeffnungen, zwischen dem hinteren Ende der mittleren und oberen Muschel befindet sich das Foramen sphenopalatinum, über dem hinteren Ende der oberen Muschel die Eingangsöffnung in die Keilbeinhöhle.

Klinischerseits nimmt die Schleimhaut der Nasenhöhle speciell der zum Riechen bestimmte obere Theil derselben, die Riechhaut, oder Schneider'sche Membran, unser Hauptinteresse in Anspruch. Die vorne mit der Gesichtshaut und nach hinten mit der Schleimhaut des Rachens zusammenhängende Schleimhaut der Nase überzieht das Septum und die Muscheln sowie alle Buchten gleichmässig und liegt namentlich an den Muscheln ihrer Unterlage sehr straff an; sie steht mit dem Periost in so innigem Zusammenhang, dass beide nicht an allen Stellen scharf von einander abgegrenzt werden können. Die Schleimhaut trägt in ihrem oberen Theile, der Regio olfactoria, flimmerndes Cylinderepithel, der untere Theil, die Regio respiratoria, ist mit Pflasterepithel bekleidet. Besonders reich ist die Nasenschleimhaut an Nerven, Blutgefässen und Drüsen.

Die Nerven der Nasenhöhle dienen theils der Sensibilität, theils der Secretion, theils dem Geruche. Die sensibeln Nerven stammen grösstentheils aus dem ersten und zweiten Aste des Trigeminus (N. ethmoidalis, N. sphenopalatinus, N. Vidianus, N. nasopalatinus, N. palat. ant.) und besitzen in hohem Grade die Fähigkeit, die verschiedensten physiologischen und pathologischen Reflexe auszulösen und auf andere Nervengebiete zu übertragen.

Die secretorischen Nerven stammen nach Aschenbrandt aus dem N. sphenopalatinus; die trophischen Fasern für die Schleimhaut liegen in den meisten Aesten des Trigeminus.

Ausschliesslich dem Geruche dient der Nerv. olfactorius. Er verläuft in einer Furche der unteren Fläche des Vorderlappens mit dem der andern Seite etwas convergirend nach vorne und

schwillt auf der Lamina cribrosa des Siebbeins zu einem länglich-runden Kolben, dem Bulbus olfactorius an, von dessen unterer Fläche zwei Reihen dünner Fäden abgehen, welche durch die Löcher der Lamina cribrosa in die Nasenhöhle treten. Hier bilden sie Netze, welche an dem Septum und der inneren Fläche der beiden Siebbeinmuscheln sich nach abwärts erstrecken und pinselartig gruppirte Fäden an die Schleimhaut schicken. Diese Fäden gehen in die Riechzellen über, welche aus länglich-runden Zellkörpern mit deutlichen Kernen bestehen, und in feine stabförmige Fortsätze enden.

Wie an Nerven so ist die Nasenschleimhaut auch an Blutgefässen sehr reich. Je blutreicher eine Partie ist, um so dicker erscheint sie auch. Während die Schleimhaut der Regio olfactoria dünn und blutarm ist, erreicht jene der Pars respiratoria namentlich an der unteren und mittleren Muschel, so besonders an den vorderen und hinteren Enden der unteren Muschel, ein sehr beträchtliches Volumen. Hier liegt über dem Knochen das cavernöse Schwellgewebe, dessen Balkengerüste aus parallelen scharf contourirten Bindegewebsfasern mit Bindegewebskörperchen und zahlreichen elastischen und organischen Muskelfasern besteht. Zwischen dem Balkengerüste liegen äusserst zahlreiche Gefässräume, Lacunae und venöse Blutgefässe, welche durch unzählige kleine Oeffnungen in den Knochen eindringen. Nach Zuckerkandl hat das Schwellgewebe die Function, die Nasenspalte regulationsfähig zu erhalten und jede abnorme Erweiterung derselben zu verhindern; der grosse Reichthum des Schwellnetzes an Blutgefässen und die Dichtigkeit ihrer Anlage kommt ferner auch der Wärmeabgabe an die durchstreichende Luft sowie der Feuchterhaltung der Schleimhaut zugute. Das Blut der Schwellorgane fliesst an der periostalen Seite der Schleimhaut durch zahlreiche Abzugscanäle nach verschiedenen Richtungen gegen das Gesicht, den Gaumen, die Flügelgaumengrube und den Thränennasengang. Von grosser klinischer Bedeutung ist die Thatsache, dass das Schwellgewebe durch die verschiedensten selbst in entfernten Organen ausgelösten Reize plötzlich an Volumen zu- und abnehmen kann; es entstehen so oft momentan rothe, kugelige die Nase obstruirende Anschwellungen, die nach einiger Zeit wieder spurlos verschwinden (vergl. das Capitel Reflexneurosen). Das An- und Abschwellen des cavernösen Gewebes wird durch den Trigeminus namentlich das Ganglion sphenopalatinum vermittelt.

Die Venen der Nasenhöhle begleiten die Arterien, sind aber zahlreicher und grösser und communiciren mit der V. facialis, V. ophthalmica; ein Theil derselben geht durch die Siebbeinplatte und das Foramen coecum in den Sin. longitudin. und coronarius über.

Die Arterien gelangen von mehreren Seiten zur Nasenschleimhaut. Das Hauptgefäss, die Art. sphenopalatina, mit der aus ihr hervorgehenden Art. nasal. post. und septi nar. post. stammt aus der A. pterygopalatina; die A. ethmoidalis ant. und post. aus der A. ophthalm. und die A. septi nar. ant. und post. aus der A. maxillaris ext. Sie bilden zahlreiche Anastomosen und gehen an der unteren Muschel

in das cavernöse Gewebe über, in welchem jedoch die venösen Gefässe überwiegen.

Die Lymphgefässe der Nase vereinigen sich nach E. Simon in einem Hauptstamme, welcher zwischen dem vorderen Ende der Tuben und dem hinteren Ende der Muscheln verläuft. Hier bilden sie ein Netz, aus welchem zwei bis drei Stämme entspringen; diese verlaufen nach hinten und aussen zwischen dem Musc. levator und tensi veli palatini, nach deren Durchbohrung der eine Zweig an der äusseren Rachenwand zwischen Carotis int. und Musc. stylopharyngeus in eine vor der Wirbelsäule gelegene Lymphdrüse übergeht; der zweite Zweig durchbohrt den Biventer, geht nach aussen vom Nerv. lingualis und theilt sich dann in zwei Aeste, welche in zwei unter dem Kopfnicker gelegene Lymphdrüsen münden.

Nach Axel Key und Rezius communiciren die Lymphbahnen der Nase mit dem Subduralraum und die des Nasenrachenraumes mit den von der Dura mater und Arachnoidea gebildeten Scheiden des N. olfactorius.

Die Zahl der über die Nasenschleimhaut zerstreuten Drüsen ist eine ungeheure. Nach Heidenhain besitzt die Nase keine eigentlichen Schleimdrüsen, sondern nur Drüsen, welche ein wässeriges Secret erzeugen, sogenannte Glandulae serosae, während die Schleimbereitung durch eine schleimige Metamorphose des Epithels vor sich gehen soll. Die Drüsen der Regio olfactoria, die Bowman'schen Drüsen, werden von Dogiel zu den Eiweissdrüsen gerechnet; nach Paulsen zeigt ihr Epithel theils den Charakter von Schleimdrüsen, theils jenen von Eiweissdrüsen, theils von beiden zugleich.

Zum Schlusse mögen noch einige Worte über die Nase als Respirationsorgan Platz finden.

Die grosse Rolle, welche die Nase ausser bei der specifischen Geruchsperception auch noch bei der Respiration spielt, ist erst in den letzten Jahren gebührend gewürdigt worden. Der normale Mensch athmet, wie man schon am Neugeborenen beobachten kann, sowohl im wachen Zustande als auch im Schlafe durch die Nase. Die Inspirationsluft wird während ihres Weges durch die Nase zuerst durch die rings um den Naseneingang gestellten kurzen Haare, Vibrissae, von gröberen, dann durch Niederschlag auf die befeuchtete vielfach gewundene und Vorsprünge bildende Schleimhaut von feineren staubförmigen Beimengungen gereinigt und mehr als um einen halben Grad erwärmt. Die Inspirationsluft wird aber auch auf ihrem Wege durch die Nase wasserreicher, während bei der Exspiration durch die Nase in der letzteren Feuchtigkeit niedergeschlagen wird (Heymann). Nach Aschenbrandt ist die Wasserabgabe der Lungen keine so bedeutende, wie man gewöhnlich annimmt; der grösste Theil des ausgeathmeten Wasserdampfes stammt vielmehr wahrscheinlich aus der Nase; an der Abhaltung von Staub betheiligt sich hauptsächlich auch der Nasenrachenraum. Die Athmung durch den Mund bei ruhigem Verhalten muss stets als eine pathologische Erscheinung betrachtet werden, welche die verschiedensten Störungen zur Folge hat. Die

durch den Mund einströmende und vorher nicht erwärmte, nicht gereinigte sowie wasserärmere Luft wirkt reizend auf die Respirationsorgane und erzeugt acute und chronische Rachen-, Kehlkopf-, Luftröhren- und Bronchialkatarrhe; die Mundrachenhöhle wird trocken, die Zunge rissig, der Geschmack vermindert und verändert, der Gesichtsausdruck wird durch das beständige Offenhalten des Mundes und Herabhängenlassen der Unterlippe hässlich und blöde. Das häufig beobachtete Ausfallen der oberen Zähne führt Geo. Mayor auf die durch Austrocknung entstehende schnellere Zersetzung und Säurebildung in der Mundhöhle zurück.

Wie sehr auch durch Behinderung der Nasenathmung das Timbre der Stimme verändert, die Geruchsperception abgeschwächt oder vernichtet, das Gehörorgan geschädigt und sogar das Allgemeinbefinden speciell der Gaswechsel des Blutes und die Entwicklung des Thorax in Mitleidenschaft gezogen wird, wird man aus der Symptomatologie der verschiedenen Krankheiten noch zur Genüge ersehen.

Untersuchungsmethode.

Die Untersuchung der Nase zerfällt in zwei Theile, in die Inspection von vorne — Rhinoscopia anterior — und die Inspection von hinten — Rhinoscopia posterior. Wenn auch die letztere wichtige Aufschlüsse über das Cavum pharyngonasale und das hintere Ende der Nasenhöhle zu geben vermag, so ist doch der Inspection von vorne die grössere Bedeutung beizumessen. Immerhin müssen, wenn die Untersuchung der Nase eine erschöpfende sein soll, beide Methoden in Anwendung kommen.

Zur Untersuchung der Nase von vorne benützt man eigene Instrumente, Nasenspiegel (Fig. 10), welche, so verschieden auch ihre Form und Construction ist, doch alle den Zweck haben, durch Dilatation des Naseneinganges dem Lichte in möglichst ausgiebiger Weise Eingang zu verschaffen. Welcher Nasenspiegel den Vorzug verdient, ob der von Jurasz oder B. Fränkel, oder jener von Duplay, Bresgen, Roth, Tröltsch, Schnitzler, Voltolini oder Zaufal, ist um so schwerer zu entscheiden, als Uebung und Gewohnheit die Wahl desselben beeinflussen. Verfasser benützt ein zweiblätteriges Speculum (Fig. 10d), dessen Branchen durch Druck auf den federnden Handgriff auseinanderweichen. Es ist ein grosser Vorzug desselben, dass man die Stellung der Branchen jeden Augenblick durch Verminderung oder Verstärkung des Druckes ohne Zuhilfenahme der anderen Hand modificiren kann, welche Annehmlichkeit auch von den Kranken namentlich bei länger dauernden operativen Eingriffen empfunden wird.

Die Beleuchtung muss bei der Enge und Vielgestaltigkeit der Nase eine möglichst intensive sein; wenn auch das einfache mit der Stirnbinde reflectirte Licht für viele Fälle zur Untersuchung genügt,

so ist doch, namentlich bei operativen Eingriffen in der Tiefe der Nase, das intensivere Licht eines Linsenapparates vorzuziehen. Nachdem man sich in derselben Weise wie bei der Laryngoskopie das Licht concentrirt hat, umfasst man den Griff des Speculum so mit der linken Hohlhand, dass die Dorsalfläche der Finger dem Gesichte des Kranken zugekehrt ist. Der in der kälteren Zeit über der Lampe erwärmte Spiegel wird nun geschlossen in die zu untersuchende Nasenhöhle 1—1½ Cm. tief eingeführt, worauf man die Branchen des

Fig. 10. Verschiedene Nasenspiegel.

a nach B. Fränkel. b nach Duplay-Charière. c nach Juraszz. d nach Kramer. e Zaufal's Nasenrachentrichter.

Spiegels auseinandertreten lässt. Die den Einblick oft störenden Haare werden durch die Blätter des Spiegels, wenn nöthig durch geringe Rotation desselben auf die Seite geschoben. Es empfiehlt sich, die Spitze des Instrumentes nur bis an das vordere Ende der unteren Muschel vorzuschieben, damit krankhafte Veränderungen derselben nicht verdeckt werden. Mit der nunmehr auf den Scheitel des zu Untersuchenden gelegten rechten Hand neige man behufs der Untersuchung der gewissermassen die Führung übernehmenden unteren

Muschel sowie des unteren Nasenganges, des Nasenbodens und des unteren Theiles des Septum den Kopf des Patienten etwas nach vorne und unten oder möglichst horizontal, behufs Untersuchung der mittleren Muschel, des mittleren Nasenganges und des oberen Theiles des Septum sowie des Nasendaches nach hinten und oben, wobei selbstverständlich die Axe des Spiegels den Bewegungen des Kopfes zu folgen hat. Dem Patienten die jeweilige Stellung des Kopfes selbst zu überlassen, ist unzweckmässig und zeitraubend; angesammelte Secrete oder Blut müssen zuerst durch Schneuzen oder Ausspritzen entfernt werden. Etwas Blutung ist oft bei der schonendsten Untersuchung nicht zu vermeiden. Die Nasenscheidewand erscheint als eine verschieden rothe, mehr oder weniger gerade oder verbogene, senkrecht gestellte Platte, die untere Muschel als eine halbkugelige manchmal deutlich spiralige röthliche Hervorwölbung, deren convexe Fläche sich zuweilen bis zum hinteren Ende verfolgen lässt; der Nasenboden stellt eine flache oder leicht hohle Rinne vor. Die mittlere kleinere und blässere Muschel liegt höher, weiter nach hinten und der Scheidewand näher, so dass man nicht oft in der Lage ist, ihre mediale Fläche nach rückwärts zu verfolgen. Der untere Nasengang ist normalerweise der weiteste, der mittlere enger, die obere Muschel und der obere Nasengang sind von vorne niemals zu sehen.

Ueber die äusserst zahlreichen Varianten des Naseninnern wird bei den Missbildungen und Anomalien das Nähere mitgetheilt werden; für den Anfänger ist es oft recht schwierig, das Gesehene richtig zu deuten. Wie weit man in die Nase hineinsehen kann, hängt einestheils von der Intensität des Lichtes anderntheils von dem jeweiligen Falle ab; gerade und weite Nasen gestatten den Durchblick durch die ganze Höhle, während bei beschränkten Raumverhältnissen es oft nur gelingt, das vordere Ende der mittleren Muschel ja nicht einmal diese zu sehen.

Dass auch die Untersuchung mittelst des bereits früher beschriebenen Zaufal'schen Trichters (Figur 10e) werthvolle Aufschlüsse zu geben vermag, braucht nicht besonders betont zu werden.

Unumgänglich nothwendig zu einer genauen Untersuchung der Nase ist die Palpation mittelst der Sonde; dieselbe kann uns nicht nur Rechenschaft geben, ob die inspicirten Gebilde normale oder pathologische sind, sondern sie dient auch zur Eruirung der Consistenz der Schleimhaut, der Anheftungsweise allenfallsiger Neubildungen, zur Diagnose der Fremdkörper, Concretionen und Affectionen der Knorpel und Knochen, zur Beiseiteschiebung geschwellter den Einblick störender Schleimhautpartien. Zu dem letztgenannten Zwecke bedient man sich mit mehr Vortheil des von Zaufal angegebenen Nasenspatels, einer breiten planconcaven Hohlsonde, mit welcher die hypertrophische relaxirte Schleimhaut comprimirt und bei Seite geschoben wird. Die Application dieser Hohlrinnen, deren man für jede Nasenhöhle eine eigene bedarf, ist für den Kranken weniger unbequem als die von Spiegeln mit sehr langen Blättern, welche in die Tiefe der Nase eingeführt werden.

Diese Instrumente sind durch das Cocain überflüssig geworden. Dasselbe hat nämlich in 5—20% Lösung ausser seiner anästhesirenden Wirkung auch noch die Eigenschaft, das Schwellgewebe zur Retraction zu bringen und so die Untersuchung der tiefergelegenen Theile ausserordentlich zu erleichtern.

Zur Diagnose der Nasenaffectionen wird ferner auch der Geruch und das Gehör verwendet. Der erstere gibt uns bei der Exspiration durch die Nase Aufschluss, ob die Nase Zersetzungsproducte beherbergt oder nicht; das letztere belehrt uns über das Verhalten der Stimme, nasales Timbre etc. sowie die Durchgängigkeit der Nase, indem es bei Veränderungen kein oder ein verändertes (Stenosen-) Geräusch erkennen lässt.

Die früher geübte Percussion der Nase ist durch die modernen Untersuchungsmethoden völlig verdrängt worden.

Allgemeine Therapie.

Bei der Behandlung der Krankheiten der Nase ist die Reinigung derselben unentbehrlich.

In der Armenpraxis oder auch sonst unter bestimmten Umständen ist das Aufschnupfen von Flüssigkeit das einfachste, aber auch das am wenigsten wirksame Verfahren. Man lässt den Kranken entweder direct aus einem Glase durch die Nase trinken oder die mit der Hohlhand aufgefasste Flüssigkeit in die Nase einziehen, während der Kopf nach rückwärts geneigt wird. Für Ungeschickte sowie für Kinder eignet sich das Eingiessen der Flüssigkeit mittelst eines Löffels oder kleinen schnabelförmigen Gefässes, das sogenannte Nasenbad. Politzer benützt ein etwa 30 Gramm fassendes Glasschiffchen auch zur Application differenter Stoffe; v. Tröltsch und Mosler empfehlen, das Gurgelwasser durch die Choanen zu schleudern.

Eigens zur Reinigung der Nase dienende Vorrichtungen bezeichnet man als „Nasendouchen". Die weiteste Verbreitung hat unstreitig die Weber'sche Nasendouche gefunden, deren eines Ende, eine perforirte Metallplatte, in die zur Verwendung kommende Flüssigkeit eingetaucht, während das andere an einem 1—1½ Meter langen Gummischlauch befestigte Ende, ein konischer oder olivenförmiger Zapfen, in die Nasenöffnung eingeführt wird; da der Apparat auf dem Principe des Hebers beruht, muss die Flüssigkeit erst aspirirt werden. Statt der Olive kann auch die von Tröltsch angegebene Röhre für den Nasenrachenraum angesteckt werden oder die Schwartze'sche Schlunddouche.

Sehr praktisch, weil auch zu anderen Zwecken (Clysopomp, Uterusdouche, Magenpumpe) verwendbar, ist der Irrigator, ein verschieden grosses, an der Wand aufzuhängendes Blechgefäss, an welchem das Ausflussrohr mit oder ohne Sperrvorrichtung befestigt ist.

Um die Flüssigkeit mit grösserer Kraft in die Nase zu treiben und die oft äusserst zähen Secrete zu entfernen, benützt man Spritzen, sowohl Stempelspritzen, als auch Saug- und Druckpumpen, letztere unter dem Namen englische Spritzen oder Davidson'sche Clysopompe bekannt. Sie besteht aus einem Ballon mit Ventilvorrichtung, welcher an jedem der konisch zulaufenden Enden einen Schlauch von $^1/_4$—$^1/_2$ Meter Länge hat; das mittelst Blei beschwerte Ende wird in ein Gefäss gelegt, die Hornspitze des andern längeren Schlauches in den Naseneingang geschoben, in horizontale Richtung gebracht und sanft an die Scheidewand angelegt. Nachdem durch Compression des Ballons die Luft entfernt und das Wasser eingezogen wurde, wird in langsamem, tactmässigem Drucke die Flüssigkeit in die Nase eingetrieben. Sehr praktisch und ungefährlich für das Ohr sind Spritzen, deren Ansatzrohre in die Nase vorgeschoben werden können.

Man benützt auch zur Reinigung der Nase und des Nasenrachenraums den Dampfinhalateur oder den kalten Spray mit gröberer Oeffnung, namentlich bei vollständiger Impermeabilität der Nase oder bei Lähmung, Defecten und Perforationen des Gaumensegels.

Bei allen Arten der Nasendouche wird durch den Reiz der einströmenden Flüssigkeit das Gaumensegel zur Contraction gebracht und so der Nasenrachenraum von der Mundhöhle abgeschlossen; die Spritzflüssigkeit fliesst durch das andere Nasenloch ab; wird die Douche zu lange fortgesetzt oder durch Schlucken unterbrochen, dann erschlafft das Velum, und ein Theil der injicirten Masse gelangt in die Mundrachenhöhle oder wird verschluckt, was bei differenten Stoffen namentlich dem vielgebrauchten Kali chloricum durchaus vermieden werden muss.

Hinsichtlich der Temperatur der Spritzflüssigkeit gehen die Ansichten weit auseinander. Während die Einen sehr warme, blutwarme oder lauwarme Flüssigkeiten empfehlen, verwenden die Anderen kühles, ja selbst ganz kaltes Wasser. Da zu warme Flüssigkeit die Fluxion zur Nase begünstigt, ganz kaltes Wasser aber ein höchst unangenehmes, brennendes und schmerzhaftes Gefühl verursacht, so wähle man den Mittelweg, d. h. man beginne mit lauwarmem Wasser von circa 25 C. und gehe allmählich zu niedrigeren Temperaturen herab. Auf diese Weise gelingt es, nicht nur die Schleimhaut zu contrahiren, sondern auch allmählich abzuhärten. Es ist natürlich, dass die höheren Temperaturen hauptsächlich im Winter, die niedrigeren im Sommer zur Verwendung kommen.

Die Quantität des Spritzwassers richtet sich nach der Beschaffenheit und Menge des Secretes. Flüssiges oder halbflüssiges Secret lässt sich schneller entfernen als dickes oder gar zu Borken eingetrocknetes. Man wird also in ersterem Falle mit $^1/_2$—1 Liter ausreichen, während im letzteren meist mehrere Liter nöthig werden; übrigens hat man ohne Schaden aber auch ohne Nutzen ungeheure Quantitäten, 20 Liter selbst einen ganzen Eimer verbrauchen lassen. In der Regel genügt ein 2—3maliges Durchspülen für den Tag.

Noch wichtiger als Temperatur und Quantität ist die Qualität der Spülflüssigkeit.

Verfasser verwendet wie auch Andere die Nasendouche hauptsächlich nur zur Reinigung, sehr selten als wirkliches Heilmittel und verordnet deshalb fast nur noch die Resolventia, entweder die natürlichen alkalischen und salinischen, schwefelhaltigen Wässer oder 1- bis 2% Lösungen von Kali carb., Natr. bicarb., Natr. chlorat., Ammon. muriat., Natr. sulfur.; bei Diphtherie verdünntes Kalkwasser, ferner auch die Desinficientia, resp. Desodorificantia. In erster Linie steht das Kali chloricum, 1 Esslöffel in 1 Liter Wasser, dann das Kali hypermang. 0·1 : 100·0, die ½—1% Carbolsäure, 2—4% Borsäure, das Natr. benzoic. und salicylicum, die Salicylsäure 1—3%, das Thymol 0·1 : 100·0.

Von den Adstringentien sind hauptsächlich in Gebrauch: Tannin 1 Messerspitze voll auf 50—100·0 Wasser, Alaun, essigsaure Thonerde, Zinksulfat, Arg. nitr., Alumin. acetico-tart. (20 Tropfen bis 1 Kaffeelöffel voll einer 25% Lösung zu 1 Liter). Man sei mit der Dosirung sehr vorsichtig und beginne stets mit den allerschwächsten Lösungen, denn abgesehen von dem mehrfach beobachteten Verlust des Geruches verursachen einige der obengenannten Adstringentia, so namentlich das Zinksulfat, selbst noch in einer Verdünnung von 1 : 1000 Reizung der Schleimhaut, heftigen Niesreiz, Brennen und Thränen der Augen, Kopfschmerz; am ehesten werden die genannten Stoffe noch in Sprayform vertragen.

Wenn viele Personen die Reinigung der Nase mit ganz indifferenten Stoffen schmerzhaft empfinden, und namentlich über Stirnweh klagen, so kann man so gut wie sicher sein, dass dieselben die Douche in ungeschickter und fehlerhafter Weise handhaben. Der Fehler besteht abgesehen von der zu niedrigen oder zu hohen Temperatur meist darin, dass die Spülflüssigkeit unter zu hohem Drucke in die Nase und deren Nebenhöhlen namentlich in die Stirnhöhle getrieben wird, wodurch die sehr sensiblen Trigeminusäste gereizt werden. Bei der Weber'schen Douche sowohl wie beim Irrigator soll im Anfang die Höhe des Wasserstrahls nicht über 5 Centimeter betragen; ebenso soll bei dem Gebrauche von Spritzen der Druck anfänglich ein minimaler und stets gleichmässiger erst allmählich sich steigernder sein. Ein weiterer Hauptfehler liegt darin, dass die meisten Kranken, wenn sie nicht ausdrücklich vom Arzte darüber belehrt werden, den Strahl statt in horizontaler Richtung, also durch den unteren Nasengang, in verticaler Richtung, also gegen das Nasendach, richten. Wieder Andere fehlen darin, dass sie den Kopf während der Douche nicht wie es die Regel sein soll, nach vorne neigen oder mehr horizontal stellen, sondern nach hinten überbeugen. Nach der Douche soll der Kranke nicht schneuzen, sondern bei zugehaltenem einem Nasenloche die restirende Flüssigkeit durch das andere ausblasen.

Der schwerste Vorwurf, der mit Recht der Douche gemacht werden kann, ist der Eintritt von Flüssigkeit in das Mittelohr. Wenn es auch wahr ist, dass durch ungeschicktes Manipuliren so besonders

auch durch Verschluss des zum Abfluss dienenden Nasenloches oder ungeschickte Schluckbewegungen, eitrige Mittelohrentzündungen erzeugt werden können, so gehören doch solche Unglücksfälle immerhin zu den Seltenheiten; wegen einzelner Nachtheile aber die Nasendouche zu verwerfen, wäre ebenso unvernünftig, als wenn man auf das Cocain, Morphium oder Chloroform verzichten wollte.

Am ehesten entgeht man noch der Gefahr, wenn der Ansatz für die Nase nicht das ganze Lumen des Nasenloches ausfüllt, sondern noch Raum zum Abfluss übrig lässt, oder eingefeilte Rinnen oder wie der von Berthold construirte eine Zufluss- und Abflussöffnung besitzt.

Als eigentliche therapeutische Methoden müssen die Bepinselungen, medicamentösen Watteeinlagen, Insufflationen und Instillationen betrachtet werden. Die ersteren werden mit einem kleinen Pinsel oder Wattetampon oder einem Stücke feinen Badeschwammes vorgenommen; man benützt hauptsächlich Lösungen von Arg. nitr. oder die Mandl'sche Solution, doch ist bei dem beschränkten Raume denselben nur eine untergeorduete Bedeutung beizumessen. Zu den längere Zeit in der Nase zu behaltenden Watteeinlagen benützt man in der Regel Fette, Ol. amygdal. Vaseline, Borsalbe, ferner Lig. ferri sesquichl., Alaun, Tannin, Jodoform, Ung. hydrarg. präcip. albi.

In weit ergiebigerer Weise kann man durch Insufflation pulverförmiger Stoffe auf die Nasenschleimhaut einwirken. Ueber die Wahl derselben wird bei den einschlägigen Krankheiten die Rede sein. Schnupfpulver, Coryzarien, haben theils den Zweck, die Schleimhaut zu reizen und die Secretion zu steigern, theils direct heilend einzuwirken; in elastisch flüssiger Form kommen ferner Stoffe zur Verwendung, deren Dämpfe oder Riechstoffe aus einer Flasche oder nach Aufträufeln auf ein Tuch durch die Nase eingeathmet werden. Die Application medicamentöse Stoffe namentlich Jodoform, Menthol, Tannin, Wismuth, Zinc. sulf. enthaltender Gelatinebougies ist für einzelne Fälle vortheilhaft, doch ziemlich kostspielig. Das als diagnostisches und anästhesirendes Mittel in Verwendung kommende Cocain in 5—20% Lösung kann entweder mit einem Tropfenzähler instillirt oder wie bei Operationen an bestimmten Stellen mittelst Watte oder Pinsel applicirt werden. Als Ersatz für dasselbe hat man das Menthol in 20—50% öliger Lösung sowie das Rhigolin vorgeschlagen.

Als Caustica kommen in der Nase das Chlorzink, der Lapis, hauptsächlich aber die Chromsäure in Anwendung. Die Chromsäurekrystalle müssen an einer Sonde vorsichtig erwärmt werden, da dieselben bei allzustarker Erwärmung ihre caustische Wirkung verlieren. Nach der Application muss die Nase mit einer 1—2% Sodalösung ausgespritzt werden. Dass die Chromsäure das wirksamste chemische Causticum ist, ist nicht zu bestreiten; dass dieselbe aber die Galvanokaustik überflüssig macht, ist absolut unrichtig. Die Galvanokaustik ist und bleibt das unentbehrlichste oft geradezu einzige Mittel zur erfolgreichen Behandlung der Nasenaffectionen. Ueber das Instrumen-

tarium wurde bereits früher gesprochen; die speciellen Indicationen werden bei den einzelnen Krankheiten ihre Erledigung finden, ebenso die übrigen bestimmten Zwecken dienenden Instrumente, wie Zangen, Pincetten, Curetten, Schlingenschnürer etc.

Die Elektricität kommt nur bei den Neurosen und auch da nur in sehr beschränkter Weise zur Anwendung.

Missbildungen, Anomalien und Formfehler.

Betrachten wir zuerst die Formfehler der äusseren Nase, so begegnen wir, abgesehen von den äusserst zahlreichen das Auge des Aesthetikers beleidigenden Formationen, sehr selten der Verdoppelung der Nase. Häufiger sind angeborene Defecte, als da sind Fehlen der Nasenbeine oder der Nasenfortsätze des Oberkiefers; vollständiges Fehlen der Nase beobachtete Maisonneuve; es befand sich an Stelle der Nase ein Hautfleck, an dessen unterem Ende zwei äusserst schmale Oeffnungen, die Andeutungen der Nasenlöcher, sich vorfanden. Mangel der Cartil. alar. und triangulares sowie Hyperplasie sämmtlicher Nasenknorpel wurde unter Anderen auch von Schäffer beobachtet. Ziemlich häufig sind die Spaltbildungen, welche sich meist im Gefolge von Gaumenspalten und Hasenscharten in die Nasenöffnungen fortsetzen. Die vorderen Nasenöffnungen hat man wiederholt vollständig oder theilweise bei der Geburt geschlossen gefunden; knöcherne Obliterationen sind äusserst selten. Meist sind die Verwachsungen der Nasenlöcher membranös, ihre Tiefe ist sehr verschieden und lässt sich durch Aufblasen der Nase durch Pressen bestimmen. Sehr häufig sind die erworbenen Verengerungen und Verwachsungen der Naseneingänge; so sah Verfasser eine hochgradige Stenose des linken Nasenloches nach einem Säbelhiebe, eine andere nach einer Verbrennung, Böcker nach Cauterisation mit Lapis zurückbleiben; am häufigsten sind dieselben Folgen von Lupus und Syphilis durch Zerstörung der Nasenflügelknorpel und Retraction der Weichtheile.

Des angeborenen knöchernen und des erworbenen membranösen Verschlusses der hinteren Nasenöffnungen wurde bereits früher Erwähnung gethan, ebenso der anderen Anomalien des Nasenrachenraumes.

Im Innern der Nase begegnet man angeborenen Defecten des ganzen Septum oder des Vomer, der unteren Muschel, des Siebbeinlabyrinthes; unter den erworbenen Formfehlern sind die häufigsten Perforationen und Defecte des Septum mit Einsinken der äusseren Nase (Sattelnase, Nez de mouton) in Folge von Syphilis und anderweitiger Ulcerationsprocesse, ebenso Verlust der Muscheln, Zerstörungen des Vomer etc. Sehr häufig sind ferner Missbildungen der Muscheln, welche bald zu gross, bald zu klein oder zu flach oder zu stark gewölbt und gerollt, eingekerbt, sogar durchlöchert erscheinen;

das Vorkommen einer vierten Muschel wurde bereits erwähnt. Verdoppelung des Septum wurde von Lefferts beobachtet.

Unter allen Formanomalien des Naseninnern ist die häufigste die Verbiegung des Septum; man kann behaupten, dass kaum ein Mensch eine ganz gerade Nasenscheidewand besitzt; nach den Messungen M. Mackenzie's waren allein 77% der von ihm untersuchten Schädel mit knöchernen Septumdeviationen behaftet. In der Regel betrifft die Verbiegung den knöchernen und knorpeligen Theil, doch findet sich oft nur der erstere oder der letztere missbildet. In hochgradigen Fällen ist die Verbiegung eine Sförmige und betrifft beide Nasenhöhlen; meist ist jedoch nur die eine Nasenhälfte, wie es scheint, häufiger die linke ergriffen. Durch alle Deviationen der Scheidewand entsteht ein Missverhältniss in der Weite der Nasenhöhlen; die Nase, welche den convex hervorgewölbten Theil des Septum beherbergt, wird verengt, die andere erweitert. So lange das Missverhältniss kein bedeutendes ist, fehlen meist alle Beschwerden; bei hochgradiger Verbiegung kommt es aber zu beträchtlichen Functionsstörungen, zu Unwegsamkeit der Nase für die Respiration, Verminderung oder Aufhebung des Geruchs und zur Unmöglichkeit, die angesammelten Secrete zu entfernen; die Sprache wird nasal, auch wird das Einführen des Ohrkatheters, die Untersuchung und das Operiren in der Nase ausserordentlich erschwert, ja unmöglich. Auch die verschiedensten Reflexneurosen können durch den Contact der verbogenen Scheidewand oder der gleich zu erwähnenden Leisten und Auswüchse mit den Muscheln erzeugt werden.

Ueber die Ursachen der Septumdeviationen sind die Ansichten sehr getheilt. Die Einen betrachten als Ursache Heredität, ungleiches Wachsthum der Schädel- und Gesichtsknochen, Expansion der Siebbeinzellen durch Knochenblasen und Cysten, ungleiche Entwicklung der Gehirnhemisphären, die Anderen hingegen wie Ziem machen Verletzungen, Fall auf die Nase bei den ersten Gehversuchen, Faustkämpfe, Brüche, habituelles Schlafen auf einer Seite (Welcker), Schneuzen mit derselben Hand, Bohren mit den Fingern in einer Nasenseite etc. verantwortlich. Baumgarten hält den Druck des durch häufige Schnupfen immer wieder anschwellenden erectilen Gewebes der unteren Muscheln im Kindesalter für die Hauptursache der Septumdeviationen, und stützt seine Ansicht auf die Thatsache, dass Verbiegungen im vorderen knorpeligen Theile unendlich häufiger sind als im hinteren knöchernen Theil, der durch das Schwellgewebe nicht so leicht aus seiner normalen Lage verdrängt werde. Schaus glaubt nicht, dass mechanische Einwirkungen Schiefstand der Nase zur Folge hätten; die häufigen Anomalien des Schädelskelettes bei gleichzeitigem Schiefstand der Nasenscheidewand deuteten darauf hin, dass hier Entwicklungs- resp. abnorme Wachsthumsvorgänge beim Aufbau des Gesichtsskelettes eine Rolle spielten. Die speciellen Ursachen dieser Wachsthumsanomalien, welche meist um die Zeit der zweiten Dentition eintreten, seien zwar unbekannt, doch dürfte die Rhachitis oder vorzeitige Verknöcherung der Gaumennaht die Hauptrolle spielen.

Auch Löwy macht für die mit starker Wölbung und Verschmälerung des Gaumens sowie mit Vorspringen der Alveolarfortsätze verbundenen Formen von Septumdeviationen die Rhachitis verantwortlich. Es ist sehr schwer, Ursache und Wirkung der Septumdeviationen streng auseinanderzuhalten. Es ist unzweifelhaft, dass bei sehr vielen hochgradigen Deviationen Anomalien und Deformitäten des Schädelskelettes vollständig fehlen, während sie in anderen Fällen in ausgeprägter Weise vorhanden sind. Dass frühzeitig auftretende Verstopfungen der Nase weittragende Folgen auf die Entwicklung des Schädels haben, wurde von Ziem experimentell nachgewiesen; bei jungen Thieren, welchen er eine Nasenhälfte vollkommen für längere Zeit verschloss, zeigte sich eine Abweichung des Zwischenkiefers, der Sutura sagittalis nach der verschlossenen Seite, eine geringere Länge des Nasenbeins, Stirnbeins und der horizontalen Gaumenplatte, eine weniger steile Erhebung der Alveolarfortsätze, ein kleinerer Abstand zwischen der Vorderfläche der knöchernen Gehörkapsel und Alveolarfortsatz sowie zwischen Jochbogen und Supraorbitalrand, eine geringere Grösse und asymmetrische Lage der Gefäss- und Nervencanäle auf der verschlossenen Seite und ungleichen Abstand der Orbitae von der Medianlinie. Beim Menschen fand Schaus auf der verengten Seite ein auffallendes Weiterausgeschnittensein der Apertura pyriformis, einen ungleichen Höhenstand der Orbitae, eine ganz auffallend abnorme Höhe, Schmalheit und Spitzheit des Gaumengewölbes mit spitzwinkeliger Hervorwölbung der Aveolarfortsätze des Oberkiefers auf der der verengten Nase entsprechenden Seite. Die erwähnten Veränderungen der Orbitae führen zu Asthenopie, Astigmatismus und Strabismus; auch scheinen manche Verkrümmungen der Halswirbelsäule mit frühzeitiger Obstruction der Nase in Verbindung zu stehen.

Ziemlich häufig ist ferner die angeborene Enge der Nasenhöhlen. Der Nasenrücken erscheint dabei oft sehr schmal, die seitliche Wand der Nase steil abfallend, die Nasenflügel zusammengedrückt, die Nasenöffnungen nach vorne und oben gerichtet, die meist sehr platten wenig oder gar nicht gewölbten Muscheln dem Septum sehr nahegerückt, das Lumen der Nase ausserordentlich reducirt. Die Respiration durch die Nase wird bei der geringsten Schwellung der Schleimhaut unmöglich, der Geruchsinn vermindert, die Sprache näselnd; acute Katarrhe werden leicht chronisch oder pflanzen sich auf den Rachen und das Mittelohr fort.

Abnorme Weite der Nase findet sich als Raceneigenthümlichkeit bei manchen Volksstämmen, z. B. den Czechen und Südslaven, Kirgisen, Mongolen, verschiedenen Negerstämmen etc., ferner bei angeborenen oder erworbenen Defecten der Muscheln, bei Dilatation durch sehr grosse und zahlreiche Nasenpolypen, hauptsächlich aber bei Ozaena simplex und Syphilis in Folge des Schwundes der Schleimhaut und des erectilen Gewebes der Muscheln.

Ausser Verbiegungen kommen am Septum noch andere Veränderungen vor. Am häufigsten sind partielle Verdickungen resp. Auswüchse, rundliche, blasige oder kegelförmige oft ganz spitzige

Fortsätze, Grate oder auch Spinen genannt. Sie haben meist im vordersten Theile der Scheidewand ihren Sitz und sind theils knöcherner theils knorpeliger Structur. Aeusserst häufig sieht man eine die ganze Länge des Septum einnehmende $^1/_2$—1 Centim. über dem Nasenboden sich emporwölbende, der Insertion der knorpeligen Scheidewand an den Falz der abnorm hohen Crista nasalis entsprechende dreieckige Leiste, welche durch Berührung der untern Muschel den untern Nasengang halbirt oder verengt. Nach Michel findet sich öfters ein beweglicher blasser Vorsprung nahe dem Nasenboden, der unterste Theil der knorpeligen Scheidewand, welcher aus der Verbindung mit der knöchernen luxirt ist. Gar nicht selten sind ferner Verwachsungen, Synechien des Septum mit den Muscheln oder dieser unter sich; sie betreffen bald die untere bald die mittlere Muschel und sind theils membranöser theils knöcherner Natur. Nicht selten steht auch die untere Muschel mit dem Nasenboden durch eine Knochenleiste in Verbindung. Zuweilen finden sich Knochenblasen und Knochencysten; sie gehen meist vom Siebbein resp. der mittleren oder obern Muschel aus und machen, wenn sie klein sind, keine Erscheinungen; bei grösserem Umfange führen sie zu Verstopfung, Verbiegung des Septum, Dislocation der Orbita mit Exophthalmus, Anosmie, Trigeminusneuralgien und andern Neurosen. Sie sind theils mit Luft theils mit Schleim oder Eiter gefüllt, und werden bei den Krankheiten der Nebenhöhlen nochmals Erwähnung finden.

Die Therapie der angeborenen oder erworbenen Formfehler der Nase kann natürlich nur eine operative sein. Bei membranösem narbigem Verschluss der Nasenlöcher muss die Trennung mit Messer oder Galvanokauter vorgenommen und die Wiederverwachsung durch Einlegen perforirter mit einem Federkiel versehener Kork-, Watte- oder Gummistöpsel oder auch Metallbougies verhindert werden; bei geringgradigeren Stenosen nützt zuweilen die allmähliche Dilatation mittelst Pressschwamm oder Laminaria. Die Methoden zur Beseitigung des knöchernen oder membranösen Choanenverschlusses wurden bereits bei den Krankheiten des Rachens erwähnt. Defecte der äussern Nase können durch künstliche aus Celluloid, Kautschuk oder Silberblech gefertigte und mit Federn versehene Piecen gedeckt werden. Plastische Operationen zum Ersatz der Nasenspitze, der Nasenflügel, zur Beseitigung der Spaltbildungen, gehören in das Gebiet der Chirurgie. Knochenblasen, von nicht zu bedeutender Grösse können mit der kalten oder heissen Schlinge abgetragen oder mit dem galvanokaustischen Messer zerstört oder der Knochenzange sowie dem Meissel abgetragen werden; bei sehr grosser Härte und Ausdehnung muss der Nasenflügel gespalten und der Tumor weggemeisselt werden. Bei störender angeborner Enge der Nasenhöhlen lässt sich nur durch Entfernung irgend einer Muschel Abhilfe schaffen.

Die orthopädische Behandlung der Septumdeviationen, bestehend in der 50—100mal im Tage vorzunehmenden Verschiebung der Nasenspitze nach der entgegengesetzten Seite sowie die allmähliche Geradestellung durch Einführen von Tampons, Gummiröhren,

Laminariastifte etc. sind auch nach des Verf. Erfahrung völlig nutzlos, da selbst nach der vollkommensten Geradestellung das Septum wieder in seine alte abnorme Stellung zurückkehrt. Bessere Resultate erzielt man mit der unblutigen Geradestellung nach Jurasz.

Jurasz empfiehlt nach dem Vorgange von Adams, die verbogene Stelle zwischen zwei Platten gerade zu pressen; er construirte zu diesem Zwecke ein Instrument, das aus zwei gesondert einzuführenden Theilen besteht; man führt nach vorheriger Cocainisirung zuerst jede einzelne Hälfte der Zange in eine Nasenöffnung ein, legt sie um die verbogene knorpelige Scheidewand und schliesst das Instrument; hierauf drückt man die beiden Branchen so stark zusammen, dass die Verkrümmung ausgeglichen und die Scheidewand in die Medianlinie gedrängt wird. Sodann werden die beiden Platten in loco aufeinandergeschraubt, der Compressor liegen gelassen und die Zange abgenommen. Der Compressor, welcher so gebaut ist, dass er den Kranken beim Essen nicht stört, soll womöglich 3 Tage liegen bleiben und wird entfernt, indem zuerst die Schraube und dann jede einzelne Platte besonders herausgenommen wird. Leider wird der Erfolg auch dieser Operation durch die Schmerzhaftigkeit des Verfahrens, die lange Nachbehandlung und das Zurückgehen des Septums in die frühere fehlerhafte Lage recht oft vereitelt.

Eine andere Methode üben Steele und Daly. Sie zerbrechen zuerst die hervorgewölbte Stelle des Septum mittelst einer mit 4 sternförmigen scharfen Leisten versehenen Zange und legen dann die Elfenbeinbolzen ein, welche 4 Tage in der richtigen Stellung erhalten werden müssen.

Man hat ferner versucht, durch galvanokaustische Verkleinerung der der Deviation gegenüberliegenden Schleimhautpartie Raum zu schaffen; die Resultate sind aber meist sehr ungenügend. Mehr Raum wird geschaffen durch die Entfernung der untern oder mittleren Muschel, doch ist diese Operation nicht nur eine sehr blutige sondern unter Umständen sogar sehr gefährliche.

Die früher zur Beseitigung der seitlichen Ausbauchungen der Scheidewandplatte allein geübte blutige Methode, ein Stück der Scheidewand mit einer Locheisenzange, ähnlich dem Instrumente zum Coupiren der Eisenbahnbillete, herauszunehmen, leidet an dem Missstande, dass es bei den bestehenden Raumverhältnissen meist nicht gelingt, das Instrument auf die Höhe der Vorwölbung zu bringen. Da also meist nur ein Stück aus dem vor der stärksten Verkrümmung liegenden Theile herausgeschnitten wird, so beruht die Operation auf einer Täuschung, da zwar durch das Nasenloch der verkrümmten Seite Luft einströmt, die Verkrümmung selbst aber bestehen und der hinter der Verbiegung liegende Theil der Nase ausser Function bleibt.

Hartmann und Petersen schlugen deshalb die partielle Resection der Nasenscheidewand vor; in der Narkose wird die Schleimhaut gespalten, mit einem Raspatorium von dem unterliegenden Knochen abgehoben und zurückgeschoben, das vorgewölbte Stück des Septum mit einer kleinen Knochenscheere in der Grösse eines Zehn-

pfennigstücks ausgeschnitten; durch Einlegen eines dicken Gummischlauches wird das Septum in die rechte Lage gebracht und darin erhalten.

Krieg resecirt die Cartilago quadrang. septi nach vorhergegangener Cocainisirung. Die sehr schwierige und durch Blutungen sehr langwierige Operation beginnt er mit der Durchschneidung und Zurückpräparirung der Schleimhaut im Bereiche der deviirten Stelle; darauf lässt er die Durchschneidung und Excision des Knorpels mit Erhaltung der Schleimhaut folgen; Schleimhaut und Knorpellappen der verengten Seite werden möglichst weit nach hinten ausgeschnitten, eventuell sogar noch die knöcherne Wand ausgebrochen. Die Nachbehandlung muss eine antiseptische sein. Das Instrumentarium besteht aus einem kleinen Resectionsmesser mit 1·5 Centim. langer und 0·4 Centim. hoher Klinge, einer langstieligen kleinblätterigen Scheere, mehreren stumpfen Haken und einem Raspatorium.

Sehr viel einfacher ist die Resection des vorgewölbten Septum in ganzer Dicke d. h. mit Perforation; selbstverständlich muss durch dieselbe auch der hinter der Stenose gelegene Theil der Nase für die Luft passirbar sein. Die durch die Perforation gesetzte „Verstümmelung" ist völlig nebensächlich, da sie weder Nachtheile noch Formveränderung der Nase mit sich bringt. Verfasser zerstört zuerst die Schleimhaut über der vorgewölbten Stelle bis auf den Knorpel mittelst Chromsäure oder Galvanokauter und durchschneidet dann sehr leicht mittelst eines geknöpften Messers den blossliegenden Knorpel in einem Zuge; zuweilen ist eine Nachhilfe mit der Scheere nothwendig.

Wegen der Schwierigkeit der Resection des Septums suchen sich Andere, wie z. B. Moldenhauer, nach dem Vorgange von Demarquay durch Spaltung der äussern Nase nach unten und in der Nasolabialfurche und Umklappen des Nasenflügels sich besseren Zugang zum Septum zu verschaffen.

Die Behandlung der übrigen Anomalien, welche gleichfalls mehr oder weniger ausgesprochene Functionsstörungen zur Folge haben, ist eine sehr verschiedene. Am einfachsten ist die membranöse Verwachsung der Muscheln mit dem Septum mittelst Messer oder Galvanokauter zu beseitigen; die Wiedervereinigung muss durch Einlegen von Tampons verhindert werden. Knöcherne Spinen und Synechien werden am besten mit einer feinen Stichsäge beseitigt oder mit einem scharfen Meissel weggestemmt. Knorpelige und dünne knöcherne Auswüchse und Synechien können mit Scheeren oder Knochenzangen weggeschnitten oder mittelst Galvanokauter zerstört oder wenigstens verkleinert werden.

Rhinitis catarrhalis acuta.

Unter allen Schleimhäuten zeigt die der Nase die ausgeprägteste Disposition zu katarrhalischer Entzündung; stammt doch das Wort Katarrh von dem hervorstechendsten Symptom, dem Herabfliessen des

Secretes, und wird dasselbe in vielen Gegenden so namentlich auch in Süddeutschland nur in Bezug auf den acuten Katarrh der Nase gebraucht.

Die Aetiologie der acuten Coryza ist sehr mannigfaltig. Die Hauptrolle spielen unstreitig atmosphärische Einflüsse, rascher Wechsel der Temperatur, Erkältungen, Durchnässung der Haut des Kopfes, Halses, Rumpfes und der Füsse, Zugluft, ebenso abnorm hohe Temperatur. Massenhaft tritt die acute Rhinitis beim Uebergange der wärmeren Jahreszeit in die kältere und umgekehrt, also im Frühjahre und Herbste als Influenza, Grippe, auf. Dass diese letztere Form contagiös ist, kann keinem Zweifel unterliegen, ob aber die von Seifert in den Secreten der Influenzakranken aufgefundenen Mikroorganismen in der That die Ursache sind, bedarf noch der Bestätigung. Acute Rhinitis ist ferner die constante Begleiterin der Masern, öfters auch der Blattern, des Scharlachs und exanthematischen Typhus. Sehr häufig ist sie fortgeleitet vom Rachen oder Kehlkopf oder Folge von Reizen, welche die Nasenschleimhaut direct treffen; unter diesen sind heisse Dämpfe, sehr kalte Luft, staubende organische und anorganische Substanzen besonders zu erwähnen. Von den Chemikalien wirken in hohem Grade reizend: Ammoniak-, Chlor-, Salzsäuredämpfe, Jod, Quecksilber, Arsenik, doppelchromsaures Kali, Osmiumsäure, Digitalin; die durch längere Einwirkung dieser Substanzen entstandene Rhinitis bezeichnet man auch als „professionelle Coryza".

Auch der sporadisch auftretende Schnupfen gilt als ansteckend, wenn es auch bisher nicht gelang, denselben experimentell zu erzeugen. Immerhin spricht das Erkranken mehrerer Familienglieder nacheinander sowie solcher Personen, welche niemals an Schnupfen gelitten hatten, nach Benützung des Taschentuches oder dem intimeren Umgang mit Schnupfen Behafteten, sowie die von Friedreich beobachtete gleichzeitige Milzvergrösserung für die Contagiosität mancher Schnupfenformen.

Bei vielen Personen ist die Disposition zu acuten Nasenentzündungen eine ausserordentliche; wie es Personen gibt, welche nach jeder Erkältung einen Muskel- oder Gelenkrheumatismus bekommen, so gibt es auch solche, welche regelmässig eine acute Rhinitis acquiriren; von ihnen gilt meistens dasselbe, was gelegentlich der acuten Pharyngitis über mangelhafte Hauthygiene gesagt wurde.

Dem Ausbruche der Krankheit gehen oft mehrere Stunden oder Tage Eingenommenheit des Kopfes, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unlust zur Arbeit, Kratzen im Nasenrachenraum, Frieren und Frösteln voraus. Bald gesellen sich zu diesen Prodromalerscheinungen brennendes, prickelndes Gefühl in der Nase, heftiger klopfender Stirnkopfschmerz, Niesreiz, Nasenbluten, vermehrte Secretion. Dieselbe steigert sich rapid und erreicht oft eine solche Intensität, dass die Kranken Tag und Nacht Taschentücher vorzuhalten gezwungen sind. Das Secret ist im Anfange und auf der Höhe des Leidens dünn, wasserhell, scharf, ätzend in Folge seines Gehaltes an Kochsalz und Ammoniak; der Geruch ist verringert oder vollständig zu Verlust

gegangen, ebenso der Geschmack, die Respiration durch die Nase ist erschwert oder aufgehoben, die Stimme nasal. Die Obturation ist meist eine vorübergehende, oft plötzlich, wie nach dem Schneuzen auftretende; bei dem Niederlegen im Bette verstopft sich in Folge behinderter Circulation in den Schwellkörpern meist das Nasenloch derjenigen Seite, auf welcher man ruht. Setzt sich der Katarrh durch den Thränencanal auf die Conjunctiva fort, so entsteht unter Röthung derselben Thränenträufeln, Lichtscheu, Lidkrampf, bei Fortpflanzung in den Nasenrachenraum resp. die Tuben Ohrensausen, Schwerhörigkeit, Jucken im Ohre, bei acuter Mittelohrentzündung heftigster namentlich während der Nacht sich verstärkender Ohrschmerz.

Beunruhigender sind die Erscheinungen bei Säuglingen. Da dieselben nur durch die Nase athmen, so ist ihr Schlaf gestört, von Schreien und Erstickungsanfällen unterbrochen; das Saugen ist im höchsten Grade erschwert, da die Athmung zum Oeffnen des Mundes und Loslassen der kaum erfassten Brust nöthigt; durch Mangel an Schlaf und ungenügende Ernährung wird die Entwicklung des Kindes gestört, bei längerer Dauer kann Erschöpfung sowie durch Fortleitung des Katarrhs auf Kehlkopf und Bronchien der Tod durch Bronchopneumonie eintreten.

Nachdem die Beschwerden und die Secretion den höchsten Grad erreicht haben, vermindert sich die letztere in der Regel nach 2 bis 4 Tagen, das Secret wird dicker, zäher, äusserst mucinreich und bildet Krusten und Borken oder zusammenhängende gelatineartige Klumpen von schleimig-eitriger seltener rein eitriger Beschaffenheit; allmählich verändert sich dasselbe in qualitativer und quantitativer Hinsicht, um schliesslich der normalen Secretion Platz zu machen. Auch die Verstopfung der Nase verliert sich allmählich und Geschmack und Geruch kehren zurück; gar nicht selten geht der acute Katarrh in den chronischen über.

Die objectiven Veränderungen bestehen in mehr oder weniger intensiver Röthung der Schleimhaut beider, seltener einer Nasenhöhle; die Schwellung ist meist eine diffuse und gleichmässig sammtartige, besonders stark ist sie namentlich an dem vorderen und hintern Ende der untern Muschel. Nicht selten finden sich Erosionen und stark erweiterte blutende Venen.

Die Haut der Nase erscheint geröthet, geschwellt, glänzend, erysipelatös, die Haut der Oberlippe und Nasenlöcher erodirt, öfters mit Ekzem- oder Herpesbläschen besetzt. Bei vollständiger Nasenobstruction ist die Zunge trocken, rissig, in Folge von capillären Blutaustritten bräunlich oder schwarz belegt. Das Secret enthält anfangs zahlreiche desquamirte Cylinder- und Flimmerepithelien, weisse Blutkörperchen und Schleimzellen; die Zahl der letzteren nimmt im weitern Verlaufe immer mehr zu, ebenso der Mucingehalt; nicht selten finden sich Beimengungen von rothen Blutkörperchen und verschiedene Pilzarten.

Bei der professionellen Coryza werden neben diffuser Röthung und Schwellung oft Geschwüre der Muscheln sowie Perforationen des

Septum beobachtet. Diese letzteren sind im Anfange sehr klein und sitzen meist 1—1½ Centim. über dem Nasenboden, verbreiten sich aber allmählich in die Tiefe und Fläche, so dass der ganze Vomer und die verticale Siebbeinplatte zerstört werden kann; Entstellungen der äussern Nase durch Einsinken des Rückens kommen, da der vordere Theil des Septum stets erhalten bleibt, nicht vor. Nach Lehmann, dessen Thierversuche mit den klinischen Beobachtungen am Menschen übereinstimmen, verfärbt sich bei der Einathmung von Salzsäuredämpfen die Nasenschleimhaut zuerst mehr blass- dann dunkellividroth; in den folgenden Tagen entwickelt sich ein eitriger Nasenkatarrh, während gleichzeitig grössere und kleinere Partien des Septum bald einer trockenen Nekrose bald einer feuchten Gangrän anheimfallen. Die trockene Nekrose ist häufiger, die Theile werden vollständig hart und lederartig und endlich durch demarkirende Entzündung abgestossen; gleichzeitig zeigen auch die vordern Partien der Muscheln eine sehr starke Blutüberfüllung und eine schwärzliche Farbe; nach Ausheilung solch' hochgradiger gangränöser Zerstörungen kommt es zu narbigen Schrumpfungen und Verengerung des Naseneingangs. Die Wirkung der Ammoniakdämpfe ist eine weniger intensive; Lehmann konnte zwar gleichfalls katarrhalisch-eitrige Rhinitis mit Blutungen erzeugen, aber niemals Nekrose und Gangrän, wie bei Einathmung von Salzsäure.

Der Verlauf der acuten Rhinitis erstreckt sich in der Regel auf 3—8 Tage, doch können bei besonderer Intensität auch 14 Tage ja selbst 4—6 Wochen bis zur völligen Heilung vergehen. Zu den häufigeren Complicationen gehört die Entzündung der Nebenhöhlen, so namentlich des Sinus frontalis, deren Symptome im letzten Capitel nachzusehen sind; seltener sind Empyeme der Nebenhöhlen oder der Orbita, wie solche von Schäfer und A. Hartmann beobachtet wurden; die im Verlaufe acuter und chronischer Rhinitis fast nie fehlenden Excoriationen geben durch Infection nicht selten zu Gesichtserysipel Anlass.

Die Diagnose unterliegt, wenn die Affection sich einmal entwickelt hat, keinen Schwierigkeiten, höchstens in Bezug auf ihre Aetiologie. Im Prodromalstadium sind die Allgemeinerscheinungen zuweilen so heftig, dass der Ausbruch einer schweren Krankheit, namentlich eines acuten Exanthemes oder einer Gehirnaffection befürchtet werden kann. Bei Neugeborenen denke man an die Möglichkeit hereditärer Syphilis.

Die Prognose ist günstig, doch kann Schwerhörigkeit und Ohrenfluss zurückbleiben, oder die Affection chronisch werden und dadurch zu polypoiden Wucherungen und Neubildungen Anlass geben. Tödtlicher Ausgang kommt nur bei Kindern oder decrepiden alten Leuten, oder wie in dem Schäfer'schen Falle von Orbitalabscess durch Meningitis vor.

Die Behandlung besteht zum Theile in der Prophylaxe. Hinsichtlich der Beseitigung der katarrhalischen Disposition muss auf das bei der Pharyngitis acuta Gesagte verwiesen werden. Arbeiter,

welche mit staubenden Substanzen namentlich mit den oben erwähnten Chemikalien zu thun haben, müssen ihre Nasenschleimhaut durch Wattetampons schützen; Syphilitische oder Kropfkranke müssen sofort nach den ersten Erscheinungen des Jodschnupfens das Medicament aussetzen. Zahllos und sehr beliebt sind die Abortivmittel; so namentlich Senfteige im Nacken, heisse Fussbäder, Schwitzcuren, Dampfbäder und das Hager-Brand'sche Olfactorium (Acid. carbol., Liq. ammon. caust. aa 5·0, Spir. vini 15·0, Aq. dest. 10·0). 5—10 Tropfen desselben werden auf ein Taschentuch oder einen Schwamm oder Trichter von Fliesspapier gegossen und zweistündlich mehrere Minuten lang eingeathmet. Auch Inhalationen von Chloroform, Ol. terebinth., Kampher, Insufflationen von Arg. nitr., Salicylsäure, Morphium, sowie innerlich Apomorphin oder Atropin wurden empfohlen. Das beste Mittel ist unstreitig das Cocain; in 3—10% Lösung instillirt beseitigt es nicht nur das lästigste Symptom, die Verstopfung, innerhalb weniger Minuten für viele Stunden, sondern kürzt den Verlauf auch merklich ab. Moure empfiehlt ein Schnupfpulver aus Cocain 0·2, Morph. 0·05, Res. Bens. pulv. 0·25, Magist. Bism. 10·0. Wunder darf man freilich auch von ihm keine erwarten. Nasendouchen namentlich solche mit Salz werden meist schlecht vertragen oder verschlimmern das Uebel. Bei Mitbetheiligung der Nebenhöhlen sind Einathmungen warmer Dämpfe eventuell warme oder kalte Umschläge auf Stirne und Nasenrücken, Blutegel, Bettruhe, Diät, Ableitung auf den Darm und die Haut indicirt, eventuell die Luftdouche; bei heftiger Conjunctivitis Schutzverband und Einträufelungen von Zinc. sulf. etc., bei Ohrerscheinungen Luftdouche, wenn nöthig Paracentese des Trommelfells. Säuglingen muss die Muttermilch mit dem Löffel gereicht, eventuell mit dem Schlundrohre beigebracht werden; auch ist es angezeigt, die oben erwähnten Mittel namentlich das Cocain in Anwendung zu bringen. Das Antrocknen der Secrete verhütet man durch Einträufeln und Bestreichen der Nasenlöcher mit Mandel- oder Olivenöl.

Eine Modification der acuten und subacuten Rhinitis ist der **purulente, eitrige Nasenkatarrh**, die **acute Nasenblennorrhoe.**

Man versteht darunter nicht jede mit Eitersecretion einhergehende Nasenaffection, sondern den acut beginnenden und von Anfang an mit eitriger Secretion verlaufenden Nasenkatarrh.

Als Ursachen desselben müssen in erster Linie specifische Infectionsstoffe betrachtet werden, welche direct auf die Nasenschleimhaut einwirken. Moldenhauer's Ausspruch, diese Ansicht sei mehr theoretisch construirt, als durch die Erfahrung bewiesen, wird durch mehrfache Literaturangaben widerlegt. So ist z. B. bei Erwachsenen die Infection der Nase mit Trippergift sicher constatirt; dasselbe gelangt entweder durch die mit Trippersecret verunreinigten Finger oder Taschentücher, an denen das Secret haftet, oder durch widernatürliche Verirrungen auf die Nasenschleimhaut, um dort dieselben Veränderungen wie auf der Schleimhaut der Urethra oder der Con-

junctiva hervorzubringen. Nicht gar so selten ist ferner der purulente Nasenkatarrh bei Neugeborenen; er beruht, wie auch Ziem hervorhebt, auf Infection mit dem leukorrhoischen Secret der mütterlichen Scheide. M. Mackenzie hält es nicht für unmöglich, dass auch der irritirende Einfluss der Atmosphäre sowie das Eindringen von Seifenwasser bei unvorsichtiger Waschung die Affection hervorrufen könne. Auch im Verlaufe acuter Infectionskrankheiten, so namentlich der Masern, des Scharlachs, der Diphtherie, der Variola oder in Folge der Fortpflanzung eitriger Conjunctivalkatarrhe und endlich auch durch unbekannte Einflüsse kommt es zu acuter Nasenblennorrhoe.

Die Symptome sind bis auf die schon von Beginn an eitrige Beschaffenheit des Secretes dieselben wie beim gewöhnlichen Schnupfen; das Secret ist fötid, dünnflüssig, schmierig, käsig und blutig tingirt; nicht selten werden Augen und Ohren inficirt, Nasenlöcher und Oberlippe excoriirt. Die Schleimhaut ist hochgradig geschwellt und geröthet, erodirt und mit oberflächlichen Geschwüren versehen.

Die Diagnose stützt sich hauptsächlich auf den Nachweis der erwähnten Schädlichkeiten; Verwechslungen mit Diphtherie hauptsächlich aber mit syphilitischem Katarrh, Reizung durch Fremdkörper, sind zuweilen erst nach genauerer Beobachtung zu vermeiden.

Der Verlauf ist meist ein sehr langwieriger; die Prognose nur bei Säuglingen ernst, auch können mancherlei Complicationen, eitrige Entzündungen der Nebenhöhlen, Gesichtserysipel, Meningitis etc. auftreten.

Eine erfolgreiche Behandlung ist ohne Nasendouche kaum möglich; es empfehlen sich ausser den Resolventien besonders die Desinficientia, namentlich Borsäure, Carbol, Resorcin, bei Erwachsenen Kali chloricum; auch Insufflationen dieser Stoffe sowie mit Argent. nitr., Alaun 0·3 : 30·0, Amylum, Zinc. sulfur. 0·1 : 30·0 sind zu versuchen. Da die Nasendouche bei Säuglingen und sehr kleinen Kindern gefährlich ist, so empfiehlt M. Mackenzie vor Reinigung der Nase die temporäre Tamponade der Choanen mittelst eines kleinen Stückes Schwamm, welche Manipulation aber leichter anzurathen als auszuführen ist.

Rhinitis chronica.

Als Ursachen des chronischen Nasenkatarrhs müssen in erster Linie recidivirende acute Katarrhe, besonders jene, welche nach acuten Infectionskrankheiten zurückbleiben, angeschuldigt werden. Ein grosses Contingent stellt ferner die Scrophulose, insoferne als Scrophulöse nicht nur in besonderem Masse zu Nasenkatarrhen disponirt sind, sondern auch weil acute Schnupfen bei ihnen leichter als bei Gesunden die Tendenz haben, chronisch zu werden. Dass auch Personen, welche der Einathmung organischen und unorganischen Staubes ausgesetzt sind, nicht selten an chronischem Schnupfen leiden, lehrt die Erfahrung, ebenso dass sich derselbe mit besonderer Vorliebe in miss-

bildeten oder durch Septumdeviation verengten Nasen etablirt. Von Manchen wird auf die Heredität hingewiesen, ebenso auf die Entstehung der chronischen Rhinitis in Folge adenoider Wucherungen und Tonsillarhypertrophie; Manche wollen auch geistige und sexuelle Erregungen, Menstruation und Schwangerschaft, gichtische und rheumatische Diathese sowie allgemeine Plethora und den Alkoholismus verantwortlich machen.

Das anatomische Substrat der chronischen Rhinitis ist die Hypertrophie der Schleimhaut, welche entweder die ganze Mucosa oder nur einzelne Theile treffen kann; an derselben nehmen in hochgradigeren Fällen besonders das submucöse Bindegewebe und die Drüsen Theil; äusserst häufig kommt es zu tumorartigen Auswüchsen und warzigen, polypoiden Wucherungen (Rhinitis chronica hypertrophica). Die Hypertrophie der Schleimhaut kann unbegrenzte Zeit dauern, aber auch mit Atrophie enden (Rhinitis chronica atrophicans).

Der geringste Grad der **Rhinitis chronica hypertrophica** äussert sich als diffuse Röthung und sammtartige Schwellung der Schleimhaut (Rhinitis chronica simplex). Sie betrifft theils das Septum theils die Muscheln, meist beide; nirgends ist eine auffallende Verdickung der Mucosa vorhanden. Nicht selten ist mit diesen geringfügigen objectiven Veränderungen eine äusserst lästige, häufig und plötzlich eintretende und oft stundenlang anhaltende Verstopfung einer oder beider Nasenhöhlen verbunden. Dieselbe beruht, wie man sich durch Inspection überzeugen kann, auf einer prallen Füllung des cavernösen Gewebes, welche sowohl spontan als auch nach Cocainisirung wieder zurückgeht. Wenn auch die Schwellbarkeit der Schleimhaut im Allgemeinen und bis zu einem gewissen Grade als eine nützliche Einrichtung und eine Schutzmauer der Natur gegen eindringende Schädlichkeiten betrachtet werden kann, so muss dieselbe doch, wenn sie schon auf die geringste Veranlassung hin und in excessiver Weise auftritt, als ein pathologischer Zustand bezeichnet werden, dessen Beseitigung von den damit Behafteten dringend verlangt wird. (Das Nähere siehe im Capitel Reflexneurosen.)

Bei sehr langer Dauer, zuweilen erst nach vielen Jahren, kommt es zu beträchtlicherer Hypertrophie der Schleimhaut.

Weitaus am häufigsten wird die untere Muschel ergriffen; ihr vorderes Ende ist in eine bald normal gefärbte, bald anämische, bald lividrothe, halbkugelige oder birnförmige, glatte Geschwulst umgewandelt, welche den untern Nasengang mehr oder weniger verlegt, das Septum berührt oder aus der Nasenöffnung heraustritt. In ähnlicher Weise ist meistens auch das hintere Ende der Muschel verändert; es stellt eine blassgraue oder grauröthliche, blasenartige, sehr oft zottige, warzige oder auch himbeer- oder froschlaichartige, die Choane ausfüllende und noch weit in den Nasenrachenraum hineinragende Geschwulst vor, deren Basis den ganzen Umfang der untern Muschel einnimmt. (Figur 11.) Gleichzeitig, doch auch öfters allein, wird die ganze untere Muschel oder ein Theil derselben, namentlich der nach unten und innen schauende freie Rand ergriffen; seine Schleimhaut hängt dann

entweder als glatter, blaurother oder auch blasser Sack auf den Nasenboden herab oder erscheint gekerbt, mit Einschnitten versehen und deutlich papillomatös. Die hypertrophischen Partien heben sich nach der Cocainisirung deutlich von ihrer Umgebung und dem retrahirten Schwellgewebe ab. Fast ebenso oft wie die untere wird die mittlere Muschel ergriffen; namentlich die Schleimhaut des vorderen Endes ist bald gleichmässig verdickt, glatt und kugelig oder plattlappig, bald uneben, höckerig, gekörnt und warzig. Nicht selten zeigt auch das Septum circumscripte oder diffuse Schleimhauthypertrophien, bald an dem untern in den Nasenboden übergehenden Theile, bald in der Mitte gegenüber dem vordern Ende der mittleren Muschel, bald an seinem hintersten untern Ende. Relativ am seltensten zeigt sich der Nasenboden verändert; zuweilen berührt seine hypertrophische Schleimhaut die untere Muschel, sehr selten zeigt sie warzige oder körnige Beschaffenheit. Combinationen mit Schleimpolypen sind äusserst häufig.

Fig. 11. Einfache und polypoide Hypertrophie der hinteren Muschelenden.

Es scheint, dass zuweilen auch die Nasenknochen und Knorpel an der Hypertrophie theilnehmen. Nach Bryson Delavan gehört die Hypertrophie der knöchernen Muscheln, besonders bei Deviation des Septum, zu den häufigen Vorkommnissen. Hypertrophie des knorpeligen Septum sah Verfasser mehrmals unter seinen Augen sich entwickeln; nach Gottstein ist das Septum häufig der Sitz einer chronischen äusserst schleichend verlaufenden zu Hypertrophie führenden Perichondritis.

Das Secret zeigt mannigfache Variationen. In den mit sammtartiger Schwellung der Schleimhaut einhergehenden frischeren Fällen ist dasselbe dünnflüssig, wässerig, oft äusserst copiös wie bei acuter Coryza. In andern Fällen ist dasselbe weniger reichlich, schleimig, zähe, äusserst mucinreich, von gelber bis grünlicher Farbe und mehr schleimig-eitrig; oft vertrocknet es am Naseneingang, dem Septum und den vordern Enden der Muscheln zu gelben Krusten und Borken, welche, gewaltsam entfernt, bluten und zu eczematösen oder herpetischen Excoriationen und entzündlichen Infiltraten der Nasenflügel

Anlass geben. Rein eitriges Secret kommt nach des Verfassers Beobachtung bei der idiopathisch-hypertrophischen Form äusserst selten, eitrig-fötides nur bei gleichzeitiger Erkrankung der Nebenhöhlen vor.

Eine häufige Begleiterin der chronischen Rhinitis ist der chronische Nasenrachenkatarrh mit oder ohne Hypertrophie der Rachenmandel, ferner die Pharyngitis granulosa, die Hypertrophie der Gaumenmandeln und der Seitenstränge; auch die Nebenhöhlen der Nase, so namentlich die Kiefer- und die Stirnbeinhöhlen, sowie die Tuben und das Mittelohr nehmen zuweilen an der Entzündung Antheil.

Die Symptome der hyperplastischen Rhinitis beziehen sich hauptsächlich auf die Behinderung der nasalen Respiration. Der Verschluss der Nase ist ein dauernder oder zeitweiser; das letztere ist häufiger und theils durch Ansammlung von Secret, theils durch pralle Füllung des erectilen Gewebes bedingt; sehr oft fehlen bei Tag die Beschwerden und treten Nachts in heftigster Weise auf. Je hochgradiger die Nase obstruirt ist, um so stärker sind die Störungen des Geruchs und des Geschmackes, doch kann auch bei partieller Schwellung namentlich der Regio olfactoria völlige Anosmie vorhanden sein. Nasales Timbre der Stimme, Offenhalten des Mundes, Trockenheit der Zunge mit fadem, pappigem Geschmacke, unruhiger durch wilde Träume gestörter Schlaf (Alpdrücken), sind weitere Folgen der nasalen Obstruction. Sehr häufig sind Gehörstörungen vom einfachen Ohrensausen bis zu den schwersten Entzündungen des Mittelohrs. Bei Mitbetheiligung des Rachens ist Würgen und Erbrechen besonders am Morgen, zuweilen auch Husten vorhanden. Grosse Beschwerden verursacht die Entfernung des reichlich secernirten zähen Schleims, auch wird bei Excoriationen und Infiltraten am Nasenflügel das Schneuzen schmerzhaft. Sowohl in Folge des heftigen Schneuzens, Schnüffelns und Bohrens in der Nase als auch spontan in Folge der Congestionirung der Schleimhaut stellt sich Nasenbluten ein, das namentlich von Bresgen als ein häufiges Symptom der chronischen Rhinitis betrachtet wird. Die Röthung und Schwellung der Nasenspitze, auf die wir im Capitel Reflexneurosen zurückkommen werden, ist gleichfalls eine ziemlich häufige Begleiterin der chronischen Rhinitis; sie ist wohl meist die Folge von Reizen oder Stauungsvorgängen, welche durch den Druck der intumescirten Schleimhaut und der Schwellkörper hervorgerufen werden und den normalen Rückfluss des Blutes verhindern.

Zu den fast constanten Erscheinungen gehören ferner Druck auf die Augen, Eingenommenheit des Kopfes, Unlust und Unfähigkeit zu geistiger Arbeit, Abnahme des Gedächtnisses, Niesreiz, ein Gefühl von Jucken, Kriebeln und Brennen in der Nase. Auch Erkrankungen des Thränennasenganges haben nicht selten ihren Grund in der Verlegung des Ausführungsganges durch Schleimhauthypertrophie. Sehr häufige Begleiterscheinungen der chronischen Rhinitis sind endlich auch noch die Reflexneurosen, deren detaillirte Schilderung sich am Schlusse des Buches findet.

Die Diagnose der chronischen Rhinitis unterliegt bei sorgfältiger Untersuchung keinen Schwierigkeiten; absolut nöthig ist die Sondirung und Cocainisirung; nicht jede Schleimhautpartie, namentlich nicht an den untern Muscheln, welche eine teigige Beschaffenheit hat, oder sich mit der Sonde eindrücken oder verschieben lässt, ist, wie sich seit Einführung des Cocains herausgestellt hat, ohne Weiteres als hypertrophisch zu betrachten; nur wenn sich die betreffende Stelle durch Cocain wenig oder gar nicht verkleinert, sondern sich von dem retrahirten Schwellgewebe deutlich abhebt, hat man das Recht, von wirklicher Hypertrophie zu sprechen; damit ist aber nicht gesagt, dass jede Schleimhaut, welche durch Cocain zur Retraction gebracht werden kann, völlig normal oder an den Erscheinungen der Obturation unbetheiligt ist. Von diagnostischem Werthe ist das Verhalten der Schwellkörper insoferne, als ihr An- und Abschwellen bei geringfügigen Reizen ebenso als ein Symptom gesteigerter Reflexerregbarkeit betrachtet werden muss, wie das Auftreten von Niesanfällen, Thränenträufeln oder Husten bei Sondenberührung anderer Schleimhautstellen.

Die Prognose der chronischen hypertrophischen Rhinitis ist im Allgemeinen eine gute, da bei genügender Ausdauer die Kranken grösstentheils von ihren Beschwerden, so besonders den durch die Obstruction hervorgerufenen, befreit werden können. In Bezug auf die Beseitigung der Reflexneurosen, namentlich des Asthma (vergl. dieses Capitel), ist die Prognose zweifelhaft zu stellen.

Behandlung. Für die mildesten Formen der chronischen Rhinitis empfehlen sich nach vorheriger Reinigung der Nase mit resolvirenden Mitteln Insufflationen von Arg. nitr.; man beginne mit Arg. nitr. 0·05 : 10·0 Amylum und steige allmählich auf 0·1 bis 0·5 : 10·0; eine Portion dieser Mischung, etwa 0·2, wird abwechselnd in die eine und in die andere Nasenhöhle insufflirt, da die Reaction bei doppelseitiger Insufflation eine zu heftige sein würde; auch andere Adstringentia, wie Alaun oder das von Schäffer in die Praxis eingeführte Aluminium acetico-tartaricum, Bismuth, Tannin, Zinc. sulfur. sind zu versuchen. Porter will von der Insufflation eines aus Kampher, Salicylsäure und Tannin bestehenden Pulvers günstige Erfolge gesehen haben, Gottstein von Salicylsäure 1 : 10 Theilen Magnesia usta. M. Mackenzie empfiehlt die Nasendouche mit dem alkalinischen Nasenwasser, das in Pulverform verschrieben wird, aus Natr. bicarb., Borax, Natr. chlorat. āā 0·4, Sacch. alb. 1·0 besteht und jedesmal in einem halben Glase lauwarmen Wassers aufgelöst wird. Auch Nasendouchen mit Acid. tann. 0·1 : 30·0 Wasser oder Alaun 0·2 : 30·0, sowie der Tanninspray 0·2 : 30·0, werden von M. Mackenzie als ganz besonders wirksam bezeichnet.

In einzelnen Fällen erweisen sich nützlich medicamentöse Bougies, die aus Cupr. sulf. 0·1—0·3 oder Zinc. sulf. 0·2 oder Bismuth. nitric. 0·3 und Gelatoglycerin 2·5 bestehen. Die Behandlung des Eczems des Naseneinganges ist in dem Capitel Rhinitis exsudativa nachzusehen.

Mittelgradige Schleimhauthypertrophien werden am einfachsten durch Chromsäure beseitigt; hochgradige, namentlich schon länger

bestehende oder sehr resistente, weichen nur der Galvanokaustik; diese passt auch für alle jene Fälle, bei welchen die Krankheitssymptome durch abnorme Schwellbarkeit des cavernösen Gewebes hervorgerufen werden.

Polypoide Wucherungen, die einigermassen gestielt aufsitzen, werden mit der kalten oder heissen Schlinge entfernt; recht schwierig und zeitraubend ist meist die Entfernung flacher und breitaufsitzender Wucherungen und diffuser Schleimhauthypertrophien; beträchtlichere Hypertrophie der vordern Muschelenden operirt Verfasser nur mittelst der Glühschlinge, ebenso die auf den Nasenboden herabhängenden schlaffen Schleimhautpartien; die der Amputation der vorderen Muschelenden meist folgende heftige Blutung stillt man am sichersten durch die vordere Tamponade. Hack empfiehlt zur Vermeidung der Blutung die galvanokaustische Stichelung und das Furchenziehen; bei ersterer wird ein spitzer Galvanokauter tief und wiederholt möglichst nahe nebeneinander in die zu zerstörende Partie eingestochen, während bei letzterer derselbe nur an einer Stelle eingesenkt und von da durch die ganze erkrankte Partie in glühendem Zustand durchgezogen wird. Noch wirksamer ist die submucöse Cauterisation, bei der ein spitziger Brenner eingestochen und unter der Schleimhaut, also im cavernösen Gewebe selbst, vorgeschoben wird. Dieses Verfahren empfiehlt sich ganz besonders zur Erzeugung constringirender Narben bei abnormer Schwellbarkeit des erectilen Gewebes.

Eine schwierige Operation ist zuweilen die Amputation der hypertrophischen hintern Muschelenden. Die Einen benützen dazu die kalte Schlinge oder den Jarvis'schen Ecraseur, während Verfasser der Sicherheit wegen der Glühschlinge den Vorzug gibt; gelingt das Erfassen mit der Schlinge selbst nach Einführen des Fingers in den Rachen nicht, dann werden Flachbrenner applicirt. Die mehrfach empfohlenen Schutzvorrichtungen „Nasenschilde" versperren das Operationsfeld und sind für den Geübteren unnöthig.

In Bezug auf die Behandlung der Reflexneurosen, üble Zufälle, Reaction und Nachbehandlung, wird auf die Capitel Reflexneurosen und Neubildungen verwiesen. Eine absolute Contraindication der galvanokaustischen Behandlung ist die Schwangerschaft, da sehr leicht Abortus herbeigeführt wird. Es ist natürlich, dass Gehörstörungen, Blutungen, Rachenkatarrhe, adenoide Wucherungen, Scrophulose, Anämie, Neurasthenie, nach den allgemein giltigen Principien behandelt werden müssen.

Wie die chronische Entzündung der Rachenschleimhaut so kann auch die der Nase mit Atrophie enden (**Rhinitis chronica atrophica**).

Ob die Atrophie immer das Endstadium der Hypertrophie ist, oder ob sie nicht gleich von Anfang an die gesunde Schleimhaut befallen kann, ist noch nicht endgiltig entschieden; doch sprechen zahlreiche anatomische und klinische Beobachtungen dafür, dass der Atrophie meist ein hyperplastisches Stadium der Schleimhaut vorausgeht. Dafür spricht namentlich das von Gottstein und auch vom Verfasser wiederholt beobachtete gleichzeitige Vorkommen circumscripter hyper-

trophischer Partien neben diffusen atrophischen. Die Hypertrophie der Schleimhaut braucht durchaus keine auffallende zu sein, im Gegentheil geben Katarrhe mit geringer, diffuser, sammtartiger Auflockerung der Schleimhaut namentlich bei bestehenden Constitutionsanomalien am häufigsten zu Ozaena simplex Anlass. Dass eine mit beträchtlicher Hypertrophie der Schleimhaut oder gar mit polypoiden Wucherungen der Muscheln einhergehende Rhinitis mit Atrophie endet, hat noch Niemand behauptet. Die Atrophie betrifft sämmtliche die Schleimhaut constituirende Elemente, das Epithel, die Drüsen, das Schwellgewebe, ja selbst die Knochen; die Drüsen schwinden an Zahl und Grösse, die Schleimhaut wird in faseriges Bindegewebe umgewandelt.

Das constanteste und sicherste objective Symptom der atrophischen Rhinitis ist die abnorme Weite der Nasenhöhle. Die Muscheln, namentlich die unteren, erscheinen ausserordentlich klein, in schmale, ovale oder abgeplattete Leisten umgewandelt, die unteren Nasengänge abnorm geräumig; bei Atrophie der mittleren Muschel wird zuweilen der halbmondförmige Raum ja sogar die Oeffnung der Keilbeinhöhle sichtbar. Der Einblick in den Nasenrachenraum ist sehr erleichtert und erblickt man in der Regel nicht nur die Tubenwülste, sondern auch die Tubenmündungen und ein grosses zwischen denselben liegendes Stück der Hinterwand. Die atrophische vom Secret gereinigte Schleimhaut ist zuweilen leicht geröthet, öfters blass oder von pergamentartigem Aussehen. Ulcerationen oder Zerstörungen der Knorpel oder Knochen kommen nicht vor, höchstens oberflächliche durch Kratzen, Bohren etc. erzeugte Excoriationen am Naseneingang oder Septum. Die constante Begleiterin des atrophischen Nasenkatarrhs ist die Pharyngitis sicca, welche sich zwar meist auf den Nasenrachenraum localisirt, doch auch auf die Pars oralis fortsetzen kann.

Eine eigenthümliche Modification der chronischen atrophischen Rhinitis ist die in Bessarabien, Galizien, Polen und Südrussland endemisch herrschende von Störk beschriebene Blennorrhoe der Respirationsschleimhaut, welche in der Nase beginnend allmählich, oft erst nach Jahren, auf Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, ja selbst Bronchien weiterschreitet, und durch Bindegewebswucherung und -Schrumpfung, Ossification der Knorpel, Verwachsung der Stimmbänder, lebensgefährliche Stenose erzeugt.

Einige Beobachter, wie Bournonville, Cozzolino etc. erwähnen noch eine weitere Modification der atrophischen Rhinitis, nämlich die Coryza caseosa; sie soll sich durch Anhäufung einer weichen, weissröthlichen, schmierigen Masse charakterisiren, welche sich meist nur in einer Nasenhöhle zeigt und einen äusserst ekelhaften Gestank verbreitet; nach Entfernung der Massen soll die Schleimhaut das Aussehen einer pyogenen Membran haben und sollen die käsigen Massen zuweilen in die Nebenhöhlen eindringen und dort Eiterung erzeugen. Nach des Verfassers Erfahrung handelt es sich in solchen Fällen stets um eine Combination mit Nebenhöhlenerkrankung; das käsige Secret stammt weniger aus der Nase, als vielmehr aus dem erkrankten Sinus.

Das Secret der atrophischen Rhinitis ist entweder sulzig, wie Kleister oder Sago, oder eitrig, im frischen Zustande gelb, grün, rahmartig, weshalb die Krankheit auch als chronische Nasenblennorrhoe bezeichnet wird. Es besitzt in hohem Grade die Eigenschaft, in kurzer Zeit zu festen, gelbgrünen, schmutzig-grünen oder braunen, die ganze Nasenschleimhaut wie eine Tapete überziehenden Borken und fingerlangen Krusten einzutrocknen, und einen charakteristischen äusserst penetranten Foetor anzunehmen (Kakosmia objectiva). Wenn auch nicht jeder atrophische Nasenkatarrh mit Foetor verbunden ist, so wird derselbe doch in der Mehrzahl der ausgebildeteren Fälle nicht vermisst. Diese Form ist es, welche früher „Ozaena" genannt wurde, jetzt als „genuine Ozaena" oder als Ozaena simplex, Rhinitis chronica atrophicans foetida bezeichnet wird.

Das Wesen der Ozaena simplex besteht nach Habermann in einer fettigen Degeneration der Drüsenepithelien, und zwar nicht nur der Bowmann'schen sondern auch der acinösen Drüsen der Nase und wahrscheinlich auch der infiltrirten Schleimhaut. Die Umwandlung der Schleimhaut in faseriges Bindegewebe und die Schrumpfung hält Habermann erst für eine Folge der Drüsenaffection, für eine Reaction des gesunden Gewebes gegen die Erkrankung. Mikroorganismen konnte dieser Autor in den erkrankten Geweben nicht auffinden.

Das Secret der genuinen Ozaena wird von Einigen für infectiös gehalten; Verfasser, der bisher noch niemals eine Ansteckung sah, muss die Infectiosität leugnen; erwiesen ist dieselbe nur bei der Störk'schen Blennorrhoe, welche den ungünstigsten hygienischen und socialen Verhältnissen und der namenlosen Unreinlichkeit der Bewohner der obenerwähnten Länder ihre Entstehung und Verbreitung verdankt.

Als Ursache der fötiden Rhinitis wird von Löwenberg ein specifischer Coccus, der Ozaenacoccus, betrachtet; seine Specifität muss aber um so mehr bezweifelt werden, als die Nase der Tummelplatz unzähliger Mikroparasiten sogar der Pneumoniococcen ist. Aetiologisch spielen ausser der Heredität, Anomalien der Blutmischung und Dyskrasien sicher die erste wenn auch nicht einzige Rolle; ganz besonders gilt dies von der Scrophulose, deren Residuen freilich zu der Zeit, in welcher die Ozaenakranken gewöhnlich in Behandlung kommen, längst geschwunden oder nur noch spurenweise zu erkennen sind. Warum die Nasenkatarrhe der Scrophulösen so leicht atrophisch werden, ist noch nicht aufgeklärt. Dass auch ganz Gesunde von genuiner Ozaena befallen werden, ist nur theilweise richtig; Verfasser erinnert sich keines einzigen Falles von genuiner Ozaena, deren Träger nicht Zeichen von Anämie, Chlorose, Scrophulose, Tuberkulose oder Muskelschwäche, mangelhafter Entwicklung, schwächlicher Constitution, aufzuweisen gehabt hätte. Damit stimmt auch die neuerdings von Löri ausgesprochene Ansicht, dass atrophisirende Katarrhe der Nase, des Rachens und Kehlkopfes als nahezu constante Symptome einer Marasmus bedingenden Krankheit, so namentlich der fettigen Degene-

ration des Herzens, des Diabetes, des Morb. Brigthii, bösartiger Neubildungen etc. zu betrachten seien.

Zuweilen entwickelt sich die atrophische Rhinitis nach Masern, Scharlach und Diphtherie, Typhus oder schweren Wochenbetten, also wiederum nach Krankheiten, welche die Ernährung und Blutmischung alteriren. Dass weites Offenstehen der Nasenlöcher, Richtung derselben nach vorne, Mangel der Haare am Naseneingange, Verkrümmungen, Auswüchse und Perforationen des Septum, angeborene Kleinheit der Muscheln, die Ursachen der genuinen Ozaena seien, ist unrichtig, dass feuchte moderige Wohnungen die Entstehung derselben begünstigen, nicht von der Hand zu weisen. Eine ganz auffallende Disposition besitzt das weibliche Geschlecht, und zwar stellt das Alter von 10 bis 20 Jahren, namentlich die Zeit der Pubertät, die meisten Fälle. Jenseits der zwanziger Jahre sah Verfasser das Leiden nur zweimal sich entwickeln, einmal bei einer exquisit chlorotischen Dame nach der Exstirpation zahlreicher Schleimpolypen, das andere Mal bei einer Frau, welche durch ein Uterinleiden sehr herabgekommen war. Auch M. Mackenzie betont ausdrücklich die grosse Seltenheit trockener Katarrhe bei Erwachsenen.

Sehr häufig sieht man atrophische fötide oder nicht fötide Rhinitis zurückbleiben nach Heilung schwerer und ausgebreiteter Nasensyphilis. Die Ursache davon liegt in der Schrumpfung der gummös und entzündlich infiltrirt gewesenen Schleimhaut sowie in der Umwandlung der ulcerirten Stellen in narbiges Bindegewebe. Trüge die Bespülung der Schleimhaut mit Eiter, wie Moldenhauer angibt, die Schuld, dann müsste jede Nebenhöhleneiterung atrophische Rhinitis zur Folge haben, was bekanntlich nicht der Fall ist.

Keine Frage ist in den letzten Jahren häufiger und heftiger discutirt worden, als die nach der Ursache des Fötor.

Einige erblicken in der durch die Atrophie erzeugten abnormen Weite der Nasenhöhle die Ursache des Gestankes und weisen auf die rasche Vertrocknung und schwierige Entfernung der Secrete hin, welche durch ihr Liegenbleiben fötid würden; dass die Weite der Nasengänge allein nicht die Ursache des Fötors sein kann, widerlegt sich aus der Thatsache, dass oft trotz derselben kein Fötor vorhanden ist; Andere sehen als Ursache des Fötor die Atrophie der Schleimhaut und fettige Degeneration der Schleimkörperchen mit Bildung von Fettsäuren an; diesen wird entgegengehalten, dass der Fötor nicht nur bei atrophischer sondern auch bei hypertrophischer Schleimhaut beobachtet werde. Nach Ziem soll zur Entstehung des Gestankes ein Ferment nöthig sein, und wäre die Ueberladung der Nase und ihrer Nebenhöhlen mit Fäulnissgasen als Ursache des Fötor zu betrachten. Andere halten wiederum die in den vertrocknenden Secreten sich entwickelnden zahlreichen Mikroorganismen für die Ursache der Zersetzung und des üblen Geruches.

Höchst wahrscheinlich ist die physikalische und chemische durch die Atrophie der Schleimhaut veranlasste Veränderung des Secretes, namentlich der Wassermangel desselben, die Ursache des Fötors. Ver-

fasser sah wenigstens bis heute noch keine genuine Ozaena, bei der Atrophie der Schleimhaut, veränderte Secretion und abnorme Weite der Nase nicht vorhanden gewesen wären. Fötor bei Hypertrophie der Schleimhaut muss stets den Verdacht auf das Vorhandensein ulceröser Processe, namentlich von Syphilis oder von Erkrankungen der Nebenhöhlen oder von Fremdkörpern und Concrementen wachrufen.

Die subjectiven Erscheinungen der atrophischen Rhinitis bestehen in Störungen des Geruchs, Kopfschmerz, Druck auf die Augen, nasalem Timbre der Stimme, Schwerhörigkeit, Ohrensausen; ganz gewöhnlich sind Schlingbeschwerden und Räuspern in Folge des nie fehlenden trockenen Nasenrachenkatarrhs. Hinsichtlich der Verstopfung der Nase begegnet man mannigfachen Verschiedenheiten und grossem Wechsel; meist ist die Nase nur dann impermeabel, wenn die angetrockneten Secrete und Borken sehr mächtig sind; mit der Entfernung derselben wird die Nase sofort frei. Durch forcirte Versuche, die Secrete durch Schneuzen und Bohren mit den Fingern zu entfernen, kommt es zu Blutungen, welche den Borken eine bräunliche, schwarze Färbung verleihen. Kein Symptom ist aber charakteristischer als der Fötor; ein Vergleich mit anderen Gerüchen wie z. B. mit faulem Käse oder zerquetschten Wanzen (daher der Name Punaisie, wahrscheinlich verdorben aus Pus nez [Eiternase]), ist nicht zutreffend, er ist eben so eigenthümlich, dass, wer denselben nur einmal gerochen, ihn stets wiedererkennen wird. Während der Gestank dem Patienten wegen der Abnahme des Geruchs in der Regel unbemerkt bleibt, wird er um so empfindlicher von dessen Umgebung wahrgenommen, weshalb die bedauernswerthen Kranken gemieden und nicht selten aus ihrer socialen Stellung verdrängt und in ihrer Existenz geschädigt werden und so dem Trübsinn verfallen; von einer Verheirathung junger Mädchen kann unter solchen Umständen ohnehin kaum die Rede sein. Manche erwähnen auch eine charakteristische Veränderung der Gesichtszüge und der äussern Nase bei Ozaenakranken. Die erstere besteht in den Residuen der Scrophulose — dicken Lippen, Gedunsenheit der Wangen und Augen — die letztere in einer Verbreiterung der Nase und Eingesunkensein des Nasenrückens. Wenn es auch richtig ist, dass diese Merkmale bei Ozaenakranken häufig vorkommen, so kann doch kaum von einem „typischen Aussehen" die Rede sein.

Die stets mit Fötor verbundene Störk'sche Blennorhoe führt im weitern Verlaufe zu Heiserkeit, Stimmlosigkeit und Athemnoth. Die bei der hypertrophischen Rhinitis so häufigen Reflexneurosen können zwar auch bei der atrophischen Form vorkommen, sind aber nach des Verfassers Erfahrungen äusserst selten.

Die Diagnose der Rhinitis atrophica stützt sich einestheils auf die erwähnten objectiven und subjectiven Erscheinungen, anderntheils auf die Abwesenheit tiefer oder ausgebreiteter Ulcerationen, namentlich aber auf die Nichtbetheiligung des Knorpels und der Knochen. Sind letztere afficirt, dann kann von genuiner Ozaena keine

Rede mehr sein, wohl aber von Syphilis oder anderweitigen schweren früher als „symptomatische Ozaena" bezeichneten Affectionen.

Die Prognose der atrophischen Rhinitis namentlich der fötiden ist eine absolut ungünstige, da wir kein Mittel besitzen, die atrophische Schleimhaut zur Norm zurückzuführen und den Fötor radical und für immer zu beseitigen. In directem Gegensatz zu dieser von den meisten Autoren vertretenen Ansicht befindet sich Moure, der die atrophische Rhinitis für heilbar erklärt und sogar eine Regeneration atrophischer Partien und eine allmähliche Wiederherstellung des normalen Nasenlumens beobachtet haben will, vorausgesetzt dass Arzt und Patient sich in der Behandlung gleich ausdauernd erweisen; Verfasser kann, so lange er sich von der Richtigkeit der Moure'schen Ansicht nicht überzeugt hat, nur den Rath geben, den Angehörigen die absolute Unheilbarkeit der echten genuinen Ozaena von vornherein mitzutheilen, sie aber aufmerksam zu machen, dass man das lästigste Symptom, den Fötor, völlig verdecken und zeitweise beseitigen könne, und dass das Leiden sonst keinen schädigenden Einfluss auf das Leben oder Zerstörung der knöchernen Nase zur Folge habe. In letzterer Beziehung bietet die Störk'sche Blennorrhoe trübe Aussichten, besonders die mit Larynx- und Trachealstenose combinirten älteren Fälle.

Die Behandlung hat als erstes und oberstes Princip die Entfernung der Secrete zu betrachten. Dieselbe geschieht mittelst Nasendouche, wobei wegen der beträchtlichen Dicke und Zähigkeit der Borken grössere Wassermengen (pro die 2—4 Liter) und höherer Druck, am besten mittelst des Ballonspray oder der englischen oder Stempelspritze, angewendet werden müssen. Am geeignetsten erscheinen die Desinficientia, entweder 2—4% Borsäure, 1% Carbolsäure, Kalichloricum 1 Esslöffel voll auf 1 Liter Wasser oder Kali hypermanganicum 0·5 zu 1 Liter Wasser; auch Sublimat 0·5—1·0 : 1000 wurde neuerdings empfohlen; bei nicht fötider Rhinitis genügen Ausspülungen mit Kochsalz, Seesalz, Natr. bicarb., Emser Wasser etc., dem man einige Tropfen Jodtinctur beisetzen kann. Sehr empfehlenswerth erscheint nach Schäffer, V. Lange und Anderen das Aluminium acetico-tartaricum; von einer 20% Lösung werden 10 Tropfen bis zu einem Kaffeelöffel auf 1 Liter zur Spülung verwendet. Borken am Nasendache oder der mittleren Muschel, welche der Douche oder dem Spray trotzen, müssen mit der Pincette oder der Hartmann'schen Nasenbürste entfernt werden. In der Regel genügt eine zweimalige Reinigung am Morgen und am Abend. Andere Desinficientia, wie Resorcin (2 : 600), Thymol, Natr. benzoic., Natr. salicyl. leisten zwar nicht mehr wie die obengenannten, sind jedoch bei der langen Dauer der Krankheit nicht zu entbehren. Moure lässt zuerst die Nase mit einem Liter Schwefelwasser oder einer Lösung von Chlornatrium, Seesalz, Borax oder Natr. bicarb. reinigen und dann eine nochmalige Ausspritzung mit einer antiseptischen Lösung nachfolgen. (1 Esslöffel zu ½ Liter Wasser von: Acid. carbol. 20·0, Glycerini 100·0, Alcoh. vini 50·0, Aq. dest. 350·0.) In Amerika wird namentlich von

Lefferts die Ausspülung mit einem groben Nasenspray vorgezogen und dazu die „Listerine", ein aus Thymol, Eucalyptol, Mentha arvensis, Gaultheria und andern Stoffen bestehendes Mittel verwendet.

Die Therapie hat zweitens die Aufgabe, die Bildung neuer Borken zu verhindern; leider können wir derselben nur in beschränktem Masse nachkommen. Am ehesten gelingt es noch durch die Gottstein'sche Tamponade und die Insufflation reizender oder desinficirender Medicamente.

Wenn die Gottstein'sche Tamponade antihygienisch, fötorconservirend und verwerflich genannt wird, so beweist das nur, dass man den Zweck derselben vollständig verkennt. Der intendirte Zweck, durch leichte Reizung der Schleimhaut reichlichere, flüssigere Secretion zu erzielen, wird aber auf das Vollkommenste erreicht. Die Technik ist folgende: Ein circa fingerlanger, $^1/_2$—1 Centim. dicker Bruns'scher Wattetampon wird nach vorheriger gründlicher Entfernung der Secrete um eine kleine Schraube gewickelt und unter rotirenden von links nach rechts gerichteten Bewegungen in die zu tamponirende Nasenhöhle eingeführt; sodann wird durch Rotiren der Schraube von rechts nach links dieselbe entfernt und der Tampon mittelst einer Sonde möglichst hoch in die Nase hinaufgeschoben, um dortselbst einige Stunden liegen zu bleiben; oder es kann bei Tag die eine, bei Nacht die andere Nasenhälfte tamponirt werden. Salicylwatte, Jodoformgaze oder mit anderen Stoffen imprägnirte Watte hat keinen wesentlichen Vorzug. Die Kranken lernen sehr bald, sich selbst die Tampons einzulegen.

Die Anregung einer reichlicheren Secretion gelingt aber auch durch Insufflation reizender Pulver; das beste ist das Argentr. nitr. 0·1—1·0 : 10·0 Amylum; in England und Amerika sind Gummi rubrum 1 : 2 Amylum, Galanga, Sanguinaria, sehr beliebt, bei uns auch die Desinficientia in Pulverform, so namentlich die reine Borsäure, Resorcin, Salicylsäure, Jodoform und neuerdings das Alumin. acetico-tartar. und das Jodol, bei ausgesprochener Scrophulose Calomel 2·0, Hydrarg. präcip. rubr. 1·0, Amyl. 15·0, welche Substanzen nach Entfernung der Borken applicirt werden.

Ziem empfiehlt, sich stützend auf seine Theorie von der Ueberladung der Nase mit Fäulnissgasen als einfachste Behandlung die Ventilation der Nase; sie besteht darin, dass Patient nach Wegnahme aller beengender Kleider in der frischen Luft, womöglich an der See oder im Walde, alle paar Stunden möglichst tief durch die erkrankte Nase in- und exspirirt; ausserdem muss derselbe mit möglichst tiefen Athemzügen 1% Kochsalzlösung oder Ol. pini pumil., Ol. Eucalypti e foliis (Ol. Eucal. 2·0—5·0, Spir. vini 20·0, Aq. dest. 170·0) inhaliren; ferner sollen faulende Zahnstümpfe entfernt werden. Die galvanokaustische Behandlung erscheint dem Verfasser wegen der weiteren Umwandlung der Schleimhaut in Narbengewebe contraindicirt.

Die dritte Indication ist die Verbesserung der Constitution durch Leberthran, China, Eisen, Syr. ferri jodat., kräftige Kost, Aufenthalt auf dem Lande oder an der See.

Bei der Störk'schen Blennorrhoe hat die Behandlung ausser in den ebenerwähnten nasalen Methoden in Touchirungen des Kehlkopfes mit Lapis und Durchtrennung der verwachsenen Stimmbänder, in Excision stenosirender Narbenstränge, Einlegen der Schrötter'schen Bougies zu bestehen. Bei der oft in kürzester Zeit erfolgenden Wiederverwachsung bleibt nur noch die Tracheotomie übrig, die aber keinen Nutzen bringt, wenn auch die tieferen Partien der Trachea stenosirt sind.

Rhinitis phlegmonosa.

Wenn auch die Nase in Folge der straffen Anheftung der Schleimhaut an ihre knorpelige und knöcherne Unterlage wenig zu phlegmonösen Entzündungen disponirt ist, so werden solche doch zuweilen beobachtet.

Die Ursache liegt entweder in einer Steigerung des acuten Katarrhes, oder in einer Infection mit putriden Stoffen und pyogenen Coccen, oder in Verletzungen der Schleimhaut in Folge von Fremdkörpern, Traumen der äusseren Nase und operativen Eingriffen. Bekanntlich nimmt das Gesichtserysipel mit besonderer Vorliebe von der Nase aus, so hauptsächlich von Schrunden des Naseneinganges oder kleinen Excoriationen der Scheidewand, seinen Ursprung, auch gesellt sich Phlegmone gerne zu anderweitigen namentlich ulcerösen Erkrankungen und Affectionen der Knochen und Knorpel; zuweilen pflanzt sich die phlegmonöse Entzündung der Nebenhöhlen, so namentlich das Empyem des Sinus maxillaris, auf die Nasenhöhle fort.

Mit besonderer Vorliebe wird das Septum ergriffen. So sieht man im Beginne des Gesichtserysipel die Nasenscheidewand intensiv geröthet, glänzend, geschwellt, zuweilen sogar mit Blasen bedeckt oder es bilden sich nach Traumen oder anderen Ursachen theils acute theils chronische Anschwellungen — Septumabscesse —, durch welche die Scheidewand in einen fingerdicken ödematösen, blaurothen Wulst umgewandelt und die Nase verstopft wird. Derartige Intumescenzen fühlen sich Anfangs hart, später weich, ödematös, an und zeigen, wenn es zur Eiterung gekommen ist, deutliche Fluctuation. Auch die Haut der äusseren Nase, der Wangen, der Oberlippe, der Augenlider, nimmt an der Entzündung Theil und erscheint glänzend, geschwellt, ödematös, druckempfindlich und schmerzhaft. Sehr selten entwickelt sich die Phlegmone auf den Muscheln, und zwar in Form eines folliculären Abscesses, häufig dagegen am Naseneingang; auch können sich circumscripte Phlegmonen der Oberlippe in die Nase fortsetzen. Senkungsabscesse im Septum kommen am häufigsten in Folge syphilitisch-ulceröser Processe am Nasendache resp. dem vordersten obersten Theile der Lamina perpendicularis vor.

Die subjectiven Erscheinungen bestehen ausser in Fieber, brennenden, klopfenden und stechenden Schmerzen in der Nase, grosser Empfindlichkeit der Nasenspitze bei Berührung und beim Schneuzen, in

Stirnkopfweh, Ohrensausen, Schwindel, zuweilen in meningitischen Symptomen, Erbrechen, Trübung des Bewusstseins sowie in Verstopfung der Nase, vermehrter wässeriger oder schleimig-eitriger Secretion.

Der Verlauf der acuten Form ist meist ein rascher und kann sich dieselbe nach einigen Tagen zurückbilden oder mit Abscedirung enden; chronische, namentlich Senkungsabscesse, brauchen oft lange Zeit zu ihrer Entwicklung; sehr selten ist der tödtliche Ausgang durch Erysipel, Gehirnabscess, Thrombose, Meningitis. Nach Eröffnung des Abscesses kann es namentlich bei den vom Knochen ausgehenden Formen durch Caries und Nekrose zur Entstellung der Nase kommen.

Die Diagnose der diffusen phlegmonösen Rhinitis und der Septumabscesse stützt sich hauptsächlich auf den objectiven Befund; doch sind Verwechslungen mit anderen Processen, dem entzündlichen Oedem und namentlich der von Jurasz so benannten serösen Perichondritis der Nasenscheidewand möglich. Diese letztere sehr seltene Erkrankung entsteht zuweilen gleichzeitig oder im Verlaufe des Gesichtserysipels und besteht in der Ansammlung seröser Flüssigkeit zwischen Knorpel und Perichondrium; wird der Knorpel perforirt, so communiciren die beiderseitigen wassergefüllten Höhlen miteinander.

Die Therapie muss im Beginne eine energisch antiphlogistische sein; durch Auflegen von Eisblasen, Eiscompressen, Einspritzungen kalten Wassers, gelingt es zuweilen, die Ausbreitung der Entzündung zu verhindern und die Beschwerden zu lindern. Sobald sich Fluctuation zeigt, muss incidirt werden. Zieht sich die Erweichung in die Länge, dann sind Injectionen von warmem Wasser, verdünnter Milch, Camillenthee, sowie feuchtwarme Umschläge oder Inhalationen warmer Dämpfe angezeigt; nach Eröffnung des Abscesses empfiehlt sich die Douche mit Desinficientien.

Rhinitis exsudativa.

Wenn auch die Nase seltener als die Mundrachenhöhle von Exsudationsprocessen (Blasen, Pusteln) heimgesucht wird, so bleibt dieselbe doch nicht völlig verschont. Ein Lieblingssitz derselben ist der Naseneingang, die äussere und innere Fläche der Nasenflügel, das Septum und der Nasenboden.

Bläschen eruptionen an dieser Stelle gehören theils dem Herpes theils dem Eczem an. Der Herpes narium ist der häufige Begleiter acuter katarrhalischer sowie rheumatisch-febriler Zustände, wie sie bereits bei den Krankheiten der Mundhöhle geschildert wurden.

Als Eczem des Naseneinganges wird gewöhnlich eine Affection bezeichnet, die sehr verschiedenen Processen ihre Entstehung verdankt. Aeusserst häufig findet sich bei acuter und chronischer Rhinitis in Folge des reizenden Secretes und des häufigen Gebrauches des Taschentuches eine acute entzündliche Schwellung und Röthung des Naseneinganges, welche mit der Bildung von Bläschen — acutem Eczem — oder auch ohne dasselbe mit Excoriationen und Schrunden

einhergeht. Verläuft diese Affection chronisch, dann sind die Nasenöffnungen, das Septum, der Nasenboden bis zu den vorderen Enden der unteren Muscheln, theils mit dicken, gelben, eingetrockneten, die Nasenathmung mehr oder weniger behindernden Borken theils mit Bläschen und Pusteln oder nässenden Excoriationen bedeckt; die Nasenflügel sind stark infiltrirt, bei Berührung schmerzhaft, die Oberlippe geschwellt und zuweilen gleichfalls mit Bläschen oder Krusten besetzt. Nicht selten fehlen die Borken, und man bemerkt nach Kiesselbach nur eine kleienförmige Abschuppung. Bei Kindern handelt es sich, wie Moldenhauer mit Recht bemerkt, in solchen Fällen fast immer um wirkliches Eczem, entweder in Folge einer Rhinitis oder auf der Basis der Scrophulose, von der sich meist noch andere Symptome, wie Lymphadenitis, Conjunctivitis, Eczem der Ohrmuscheln oder des Kopfes und Gesichtes vorfinden. Bei Erwachsenen sind die erwähnten Erscheinungen am Naseneingang fast immer auf eine circumscripte Phlegmone, eine Entzündung und Verschwärung der Talg- und Haarfollikel, eine Acne oder Sycosis vibrissarum zurückzuführen. Sie beginnt in der Regel circumscript mit Knoten- und Pustelbildung um den Haarschaft, der andere benachbarte Haarbälge nachfolgen; durch das Platzen der Pusteln entstehen Borken, unter welchen die Eiterbildung fortdauert und die entzündliche Infiltration der Nasenspitze und Nasenflügel nach sich zieht. Unzweifelhaft gibt es aber auch Fälle, die mit Eczem beginnen und erst im weiteren Verlauf zu Sycosis führen.

Nach unvollständiger Heilung der eben besprochenen Affectionen oder auch in Folge der ätzenden Wirkung des Secretes bei acuter oder chronischer Rhinitis, ferner in Folge mechanischer Läsionen, so besonders durch Bohren und Kratzen mit den Fingernägeln, ungestümes Schneuzen etc. entstehen bald in dem oberen Winkel, welchen der Nasenflügel mit dem Septum, oder in dem unteren, welchen er mit dem Nasenboden bildet, ferner auch an dem häutigen Septum kleine strichartige Einrisse, Fissuren und Excoriationen, welche beim Reinigen der Nase bedeutend schmerzen, ja sogar bluten und wegen der beständigen Insultirung nicht heilen. Das an und für sich ungefährliche Leiden kann jedoch, wie die Erfahrung zeigt, zu einem lebensgefährlichen werden, wenn die Schrunden den Mikroorganismen der Phlegmone, des septischen Giftes oder des Erysipels als Eingangspforten dienen. Wie Moldenhauer einen Herrn, so beobachtete Verfasser eine Dame, welche mehrmals im Jahre von Gesichtserysipel, zuletzt in Verbindung mit einem kolossalen Septumabscesse, befallen wurde, und die eine schon sehr lange Zeit bestehende Fissur am oberen Winkel des rechten Nasenflügels völlig ignorirt hatte. Nach Heilung derselben blieben auch die Erysipele aus.

Die Diagnose ist in der Regel leicht, doch sind Verwechslungen mit zerfallenden Neubildungen, Lupus, namentlich aber mit gummösen Infiltraten (siehe das Capitel Syphilis) möglich.

Die Behandlung des Eczems muss zuweilen eine allgemeine stets aber eine locale sein. Nasenkatarrhe müssen beseitigt, die Scrophu-

lose bekämpft werden. Die locale Behandlung hat bei Eczem und Acne vor Allen die Entfernung der Borken zu erstreben; dies geschieht theils durch möglichst indifferente Nasenbäder theils durch Einlage von Wattebäuschen, die mit Vaselin, Lanolin, Olivenöl oder Goldcream bestrichen werden; etwa noch vorhandene Pusteln sind zu öffnen, verklebte Haare möglichst kurz abzuschneiden und nur gelockerte zu epiliren. Dann wird mit Pinsel oder Wattetampon Ung. diachyli Hebrae oder Ung. hydr. präcip. albi oder eine Salbe aus Flor. Zinci, Magist. Bism. āā 1·0 zu 10·0 Vaselin applicirt. Schmiegelow empfiehlt das Einlegen von Wattetampons, die mit einer Sublimatlösung 1 : 1000 imprägnirt sind, und die 2—3mal täglich während 2 Stunden in der Nase belassen werden.

Schmerzhafte Einrisse und Schrunden sowie blutende Rhagaden heilen am raschesten durch Cauterisation mit Lapis in Substanz oder Bestreichen mit weisser Präcipitat- oder Hebra'scher Salbe. Ausgebreitetere in die Tiefe oder Fläche gehende Ulcerationen müssen stets den Verdacht auf Syphilis erregen und zur Verordnung von Jodpräparaten auffordern. Bei knolliger diffuser Infiltration des Naseneingangbodens empfiehlt Moldenhauer Scarificationen und Stichelungen.

Oedematöse Exsudationen in der Nase sind theils die Begleiter phlegmonöser oder traumatischer Entzündungen, theils die Producte des Erysipels.

Stauungsödeme in der Nase gehören zu den grössten Seltenheiten; so beobachtete Fronstein einmal ein circumscriptes Oedem der mittleren Muschel neben Oedem der Hände, Füsse und des Gesichts bei einer an Tricuspidal-Insufficienz leidenden Dame, das durch Digitalis wieder verschwand.

Fibrinöse-croupöse Exsudate entstehen ausser bei der Diphtherie jedesmal nach Aetzungen mit Chromsäure oder dem Galvanokauter. Sie können sich unter Umständen organisiren und so zu Verwachsungen Anlass geben.

Echter, genuiner Croup der Nase, Rhinitis crouposa fibrinosa, gehört zu den grossen Seltenheiten. A. Hartmann und O. Seifert, welche solche Fälle beobachteten, sahen die Affection sporadisch auftreten, theils nach Masern oder mit Lacunärangina, theils nach Operation von adenoiden Wucherungen, aber auch ohne vorherige Erkrankungen. Die Affection beginnt unter dem Bilde eines mit Fiebererscheinungen verbundenen acuten Schnupfens, meist mit gleichzeitiger einfacher nicht croupöser Pharyngitis. Es kommt rasch zu Verstopfung der Nase mit den derselben zukommenden Erscheinungen. Das abgesonderte schleimige Secret veranlasst Röthung und Excoriationen am Naseneingang oder im Gesicht. Die mit dem Spiegel leicht sichtbaren Croupmembranen sitzen ihrer Unterlage immer so fest auf, dass sie beim Ausschneutzen nicht herausbefördert werden. Dagegen können sie mit der Sonde oder am besten durch Einschieben von spitzen fest gedrehten Wattetampons allerdings oft unter Blutung gelockert werden. Beim Fassen mit der Pinzette reissen die Membranen leicht ab, auch regeneriren sie sich rasch wieder. Allmählich

werden sie dünner, bis im Verlaufe von 8—14 Tagen der Uebergang in einfachen Katarrh und in Heilung erfolgt. In einem der Seifert'schen Fälle dauerte die Affection drei Wochen, auch bildete sich eine Verwachsung der unteren Muschel mit dem Septum.

Die Behandlung besteht in mechanischer Entfernung der Membranen und darauffolgender Insufflation von Jodoformpulver.

Rhinitis diphtheritica.

Die Diphtherie der Nase ist fast stets eine secundäre d. h. vom Rachen fortgeleitete; ausnahmsweise wird bei Erwachsenen die Nase primär ergriffen, wenn z. B. Erosionen, Geschwüre oder frische Wunden vorhanden sind, wie z. B. in einem von Johnston mitgetheilten eine Dame betreffenden Falle, welche nach der Operation eines Nasenpolypen an Diphtherie der Nase und des Nasenrachenraumes erkrankte, nachdem sie ihre wahrscheinlich an Diphtherie leidende Schneiderin besucht hatte. Bei Kindern hingegen erkrankt die Nase nicht selten primär; der sogenannte diphtheritische Schnupfen kann mehrere Tage unter dem Bilde eines gewöhnlichen Katarrhs verlaufen, bis dann plötzlich Rachen-Kehlkopfdiphtherie auftritt, und so die Diagnose klargelegt wird. Die primäre Diphtherie älterer Kinder manifestirt sich im Beginne ausser durch Schwellung und Oedem der Nase, serös blutigen Ausfluss, durch allgemeine Apathie, Hautblässe, grosse Schwäche, heftiges Schnarchen und zuweilen sehr beträchtliches Fieber, später durch den Abgang von Pseudomembranen und stinkender Jauche, welche die Nasenlöcher und die Oberlippe excoriirt und zu Oedem der Haut, der Wangen, der Augenlider und selbst der Conjunctiva Anlass gibt. Der locale Befund wurde bereits bei den Krankheiten des Rachens (S. 160) geschildert.

Bei Neugebornen kommt nach Monti und Andern in den ersten 6 Wochen nicht selten eine primäre Nasendiphtherie zur Beobachtung, welche von der genuinen Diphtherie völlig unabhängig ist und wahrscheinlich durch Erkrankungen der mütterlichen Genitalien hervorgerufen wird. Die subjectiven und objectiven Erscheinungen sind den oben geschilderten völlig gleich; die Affection kann heilen, sich aber auch auf Lippen, Rachen, Kehlkopf fortsetzen oder durch Sepsis tödten. Die im Verlaufe des Scharlachs auftretende bösartige Nasenaffection hält Henoch ebenso wie jene im Rachen nicht für echte Diphtherie, sondern für eine nekrotisirende Entzündung.

Die Prognose ist namentlich bei jüngeren Kindern und Säuglingen sehr schlecht, indem meist nur bei geringgradiger Exsudation Heilung beobachtet wird.

Die Behandlung ist dieselbe wie bei secundärer Nasendiphtherie (vergl. die Krankheiten des Rachens p. 174).

Rhinitis gangraenosa.

Gangrän des Naseninnern kommt äusserst selten zur Beobachtung, und wenn, fast nur in der circumscripten Form. Relativ am häufigsten gibt die Diphtherie sowohl die genuine wie die den Scharlach begleitende, zu gangränösen Zerstörungen am Septum, den Muscheln oder am Naseneingang Anlass; auch gewisse Chemikalien namentlich Salzsäuredämpfe, chromsaures Kali etc. können, wie bereits erwähnt, bei längerer Einwirkung zu trocknem und feuchtem Brand führen, ebenso Abscesse, diffuse Phlegmonen oder Ulcerationen, Fremdkörper oder Rhinolithen.

Die Erscheinungen der Nasengangrän bestehen meist in der Secretion eines jauchigen, serös blutigen, äusserst fötiden Ausflusses, welcher die Nasenlöcher und Oberlippe excoriirt und bei den diphtheritischen Formen zerfallene Pseudomembranen mit sich führt. Bei diesen ist die äussere Nase geschwellt, Wangen und Augenlider sind ödematös, in den schlimmsten Fällen wird auch die Conjunctiva und Cornea in Mitleidenschaft gezogen. Bald stellen sich die Erscheinungen der Sepsis ein, Petechien, profuses Nasenbluten, Lymphdrüsenschwellungen in den Kieferwinkeln, blutige Diarrhöen, Adynamie.

Bei der circumscripten Form fehlen die Allgemeinerscheinungen und hören nach Abstossung der gangränösen Partien der Fötor und die jauchige Secretion auf.

Die Prognose ist nur günstig bei localisirter Gangrän, sehr ungünstig bei der diffusen, namentlich der diphtheritischen den Scharlach begleitenden Form.

Die Therapie muss vorzüglich eine locale sein und in sorgfältigster Ausspritzung der Nase mit den üblichen Desinfectientien, Insufflationen von Jodoform, Borsäure etc. bestehen. Gegen die septischen Erscheinungen sind Chinin, Antifibrin, Roborantia, zu versuchen.

Syphilis.

Wie alle Respirationsorgane so wird auch die Nase mit Vorliebe von Syphilis befallen.

Primär erkrankt die Nase und der Naseneingang zuweilen durch den Transport des syphilitischen Giftes mittelst unreiner Finger oder Berührungen, oder durch schlecht gereinigte Instrumente namentlich Ohrkatheter (Burow). Viel häufiger jedoch wird die Nase secundär ergriffen.

Die erste Aeusserung der constitutionellen Syphilis ist sehr oft der syphilitische Katarrh.

Bei Erwachsenen wird er meist wegen der geringen Beschwerden und Weite der Nase übersehen oder auf Rechnung einer Erkältung gesetzt. Bei Säuglingen jedoch sind die Erscheinungen viel prägnanter. Einige Tage oder Wochen nach der Geburt bemerken die Angehörigen eine Erschwerung der Nasenathmung, es tritt ein schnüffelndes,

pfeifendes Geräusch auf oder Einsinken der Nasenflügel, reichliche Secretion und Borken- und Krustenbildung am Naseneingang. Zuweilen ist das Secret rein eitrig, blutig, übelriechend und sehr corrodirend. Einer Verwechselung mit gewöhnlichem Schnupfen oder mit acuter Nasenblennorrhoe entgeht man nur durch sorgfältiges Suchen nach anderweitigen Aeusserungen der Lues; abgesehen von dem kümmerlichen Aussehen solcher syphilitischer Kinder finden sich meist noch Exantheme, Pemphigus oder Psoriasis palmaris und plantaris, Rhagaden und Plaques der Mundhöhle, Condylome ad anum et scrotum.

Syphilitische Papeln auf der Nasenschleimhaut sind sehr selten, dagegen kommen schuppende, nässende und ulcerirende Papeln. in der Nasenflügelfurche nicht gar selten zur Beobachtung. Wenn auch oberflächliche Ulcerationen der Nasenschleimhaut in Folge des Zerfalls frühsyphilitischer Producte unstreitig vorkommen, so werden doch Zerstörungen der Knochen dabei nicht beobachtet.

Unendlich viel häufiger geben die späteren Stadien sowohl der acquirirten wie hereditären Syphilis zu Affectionen der Nase Anlass.

Die gummöse Infiltration der Schleimhaut muss als die gewöhnliche Ursache der oft scheusslichen Verheerungen des Naseninnern betrachtet werden. Zuweilen tritt die Syphilis schon nach wenigen Monaten ihres Bestehens in das gummöse Stadium (Syphilis maligna).

Die subjectiven Beschwerden bestehen, da die Nasensyphilis meist scheinbar harmlos und incognito unter dem Bilde eines Stockschnupfens beginnt, in Verstopfung der Nase, Störung des Geruchs, vermehrter wässerig-schleimiger Secretion und nasalem Timbre der Stimme. Nach kürzerem oder längerem Bestande wird der Ausfluss aus der Nase eiterig, übelriechend, mit Blut vermischt, oft geléeartig oder käsig krümelig; die Verstopfung wird eine vollständige, es treten Schmerzen in der Tiefe der Nase oder über dem Nasenrücken ein, welche in die Wangen, Zähne, Augen, Stirngegend ausstrahlen und oft ausgesprochen neuralgischer Natur sind. Zuweilen enthält das äusserst fötide den Introitus narium und die Haut der Oberlippe excoriirende Secret spitzige Knochenbeimengungen oder es werden grössere Stücke nekrotischer Knochen durch den Rachen oder die Nase ausgestossen. Auch Schwellung und Röthung der Weichtheile der Nase kommt vor.

Die objectiven Erscheinungen sind verschieden nach dem Sitze und dem Stadium, in welchem die Erkrankung zur Beobachtung gelangt. Im Stadim der Infiltration zeigen sich die ergriffenen Partien theils diffus theils circumscript geschwellt und wenig oder gar nicht geröthet. Der Luftdurchzug durch die Nase ist behindert oder ganz aufgehoben. An der Nasenscheidewand sowie am Naseneingang sah Verfasser wiederholt die Syphilis auftreten in Gestalt zahlreicher stecknadelkopf- bis erbsengrosser warzig-knotiger Erhabenheiten; in einem Falle sassen sie am Naseneingang zu beiden Seiten des Septum und waren so mächtig, dass sie den Luftdurchtritt aufhoben und auf den ersten Blick als Lupusknoten oder selbstständige Neubildungen imponirten. Die mikroskopische Untersuchung ergab

in allen Fällen eine Anhäufung von Rundzellen, welche durch spärliche zarte Bindegewebsfasern miteinander zusammengehalten wurden (gummöse Neubildung). Nach längerem oder kürzerem Bestande geht das Stadium der Infiltration in das Stadium der Erweichung und Ulceration über. Die erwähnten warzigen Erhabenheiten oder flachen Infiltrate wandeln sich vorerst in grauweisse sulzige Flecken und scheinbare Auflagerungen um, nach deren Abstossung speckig belegte, ausgenagte, mit wallartigen Rändern umgebene, die ganze Schleimhaut durchsetzende Geschwüre sichtbar werden. Auf dem Grunde oder an den Rändern dieser Geschwüre ist in einem noch spätern Stadium der blossliegende rauhe Knochen mit der Sonde. zu fühlen oder zu sehen.

Das äusserst übelriechende Secret vertrocknet in der Nase zu langen, dicken, grünen, schmutzigbraunen Borken, welche nicht selten vollständige Abgüsse der Nasenhöhle oder eines Nasenganges vorstellen (Ozaena syphilitica). Der Geruch derselben wird meist von den Kranken selbst wahrgenommen, was bei der genuinen oder scrophulösen Ozaena nicht der Fall ist.

Wenn auch die Knorpel und Knochen der Nase in der Regel von der Schleimhaut aus — von aussen nach innen — blossgelegt werden, so sind doch auch, wie die klinische Erfahrung und die anatomischen Untersuchungen von Sänger und Schuster beweisen, gummöse Perichondritis und gummöse suppurative Ostitis und Periostitis häufige Ursachen der von innen nach aussen fortschreitenden Zerstörung.

Unstreitig am häufigsten wird die Nasenscheidewand ergriffen. Mit besonderer Vorliebe localisirt sich die Syphilis auf dem vorderen, knorpeligen Theile derselben. Hier entstehen nach vorausgegangener diffuser oder knolliger Infiltration und Ulceration Perforationen von sehr verschiedener Form und Grösse; in der Regel sind sie rund oder länglich-oval, zuweilen finden sich mehrere durch gesunde Partien von einander getrennte Perforationen hinter- oder übereinander, oder es geht das ganze Septum cartilagineum zu Grunde. Die Ränder dieser Perforationen ulceriren oft noch lange und sind auch nach völliger Heilung constant mit eingetrocknetem Secrete bedeckt, das zu zeitweiliger Verstopfung, zu Blutungen und Excoriationen Anlass gibt.

Ziemlich häufig wird auch der hintere knöcherne Theil des Septum, der Vomer und die Lamina perpendicularis des Siebbeins ergriffen. Localisirt sich der Process an dem obersten vordersten Ende der Lamina perpendicularis oder dem unteren Ende des Nasenbeins und greift von da auf das knorpelige Septum oder das subcutane Bindegewebe der Nasenrückenhaut über, dann kann ohne vorhergegangene Verstopfung und eitrigen Ausfluss der Nasenrücken einsinken (Sattel- oder Hammelsnase). Sie kommt dadurch zu Stande, dass das sich retrahirende Narbengewebe die Haut der Nase nach rückwärts resp. innen unter das Niveau der Nasenbeine zieht. Der Knocheneiter kann sich auch unter der Schleimhaut des Septum bis auf den Boden der Nasenhöhle herabsenken, beide Nasen obliteriren und zu Gesichtserysipel Anlass geben. Greift die Syphilis

von der perpendiculären Platte des Siebbeins auf die horizontale über, dann liegt die Gefahr eitriger Meningitis, Sinusthrombose, Arrosion eines Gefässes mit tödtlicher äusserer oder innerlicher Blutung sehr nahe. Dasselbe ist der Fall, wenn das Keilbein ergriffen wird. Bei Ulcerationen der die knöcherne Scheidewand überziehenden Schleimhaut kommt es sehr bald zu Entblössung, Perforation und Ausstossung des Vomer.

Relativ selten localisirt sich die Syphilis an den Nasenbeinen. Der Nasenrücken wölbt sich, die äussere Haut wird kupfer- oder lividroth und ulcerirt; werden die Nasenbeine ausgestossen, so entsteht zwischen den Augenhöhlen eine grosse unregelmässige oder ovale Oeffnung, durch welche, wie Verfasser einmal sah, die scheusslich entstellte und des ganzen harten und weichen Gaumens beraubte Kranke die Zunge herausstrecken konnte.

Fast ebenso oft wie am Septum localisirt sich das gummöse Infiltrat an den Muscheln. Je nach dem Umfange desselben werden kleinere oder grössere Strecken der Schleimhaut ulcerirt und die Muscheln blossgelegt und theils in kleinen spitzigen Partikeln theils als grössere Lamellen abgestossen. Die nekrotischen Muscheln ragen entweder als schwarzgraue Sequester frei in das Lumen der Nase herein, oder sie sind an den Demarkationsrändern von zahlreichen papillären Granulationen und polypoiden Wucherungen umgeben.

Nicht selten beginnt die Affection am Boden der Nasenhöhle oder der Crista nasalis. Auch hier ist die erste objective Erscheinung Schwellung und Wulstung der Schleimhaut mit Verstopfung des unteren Nasenganges. Allmählich zerfällt die gewulstete Stelle, es entsteht ein Geschwür, welches sich bald rascher bald langsamer nach vorne, nach hinten oder seitlich auf die untere Muschel oder den unteren Theil des Septum verbreitet und bei entsprechender Behandlung heilt, oder in malignen Fällen trotz localer und allgemeiner Behandlung die Knochen des Nasenbodens — den Gaumenfortsatz des Oberkiefers und die horizontale Platte des Gaumenbeins — blosslegt. Das Ergriffensein des Nasenbodens, der zugleich das Dach der Mundhöhle bildet, äussert sich sehr häufig durch eine bald die Mittellinie bald die Seitentheile des harten Gaumens betreffende Schwellung und Hervorwölbung, über welcher die Schleimhaut Anfangs normal später lividroth gefärbt ist. Die Raphe des harten Gaumens erscheint als eine erhabene, entzündete, cyanotische Leiste, auf der bei weiterem Fortschreiten der Affection sich Geschwüre bilden, welche zu Perforation der Schleimhaut und des Knochens führen. Die blossliegenden rauhen, missfärbigen Knochen können sowohl von der Mundhöhle aus gesehen als auch von der Nase aus mittelst der Sonde gefühlt werden; zuweilen lässt sich durch Druck auf den harten Gaumen Crepitation der in ihrer Verbindung gelockerten und theilweise schon sequestrirten Knochen erzeugen. Nach des Verfassers Erfahrung gehört die Localisation am Nasenboden zu den schwersten und langwierigsten Formen; die Abstossung der nekrotischen Knochen erfolgt bei der grossen Dicke der Crista nasalis, der Compactheit und der eigenthümlichen

Form der Knochen äusserst langsam. Wenn auch Perforationen des harten Gaumens bei Ergriffensein des Nasenbodens zur Regel gehören, so können dieselben doch in seltenen Fällen trotz Exfoliation grosser Sequester, wie Verfasser gesehen hat, ausbleiben.

In sehr schweren oder vernachlässigten Fällen können nicht nur sämmtliche Muscheln, die knöcherne und knorpelige Scheidewand mit Vomer und Crista nasalis, sondern auch beide Gaumenfortsätze des Oberkiefers und die Gaumenbeine nekrotisiren und ausgestossen werden.

Endlich localisirt sich das gummöse Infiltrat auch am Naseneingang, besonders auf den Nasenflügeln. Dieselben erscheinen mehr oder weniger verdickt, rigid, knotig, den Aditus verengernd, auf Druck etwas schmerzhaft, im späteren Verlaufe ulcerirt, oder mit Schrunden und Fissuren bedeckt, an denen gelbes borkiges Secret klebt. Nach Heilung der Geschwüre eventuell Zerstörung der Knorpel sinkt der Nasenflügel ein und gibt so zu Stenose des Naseneingangs und Entstellung Anlass. Wegen der grossen Aehnlichkeit mit Lupus exulcerans bezeichnet man diese Affection auch als Lupus syphiliticus.

Nach Otto Weber kommt an den Nasenflügelknorpeln zuweilen auch eine atrophisirende gummöse Knorpelentzündung vor, welche sich dadurch auszeichnet, dass die Haut über den Knorpeln sich ein wenig röthet, während die Knorpel selbst allmählich schwinden und zusammenfallen, so dass die einzelnen Theile nur noch durch eine eingezogene Hautfalte miteinander in Verbindung stehen.

Der Verlauf der gummösen Formen der Syphilis ist ein äusserst langsamer. Auf die Schleimhaut beschränkt bleibende Geschwüre heilen unter geeigneter Behandlung oft ziemlich rasch, während die mit Entblössungen der Knochen einhergehenden Fälle oft Monate ja 1 bis 2 Jahre erfordern, da man nicht im Voraus bestimmen kann, ob der Knochen cariös oder nekrotisch und dann abgestossen wird, oder ob derselbe — was Verfasser mehrmals beobachtet hat, sich wieder überhäutet.

Die Diagnose der Primäraffecte sowie des syphil. Katarrhs, der Plaques und Papeln ist in der Regel leicht, vorausgesetzt dass noch andere Erscheinungen der Lues namentlich Hautsyphilide oder Plaques der Mundrachenhöhle vorhanden sind; bei Neugeborenen kann oft nur die längere Beobachtung und wiederholte Untersuchung von Kind und Mutter die Diagnose fixiren.

Aeusserst schwierig, ja unmöglich, ist die Diagnose der gummösen Rhinitis im Stadium der Infiltration, d. h. so lange noch keine Ulcerationen oder anderweitige Aeusserungen der Lues vorhanden sind. Sehr verdächtig sind die oben beschriebenen warzigen Unebenheiten des Septum, ferner hartnäckige Schnupfen, welche mit rheumatoiden Schmerzen der Schulter-, Brust- und Rückenmuskeln combinirt sind; man hüte sich deshalb, dieselben auf Erkältungen zurückzuführen. Da seit der Infection zehn, selbst zwanzig Jahre verflossen sein können, und auch die in Genital-Angelegenheiten aufrichtigen Kranken nicht

mehr an einen Zusammenhang mit dem längstvergessenen und geheilten vielleicht sogar übersehenen Primäraffect denken, so erscheint namentlich bei Verheirateten oder vor ihrer Ehe schon inficirt gewesenen Damen eine antisyphilitische Behandlung nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu geboten. Bei solchen Frauen fehlen, was Verfasser besonders auffiel, sehr oft anderweitige Erscheinungen oder Ueberreste von Syphilis; sie können das volle Bild der Gesundheit darbieten aber auch an Anämie und Neigung zu Abortus leiden, welch' letztere Erscheinung den denkenden Arzt auf die richtige Spur zu bringen vermag.

Sind Geschwüre vorhanden oder Affectionen der Knochen und Knorpel, zu deren Diagnose fleissige und sorgfältige Sondirung nöthig ist, so wird man bei Erwachsenen selten fehlgehen, wenn man dieselben für syphilitische erklärt. Allerdings ist einige Vorsicht nöthig, da der immerhin sehr seltene Lupus, Tuberculose und Scrophulose dieselben Veränderungen setzen, und Perforationen des Septum sowie Entblössungen der Knochen auch durch Verletzungen, Bohren mit den Fingernägeln, Abscesse, Blutcysten, den Umgang mit gewissen Chemikalien, verursacht sein können. Auch Brüche des Nasenbeins und des Siebbeins können zu stinkendem Ausfluss, Caries und Nekrose der Knochen Anlass geben. Die selbstständigen Erkrankungen des Knochengerüstes der äusseren Nasenwand beruhen nach des Verfassers Erfahrungen immer auf eitrigen Katarrhen der Nebenhöhlen, besonders der Kieferhöhle.

Absolut sicher ist die Diagnose, wenn noch anderweitige syphilitische Erscheinungen, kupferfarbige Hautausschläge, Knochenauftreibungen, Muskelgummata, frische Geschwüre oder alte Narben im Rachen und Kehlkopf oder Hodensyphilis etc. vorhanden sind. Tiefe, speckig belegte Geschwüre am Naseneingang und den Nasenflügeln sprechen gegen Eczem und Sycosis; der Entscheid zwischen Lupus und Syphilis ist zuweilen äusserst schwer, und muss dann der therapeutische Versuch die Diagnose feststellen.

Die Prognose ist, vorausgesetzt, dass die Krankheit richtig erkannt wird und die Kranken nicht erst bei weit vorgeschrittener Zerstörung in Behandlung kommen, eine günstige; freilich gelingt es nicht immer, Perforationen in die Mundhöhle, Entstellungen der äusseren Nase, Verlust von Nasenknochen, Stenosen oder Narbenbildung hintanzuhalten. Dass Affectionen der Lamina cribrosa, des Keilbeins, der Gesichtsknochen, lebensgefährlich werden können, wurde bereits erwähnt. Aber auch nach völliger Heilung bleiben meist sehr unangenehme Folgezustände zurück. So vertrocknet einestheils nach Perforationen oder Verlust der Scheidewand das Secret zu dicken, schwer zu entfernenden Borken, anderntheils entwickelt sich das volle Bild der Rhinitis atrophicans, welche der Umwandlung der früher ulcerirten Partien in Narbengewebe und der Schrumpfung der gummös infiltrirten Schleimhaut ihre Entstehung verdankt.

Die Behandlung muss eine allgemeine und eine locale sein. Bei den frühsyphilitischen Formen greife man zum Quecksilber, bei den Spätformen zum Jodkali, welches als souveränes Mittel fast nie

im Stiche lässt; in hartnäckigen Fällen ist eine combinirte Inunctions- und innerliche Jodkalicur oder das Calomel, Dec. Zittmani, angezeigt.

Die locale Behandlung des syphilitischen Katarrhs ist dieselbe wie bei acuter Nasenblennorrhoe. Bei den Spätformen ist die gründliche methodische täglich 2—3malige Reinigung und Entfernung der Borken mittelst Spray oder noch besser mittelst der Nasendouche die erste Bedingung. Zur Douche verwendet man 2—4% Borsäurelösung, Kali chloricum 1 Esslöffel in 1 Liter Wasser, Kali hypermangan, Aluminium acetico-tartaricum (von einer 20% Lösung ½—1 Kaffeelöffel in 1 Liter); sehr festsitzende Borken müssen mit der Pincette entfernt werden. Nach der Nasendouche cauterisire man die Geschwüre mit Lapis in Substanz, Sublimat oder Chlorzink, insufflire Jodoform oder Jodol oder Borsäure, oder lege Jodoformbougies ein. Gegen Infiltrate und Geschwüre der Nasenflügel empfiehlt sich das Auflegen von Empl. hydrargyri, Einpinseln von Jod und Jodoform. Manche empfehlen auch das Auskratzen der Ulcera und polypoiden Wucherungen mit dem scharfen Löffel; letztere sowie grössere knotige Infiltrate am Septum entfernt Verfasser mit der kalten oder heissen Schlinge: Abscesse sind baldigst zu öffnen. Bei Nekrose der Knochen ist die Entfernung locker sitzender Sequester die erste Bedingung zur Beseitigung des penetranten leimartigen Geruches; oft gelingt es, die ganze Muschel als zusammenhängendes Stück zu entfernen, oft nur kleine abgerundete oder spitzige, nadelförmige, poröse Theile; am schwersten zu entfernen sind die Knochen des Nasenbodens. Man benützt dazu starke Pincetten oder Löffelzangen oder das von Schäffer angegebene Instrument. Festsitzende Sequester lasse man bis zu ihrer Lockerung, die manchmal Monate in Anspruch nimmt, ruhig liegen; die zur schnelleren Abstossung empfohlenen Einspritzungen von verdünnter Salzsäure oder Chlorkalk sind völlig unnütz; auch vergesse man nicht, dass entblösste Knochen sich wieder überhäuten können. Die nach Heilung der schweren und ausgebreiteten Formen zurückbleibenden atrophischen fötiden oder nichtfötiden Katarrhe müssen nach den früher angegebenen Regeln behandelt werden. Die Entstellungen der äusseren Nase sowie die Perforationen des harten Gaumens lassen sich zuweilen durch plastische Operationen oder künstliche Nasen aus Celluloid, Silber oder Kautschuk, durch Obturatoren und Gaumenplatten beseitigen.

Tuberculose.

Noch viel seltener als die Tuberculose des Rachens ist die der Nase.

Dieselbe scheint primär und secundär, in Form von Knoten und miliaren Eruptionen aufzutreten. Lieblingssitz ist das Septum; die knotige Form kann lange Zeit unverändert bestehen, bis sie meist später als die miliare in oberflächliche oder tiefe Geschwüre von atonischem Charakter übergeht. Ueber die Tuberculose der Nase liegen

nur äusserst spärliche Mittheilungen vor, so namentlich von Laveran, Riedel, Trendelenburg, Weichselbaum, A. Sokolowski und Tornwaldt. Der Letztere beobachtete am vorderen Ende der unteren Muschel und am Nasenboden grauröthliche, nicht ulcerirte Tumoren, welche zahlreiche Miliartuberkel mit Riesenzellen enthielten, zu gleicher Zeit fand sich am Rachendache eine seichte Ulceration, ebenso war das hintere Ende des Septum befallen und der Kehlkopf. Nach Volkmann und Demme beruhen die schweren Formen der scrophulösen Ozaena gleichfalls auf Miliartuberkulose. Der Letztere beobachtete bei scrophulösen Kindern auf dem Septum neben graugelben Knötchen unregelmässige, nach der Fläche ausgebreitete, hirsekorn- bis erbsengrosse Geschwüre, welche reichlich Tuberkelbacillen enthielten.

Nach König und Riedel kommt in der Nase eine charakteristische Form der Tuberculose vor, das tuberculöse Fibrom, eine grössere Geschwulst, welche bald am Septum bald an den Muscheln ihren Sitz hat, zuweilen die Gestalt von Schleimpolypen annimmt, und aus jungem fibrillärem Bindegewebe mit zahlreichen eingesprengten Tuberkeln besteht.

Offenbar nahe verwandt oder identisch mit den tuberculösen Fibromen sind die von Schäffer und Nasse beschriebenen Tuberkelgeschwülste. Sie gingen als himbeerartige, unebene, körnige bis wallnussgrosse Geschwülste von blassrother bis dunkelrother Farbe stets vom Septum aus, das sie mehrmals perforirten, und bestanden aus einem gefäss- und zellenreichen, von vereinzelten fibrösen Zügen durchsetzten Granulationsgewebe, welches zahlreiche oft dicht beieinanderliegende und zum Theil confluirende kleine Tuberkel mit sehr vielen und grossen Riesenzellen aber sehr wenig Tuberkelbacillen enthielten. Die Geschwülste recidivirten äusserst leicht, drangen bis auf das Perichondrium, verbreiteten sich nach hinten oder auf die Muscheln und bildeten flache Ulcera mit wallartigen weichen Rändern.

Die Erscheinungen sind meist die des chronischen Nasenkatarrhs mit fötidem, blutigem Secrete.

Die Diagnose stützt sich auf das Aussehen der Geschwüre und Geschwülste sowie auf das Vorhandensein anderweitiger phthisischer Erscheinungen. Nach Weichselbaum sind Verwechslungen mit vergrösserten Schleimdrüsen oder stärkeren lymphoiden Wucherungen und hämorrhagischen Erosionen sehr leicht möglich. Den sichersten Anhaltspunkt gibt die mikroskopische Untersuchung der Knoten und Ulcera auf Riesenzellen und Bacillen.

Die Prognose ist in der Regel eine infauste; selbst bei localer Heilung kann es früher oder später zu Tuberkeldepôts in anderen lebenswichtigen Organen kommen.

Die Behandlung besteht in Excision, Auskratzen oder galvanokaustischer Zerstörung der Knoten, in Cauterisation der Ulcera mit Lapis oder Chlorzink, ausserdem in fleissiger Reinigung und Insufflation von Jodoform.

Scrophulose, Lupus, Rotz, Rhinosclerom.

Ueber die Scrophulose der Nasenhöhle wissen wir zur Zeit fast noch weniger, als über jene des Rachens.

Vor Allem fragt es sich, was man unter Scrophulose versteht. Je nachdem man den Begriff und die Grenze der Scrophulose enger oder weiter zieht, wird man, wie Gottstein bemerkt, die Häufigkeit der scrophulösen Nasenerkrankungen höher oder niedriger schätzen. Thatsache ist, dass Scrophulöse besonders häufig von acuten und chronischen Nasenkatarrhen, besonders solchen mit eitriger Secretion befallen werden; von Manchen wird die fötide Rhinitis nur für eine Aeusserung und Localisation der Scrophulose gehalten. Das Vorkommen scrophulöser mit Geschwüren einhergehender und zur Zerstörung der Nasenscheidewand und der Muscheln sowie zur Perforation des harten Gaumens führender Nasenerkrankungen wird von Henoch und Störk ausdrücklich erwähnt. Es scheint übrigens, dass die Zerstörung nicht ausschliesslich von der Schleimhaut ausgeht, sondern zuweilen durch primäre Erkrankungen des Knorpels und Knochens bedingt wird. Bei dem Mangel anatomischer Untersuchungen ist man zur Zeit nur auf die klinische Beobachtung angewiesen, die jedoch allein nicht massgebend sein kann. Was des Verfassers Erfahrung anlangt, so sah derselbe eine ziemliche Anzahl jüngerer und älterer Kinder mit abgelaufenen Zerstörungen an Septum und Muscheln ohne anderweitige Zeichen von Syphilis; die Mehrzahl zeigte in Folge vorausgegangener Lymphadenitis am Halse Narben; bei einem zwölfjährigen Jungen, dessen Septum bis auf ein schmales doppelt perforirtes Stück zu Verlust gegangen war, fanden sich auch im Nasenrachenraume netzartige Narben, sowie Narben der äusseren Haut und dicke, gewulstete Lippen, so dass die Diagnose Scrophulose wahrscheinlicher schien als die der Syphilis. Auch Andere wie z. B. B. Fränkel sagen, dass, wenn derartige Defecte am Septum und den Muscheln auch nicht häufig seien, sie doch unzweifelhaft vorkämen und man namentlich bei Kindern kein Recht habe, lediglich aus dem Vorhandensein derselben auf Syphilis zu schliessen. Nichtsdestoweniger glaubt Verfasser bei Beurtheilung solcher Fälle die äusserste Vorsicht empfehlen zu müssen. Bei der gewöhnlichen Unzuverlässigkeit und Fälschung anamnestischer Daten von Seite der Eltern dürfte, wofür auch die Mittheilungen von Höfler sprechen, ein Theil dieser Erkrankungen doch auf Syphilis, namentlich auf Lues hereditaria tarda, zurückzuführen sein; ja Manche erblicken in der Scrophulose nur die letzte Aeusserung elterlicher Syphilis.

Vielleicht ist es auch bei der nahen Verwandtschaft der Scrophulose und Tuberculose gestattet, einzelne Formen auf locale Tuberculose oder auf Lupus zurückzuführen, zumal sich seit Friedländer die Ansicht Bahn gebrochen hat, dass Lupus nur eine Hauttuberculose sei.

Die Behandlung muss vorerst auf baldigste gründliche Beseitigung bestehender Nasenkatarrhe gerichtet sein; die genuine Ozaena wäre unendlich viel seltener, wenn die Coryza der scrophulösen Kinder

nicht in so unverantwortlicher Weise vernachlässigt würde. Innerlich empfehlen sich Jod, Jodeisen, Eisen, China, ausserdem Landaufenthalt und namentlich Sool- oder bei älteren Kindern Meerbäder, bei Verdacht auf Syphilis Antiluetica.

Der **Lupus** befällt das Naseninnere in der Regel erst dann, wenn die äussere Nase schon ergriffen ist, in seltenen Fällen wird jedoch die Schleimhaut zuerst und isolirt befallen.

An der äusseren Nase localisirt sich der Lupus mit Vorliebe auf den Nasenflügeln, um sich von da auf den Nasenrücken und die Nasenwurzel auszubreiten. Die Nasenflügel erscheinen starr, verdickt, mit dunkel- bis braunrothen, einzelnstehenden oder confluirenden Knötchen besetzt, welche theilweise ulceriren und dicke gelbe Borken tragen. Nach kürzerem oder längerem Bestande werden die Nasenflügel zerstört, sie schrumpfen allmählich von den Rändern her zu einer dünnen, narbigen Masse, oder gehen vollständig zu Verlust, wenn auch der Knorpel mitergriffen wird. Im Innern der Nase wird hauptsächlich das Septum cartilagineum befallen; es bilden sich auf demselben stecknadelkopfgrosse Knötchen oder grössere höckrige Geschwülste von weicher Consistenz, welche Granulationen oder sarcomatösen Neubildungen täuschend ähnlich sehen, und die sich später in fötides Secret producirende Geschwüre umwandeln, in die Fläche und Tiefe weiterschreiten und Perforationen des Septum zur Folge haben. Zerstörungen der Nasenknochen sollen nach Kaposi bei Lupus nicht vorkommen. Bei der nichtulcerirenden Form tritt Schrumpfung der Schleimhaut sowie der unterliegenden Knorpel und Knochen ein.

Die Diagnose ist zuweilen, namentlich im ulcerativen Stadium, oder wenn keine frischen Knötchen vorhanden sind, recht schwierig und eine Verwechselung mit ulcerirenden Gummaknoten oder Tuberkelgeschwülsten leicht möglich. Doch lassen einestheils das jugendliche Alter der Kranken, ihr oft ausgesprochener scrophulöser Habitus, die langsame Ausbreitung der Krankheit, die Wirkungslosigkeit des Jodkali und anderer Specifica, anderntheils die Mitbetheiligung der äusseren Haut sowie die mikroskopische Untersuchung abgetragener Geschwulsttheile eine sichere Diagnose zu.

Die Prognose ist insoferne dubiös, als nach der erfolgten spontanen oder künstlichen Heilung grosse Neigung zu Recidiven besteht und auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Die Behandlung muss sich möglichst frühzeitige Zerstörung der ergriffenen Stellen bis weit in das gesunde Gewebe hinein, mit Milchsäure, Chlorzink oder Galvanokauter, fleissige Reinigung der Nase sowie Verbesserung der Constitution durch Eisen, Arsenik oder Leberthran zur Aufgabe machen. Zuweilen erzielt man auch durch Auflegen von Quecksilberpflaster günstige Erfolge.

Der **Rotz** ist eine vom Thiere speciell vom Pferde auf den Menschen übertragene Krankheit, welche sich ausser in Mund und Rachen ganz besonders in der Nase localisirt.

Er befällt hauptsächlich Pferdewärter, Kutscher, Thierärzte, pathologische Anatomen, kurz Leute, die mit inficirten Thieren und Gegenständen zu thun haben. Auf der entzündeten Schleimhaut der Nase entwickeln sich kleine gelbliche Knötchen, welche zerfallen, Geschwüre von geringerem oder grösserem Umfange zurücklassen und zu Usur der Knorpel und Knochen Anlass geben. Nach Bollinger tritt die Affection der Nase beim Menschen wie beim Pferde häufig erst in der zweiten oder dritten Woche am Schlusse der Erkrankung auf, auch kommt derselben durchaus nichts Pathognomisches zu.

Die Erscheinungen bestehen im Anfang in der Absonderung eines dünnen zähen Schleimes, wozu sich allmählich Anschwellung, Röthung und grosse Schmerzhaftigkeit der Nase und ihrer Umgebung gesellt; besonders die Nasenwurzel wird öfters dick, empfindlich, diffus erysipelatös geschwellt. Der häufig nur einseitige Nasenausfluss wird später dickflüssiger, mehr eitrig, braungelb, sanguinolent und übelriechend. Selten ist man im Stande, förmliche Knoten nachzuweisen, die am häufigsten an den Nasenflügeln vorkommen. Die schwereren Fälle führen zu Perforation des Septum, Caries und Nekrose des Vomer, zu beträchtlicher Schwellung der Submaxillardrüsen, zu Pyämie und Tod.

Die Diagnose ist bei dem Mangel jeglicher ätiologischer Anhaltspunkte um so schwieriger, als derselbe auch mit syphilitischen und anderen Geschwüren die grösste Aehnlichkeit hat. Der fieberhafte Beginn der Erkrankung, die im Verlaufe derselben fast nie fehlenden Gelenkschmerzen, das Auftreten von Rotzpusteln im Gesichte, die Wirkungslosigkeit des Jodkali, die Schüttelfröste, leiten in der Regel auf die richtige Spur.

Die Prognose des acuten Rotzes ist absolut ungünstig; günstiger gestaltet sie sich bei der chronischen Form, doch kann das ganze Leben lang Siechthum zurückbleiben.

Die Behandlung besteht in Cauterisation der erkrankten Schleimhaut mit Salpetersäure, Chlorzink, Carbolsäure, sowie in reinigenden Einspritzungen von Creosot 0·1 : 500, mehrmals im Tage. Selbstverständlich muss bei einer so fürchterlichen Krankheit, die auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, die peinlichste Reinlichkeit sowie Vernichtung aller mit dem Secrete beschmutzter Wäsche platzgreifen.

Eine äusserst seltene Affection ist das **Rhinosclerom.**

Während dasselbe von Hebra und Kaposi zu den Neubildungen, von Andern zu den Producten der Syphilis gerechnet wird, wird es von Billroth, Geber und Mikulicz als ein äusserst schleichend verlaufender Entzündungsprocess angesehen, der nach kleinzelliger Infiltration der oberflächlichen und tiefen Schichten der Haut und Schleimhaut zu bindegewebiger Schrumpfung führt.

Die Aetiologie ist ganz dunkel; mehrmals gingen dem Ausbruch der Krankheit Verletzungen der äusseren Nase voraus; constitutionelle Erkrankungen, wie Syphilis, Scrophulose, Tuberculose, scheinen keinen Einfluss auf die Entstehung zu haben; die Mehrzahl der neueren

Forscher wie Alvarez, Cornil etc. hält die von Frisch in dem Rhinosclerom gefundenen Bacterien für die Ursache der Krankheit.

Das Rhinosclerom — wegen der nahezu constanten Betheiligung des Rachens von Köbner auch Rhinopharyngosclerom genannt — beginnt theils auf der äusseren Haut so namentlich an der Lippe oder den Nasenflügeln, theils auf der Schleimhaut der Scheidewand oder auch zuerst im Rachen, am weichen Gaumen und im Nasenrachenraum; im weiteren Verlauf schreitet es von den Lippen auf das Zahnfleisch, den harten Gaumen und die Wangen fort; das Naseninnere wird meist in ganzer Ausdehnung betroffen; vom Rachen aus greift es auch auf den Kehlkopf und selbst die Trachea über.

Die Krankheit beginnt mit einer dunkeln Färbung und leichten Wulstung der betroffenen Haut oder Schleimhautstellen; dieselben fühlen sich hart und derb an und lassen sich besser mit dem Finger als dem Auge abgrenzen; später bilden sich flache oder erhabene, scharf begrenzte oder diffuse Platten und Knoten, die sich äusserst hart zuweilen knochenhart anfühlen und auf Druck zuweilen schmerzen. Ihre Farbe ist normal wie die der angrenzenden Haut oder Schleimhaut, oder hell bis dunkelroth glänzend, wie eine hypertrophische Narbe. Am stärksten ergriffen wird stets der untere Nasengang, der meist völlig verlegt wird; zuweilen wachsen die Knoten zu den Nasenlöchern heraus. Die Nasenflügel oder das Septum mobile erscheinen unförmlich vergrössert und verdickt, starr und sehr derb. Kaposi sah das Rhinosclerom auf die Highmorshöhle übergreifen. Das Gaumensegel wird durch allmähliche Schrumpfung der Knoten in die Höhe gezogen und narbig oder verwächst bei oberflächlichem Zerfall der Knoten mit der hinteren Rachenwand; schwinden die Knoten, so bleiben strahlige Narben zurück, welche den Verdacht der Syphilis wachrufen. Charakteristisch ist, dass die Knoten nicht zerfallen, sondern nur oberflächlich excoriiren; nach Excision tritt schnell Recidive ein.

Die Diagnose ist um so schwieriger, als das Rhinosclerom die grösste Aehnlichkeit mit Syphilis, Lupus oder Lepra besitzt, besonders wenn die Knoten excoriiren oder narbige Schrumpfung eintritt. Während aber nach Chiari und Roth die rhinosclerotischen Infiltrate äusserst hart und scharf begrenzt sind, zeigen die syphilitischen keinen so plötzlichen Uebergang, auch ist die nächste Umgebung der letzteren stets geröthet und entzündet, die der rhinosclerotischen nicht; während syphilitische Infiltrate vom Centrum aus zerfallen, tritt bei Rhinosclerom entweder gar kein oder nur ein oberflächlicher Zerfall ein; während die rhinosclerotischen Infiltrate monatelang stationär bleiben, verändern sich die syphilitischen schon früher, indem sie heilen oder zerfallen; während das Rhinosclerom auf Antiluetica nicht reagirt, werden die meisten syphilitischen Infiltrate durch dieselben beeinflusst. Die Knoten bei Lupus sind weicher, die durch ihren Zerfall gesetzten Substanzverluste tiefer. Lepröse Infiltrate exulceriren gleichfalls in ganzer Dicke und perforiren das Velum, auch

fehlt niemals die Affection der äusseren Haut, sowie die Anästhesie und Kachexie.

Die Prognose ist ungünstig, da Recidiven stets wiederkehren und die Affection durch Uebergreifen auf den Kehlkopf das Leben direct bedrohen kann.

Die Behandlung ist ziemlich aussichtslos, da eine Allgemeinbehandlung nichts nützt und durch die Localbehandlung zwar zeitweise Besserung aber keine Heilung erzielt wird. Die Obstruction der Nase erfordert Dilatation mittelst Bougies oder Laminaria, Zerstörung der Knoten durch Aetzkali, Chromsäure, scharfen Löffel oder Galvanokauter. Sehr guten Erfolg erzielte Doutrelepont in einem Falle durch zweimalige tägliche Einreibung einer 1% Sublimatlanolinsalbe; auch sind Sublimat-Injectionen zu empfehlen.

Mykosen und Parasiten.

Unter den mykotischen Affectionen der Nase ist der Soor relativ die häufigste; immerhin gehört das Vorkommen des Soorpilzes auf Schleimhäuten mit Flimmerepithel zu den Ausnahmen. Er findet sich fast nur in Gesellschaft des Mund- oder Rachensoors vorwiegend bei Kindern. Er erzeugt Reizung der Schleimhaut mit profuser Secretion und Verstopfung der Nase.

Anderweitige Pilze hat man erst neuerdings kennen gelernt; so kommen ausser verschiedenen Schimmelpilzen zahlreiche Arten von Spaltpilzen und Fäulnissbacterien in dem normalen besonders aber dem fötiden Secret der verschiedenen Nasenerkrankungen vor; sogar Pneumoniococcen hat man darin gefunden. Manche wollen die Mikroorganismen (Ozaenococcus) allein für den üblen Geruch so vieler Nasensecrete verantwortlich machen.

Virchow beschrieb einen Fall von Puccinia graminis in Verbindung mit Aspergillus olivascens; in dem schon citirten Falle von Schubert fand sich eine die Nase und den Nasenrachenraum ausfüllende bröcklig-schmierige aus Aspergillus bestehende Masse, welche einen intensiven Schimmelgeruch verbreitete und einen wässerig-scharfen Nasenausfluss zur Folge hatte.

Makroskopische Parasiten der Nase sind mehr als Fremdkörper zu betrachten, da es keine Thiere gibt, welche auf die menschliche Nase als Brutstätte angewiesen wären. Derartige Parasiten gelangen meist während des Schlafes im Freien oder schwerer Trunkenheit in die Nase, namentlich wenn dieselbe fötides Secret enthält. Gar nicht selten sind Spulwürmer; ferner hat man Ohrwürmer, Tausendfüssler, Madenwürmer, Oestruslarven, Pentastoma taenioides, Fliegeneier und Blutegel vorgefunden; die Affection kommt unendlich viel häufiger in den Tropen als bei uns vor; der indische „Peenash" beruht sehr oft auf der Einwanderung der Eier der Lucilia hominivora.

Die Erscheinungen, welche solche Parasiten verursachen, sind bedingt durch die Art und Grösse. Das erste Symptom ist Kitzeln und Niesen, dann verstopft sich die betroffene Nasenhöhle, es stellt sich schleimige, blutige oder eitrige Secretion und Nasenbluten ein oder ödematöse Schwellung des Gesichtes und Fieber, hämmernde Schmerzen im Kopfe, Schwindel, Schlaflosigkeit, Gehirnreiz, Convulsionen und Coma. In seltenen Fällen haben die Kranken das Gefühl eines sich in der Nase bewegenden Gegenstandes; unter der französischen Armee in Mexiko kamen zahlreiche Selbstmorde vor in Folge der fürchterlichen Schmerzen, welche Fliegenlarven in der Nase erzeugt hatten.

Die Diagnose der Parasiten ist zuweilen, wenn die damit Behafteten selbst keine Anhaltspunkte geben können, eine recht schwierige; immerhin wird durch sorgfältige öfters wiederholte Inspection das Uebel nicht lange verborgen bleiben.

Die Therapie hat sich die Entfernung des Schmarotzers zur Aufgabe zu stellen; jedenfalls ist der Versuch, dieselben mittelst der Nasendouche aus ihren Schlupfwinkeln herauszutreiben, der Extraction mit Instrumenten vorauszuschicken. Als Mittel, welche die Parasiten tödten, gelten Inhalationen von Aether, Alkohol, Benzin, Chloroform, Salmiak, Terpentin, sowie Injectionsflüssigkeiten mit Alkohol, Alaun, Creosot, Carbol, Chloroform, Infuse von Tabak, Eichenrinde sowie Insufflationen von Jodoform und Carbol- oder Thymolpulver, auch Calomel und Sublimat. Mankiewicz empfiehlt Bepinselungen mit Bals. Peruv. In der Regel verschwinden nach der Entfernung des Parasiten alle Erscheinungen, etwa zurückbleibender Nasenfluss muss nach den früher angegebenen Regeln behandelt werden. Die Behandlung des Nasensoors ist dieselbe wie des Mundes.

Blutungen.

Kein Organ zeigt so grosse Neigung zu Blutungen wie die Nasenhöhle. Die Ursache liegt theils in der exponirten Lage theils in dem ausserordentlichen Gefässreichthum.

Unter den Ursachen sind Traumen, Fall, Wurf oder Stoss auf die Nase, Fracturen der Knochen und Knorpel, Einspiessen von Fremdkörpern, Kratzen und Bohren mit den Fingern, Jucken und Reiben der Nasenspitze, heftiges Schneuzen, Berührung mit der Sonde, Katheterismus der Tuba, operative Eingriffe, wohl die häufigsten. Hieran schliessen sich die Blutungen im Verlaufe acuter und chronischer Katarrhe, Geschwüre, blutreicher Neubildungen (Angiome), Fremdkörper und Parasiten. Blutungen durch Stauung und active Hyperämien entstehen bei Keuchhusten, Lungen- und Herzkrankheiten, namentlich bei Aorteninsufficienz und Hypertrophie, bei Schrumpfniere, bei allgemeiner Plethora, ferner bei manchen Leber- und Milz-

affectionen, sowie nicht selten bei Kindern am Ende des Schuljahres in Folge von geistiger Ueberanstrengung, Ueberreizung der Augen und Behinderung des Kreislaufs. Auch die acuten Infectionskrankheiten, namentlich Scharlach, Masern, Typhus, Febris recurrens und Diphtherie stellen ein ziemliches Contingent. Oefters sich wiederholendes Nasenbluten ist ganz gewöhnlich bei Anomalien der Blutmischung. Anämie, Chlorose, Gravidität, Hämophilie, Morb. macul., Leukämie, Scorbut; auch die Blutungen bei Atheromatose oder während der Pubertät und die hereditäre Belastung gehören hieher; die nächste Ursache liegt in der abnormen Brüchigkeit der Gefässwandungen. Relativ noch wenig bekannte aber äusserst häufige Ursache habitueller Epistaxis ist die Verletzung erweiterter kleiner Gefässe, stecknadelkopfgrosser Teleangectasien und borkenbedeckter Erosionen am Septum; sie werden am häufigsten in der vordersten untern Partie des Septum 1—1½ Centim. über dem Nasenboden oder auf diesem, seltener auf der Mitte des Septum oder an den Muscheln angetroffen (sogenannte Prädilectionsstellen). Die Ursache dieser Blutungen liegt in der anatomischen Beschaffenheit des Septums. So fand Kiesselbach in der Schleimhaut des vordern Theiles der Nasenscheidewand dem Schwellgewebe der untern Muscheln völlig gleichende Capillarectasien oder auch stark erweiterte bis zur Basalmembran der Schleimhaut verlaufende Capillaren, ja sogar zuweilen förmliches Schwellgewebe. Auch das Vorkommen vicariirender Nasenblutungen ist sicher constatirt; sie ersetzen theils Blutungen aus dem After, wie bei Hämorrhois, theils die Menstruation; solche an Stelle der Menses auftretende, regelmässig alle 4—6 Wochen wiederkehrende, mit der Schwangerschaft verschwindende Nasenblutungen sind von B. Fränkel mehrfach citirt. Sie sind offenbar fluxionärer resp. vasomotorischer Natur und durch die zur Zeit der Menses herrschende gesteigerte Reflexerregbarkeit hervorgerufen. Intermittirendes Nasenbluten kommt bei Wechselfieber vor.

Viel seltener als freie Blutungen sind solche in und unter die Schleimhaut. Sie stellen bald kleine stecknadelkopf- bis bohnengrosse Ecchymosen bald tumorartige Geschwülste, Hämatome vor. Sie entstehen theils spontan theils durch Verletzungen, namentlich nach Fracturen des knöchernen und knorpeligen Septum. Ihre Oberfläche ist glatt, weich, ihre Farbe tiefroth bis schwarz, die angrenzende Schleimhaut erscheint ecchymosirt; meist ist die Geschwulst doppelseitig und fluctuirt, auch kann sie so gross werden, dass sie zur Nasenöffnung heraustritt.

Bei freien Blutungen träufelt das Blut entweder allmählich und langsam oder schnell und stromweise aus einem oder beiden Nasenlöchern hervor; bei Blutungen in den hintern Partien der Nase tritt es durch die Choanen und wird verschluckt, erbrochen oder durch den Mund entleert. Die Quantität des ergossenen Blutes ist äusserst variabel und schwankt von einigen Tropfen bis zu mehreren Pfunden; die Farbe ist meist lebhaft roth, bei Gerinnung und langsamer Entleerung braunroth, schwarz. Manchen Formen von Nasenbluten gehen

Herzklopfen, Eingenommenheit und Röthe des Kopfes, dumpfer Druck, Pochen in der Stirne, Ohrensausen und Schläfrigkeit voraus; nachher fühlen sich die Kranken meist sehr erleichtert. Habituelle Epistaxis führt oft zu Anämie und Schwäche; sehr heftige acute Blutungen können Ohnmachten, Herzschwäche ja selbst den Tod zur Folge haben; bei profuser Hämorrhagie während des Schlafes oder einer Ohnmacht ist die Gefahr der Aspiration eine sehr grosse. Ecchymosen verlaufen meist symptomlos, grössere Hämatome haben Verstopfung der Nase, Störungen des Geruchs, zuweilen dumpfen Schmerz zur Folge.

Die Diagnose der freien Blutungen ist in der Regel leicht, zumal wenn das Blut aus den Nasenlöchern sich entleert oder die blutende Stelle gesehen werden kann, wobei man zuerst auf die erwähnten Prädilectionsstellen sein Augenmerk zu richten hat. Schwieriger wird die Diagnose bei Blutungen durch die Choanen oder in Bezug auf den Entscheid, ob das ergossene Blut aus den Lungen, dem Magen oder Rachen stammt. Der Hämoptoe gehen gewöhnlich spannender dumpfer Schmerz in der Brust oder Stechen, Husten und anderweitige Symptome der Phthise oder von Klappenfehlern voraus, der Hämatemesis Erscheinungen von Seite des Magens, Schmerz, Erbrechen, Uebligkeit, Aufstossen; Blutungen aus dem Rachen werden durch die Inspection eventuell die Rhinoscopia posterior erkannt, Hämatome und Ecchymosen durch die Rhinoscopia anterior.

Die Prognose richtet sich nach der Ursache und der Dauer resp. Schwere der Blutung. Sehr ungünstig ist dieselbe bei Schädelfracturen und bei hämorrhagischer Diathese; bei letzterer deshalb, weil sich diese Blutungen wiederholen und wir kein sicheres Heilmittel für das Grundübel besitzen. Dass profuse Blutungen mit Ohnmacht, Verschwinden des Pulses stets gefährlich sind, zumal wenn ärztliche Hilfe fehlt, ist selbstverständlich; ebenso, dass profuse oder recidivirende Blutungen im Verlaufe schwerer fieberhafter Krankheiten des Typhus, der Diphtherie etc. oder mit linksseitiger Herzhypertrophie verbundener Atheromatose eine zum mindesten zweifelhafte Prognose geben und oft schwere Anämie zurücklassen.

Therapie. Da manche Blutungen so namentlich die der Plethorischen, Hämorrhoidarier, Herzkranken und Amenorrhoischen einen wohlthätigen Einfluss auf das Allgemeinbefinden äussern, so erscheint eine Behandlung so lange unnöthig, als die Blutung keine excessive ist. Auch bei den übrigen Formen richte man sein Handeln nach der Intensität der Blutung. Am leichtesten gelingt es, der aus dem vordern Theile des Septum oder aus andern Prädilectionsstellen stammenden Blutung durch Compression des entsprechenden Nasenflügels mit dem Finger oder durch Einführen eines Stückchens Watte, Feuerschwamm etc. Herr zu werden. Das so sehr beliebte Schnauben, Schneuzen und Vorwärtsneigen des Kopfes verlängert die Blutung und ist absolut zu verbieten. Bei mässigen Blutungen aus den tiefern Theilen der Nase empfiehlt sich die Nasendouche oder das Aufschnupfen adstringirender Wässer aus Alaun, verdünntem Essig, Liq. ferri sesquichl.

10 Tropfen auf $^1/_4$ Liter Wasser; bei starken Blutungen erweisen sich diese sowie die zahllosen Volksmittel erfolglos.

Das sicherste Verfahren ist die Tamponade. In der Mehrzahl genügt die vordere Tamponade; ein circa fingerlanges 1—2 Centim. dickes, mit einem Faden umwickeltes Stück gewöhnlicher oder blutstillender Watte oder ein Streifen hydrophilen Stoffes, Carbolgaze etc. wird mittelst einer Pincette oder der Gottstein'schen Schraube eingeführt und auf die blutende Stelle mittelst Sonde fest angedrückt; sodann folgt ein zweites eventuell drittes bis zur völligen Ausfüllung der Nase; die zu den Nasenöffnungen heraushängenden Fäden werden entweder um das Ohr gewickelt oder mittelst Pflaster auf dem Nasenrücken befestigt und erst nach 24 Stunden entfernt. Kommt man auf diese Weise nicht zum Ziele, dann schreite man zur hinteren Tamponade. Im Nothfalle genügt ein elastischer Katheter. Man zieht durch die Oeffnungen desselben einen dicken gewichsten Faden, Catgout oder starke antiseptische Seide, schiebt den Katheter durch die Nase so weit vor, bis der Faden hinter dem Velum sichtbar wird; derselbe wird mit einer Pincette oder Zange gefasst, zur Mundhöhle herausgezogen und 10—20 Centim. vor seinem Ende mit einem trocknen Wattetampon von der Grösse einer Wallnuss versehen; durch Herausziehen des Katheters wird der Tampon eventuell unter Zuhilfenahme des Zeigefingers in den Nasenrachenraum befördert und in die Choane eingezogen. Der aus dem Munde heraushängende Faden dient zur Herausnahme des Tampons, der aus der Nase herausstehende wird in der oben angegebenen Weise befestigt. Leichter ist die Tamponade mittelst der Bellocque'schen Röhre, da die Feder mit dem an ihrem vordern Ende befestigten Faden das Velum schneller umgeht; nur wäre zu wünschen, dass die im Handel vorkommenden Instrumente bedeutend graciler seien. Die Befestigung und Einführung des Tampons geschieht in derselben Weise wie beim Katheter. Der Choanentampon darf höchstens 48—60 Stunden liegen bleiben, da bei allzulangem Verweilen desselben Gangrän, Tetanus, Erysipel und Pyämie beobachtet wurden.

Unter den zahlreichen andern für die Tamponade bestimmten Instrumenten sind zu erwähnen der Rhineurynter, das Rhinobyon, sowie der intranasale Tampon von Cooper Rose; alle bestehen aus einem dünnen Gummisack, der mit einer durch einen Hahn verschliessbaren Röhre in Verbindung steht, leer längs des Nasenbodens bis an die Choanen vorgeschoben und dann aufgeblasen oder mit Wasser gefüllt wird; die Sicherheit dieser Instrumente lässt jedoch viel zu wünschen übrig. Steht auch dann die Blutung nicht, oder ist Gefahr im Verzuge, dann ist die Transfusion indicirt.

Hauptindication der Therapie ist es zweitens, das Grundübel zu beseitigen und die Wiederkehr der Blutung zu verhindern. Eine solche Radicalheilung ist fast stets möglich bei denjenigen Blutungen, welche pathologischen Veränderungen der Nasenschleimhaut ihre Entstehung verdanken, also bei ectatischen oder oberflächlich gelegenen

Gefässen, Katarrhen, Polypen, Fremdkörpern, Parasiten, Geschwüren, Excoriationen. Das beste Mittel zur Zerstörung der Prädilectionsstellen ist der Galvanokauter, der langsam und rothglühend bis auf den Knorpel oder Knochen durchdringen muss. Oefters gelingt es auch, durch innere Medicamente namentlich Eisen, Chinin, Landaufenthalt, das Blut zu verbessern und die Disposition zu Epistaxis zu mindern; als innerliche Styptica eignen sich besonders das Ergotin, auch subcutan, Liq. ferri sesquichl., Acid. sulfur., Plumb. acet. Plethorische und Hämorrhoidarier schicke man nach Karlsbad, Kissingen, Homburg, Marienbad, oder lasse sie zuhause längere Zeit laxiren und Alcoholica auf's Strengste vermeiden; bei den letzteren empfehlen sich auch prophylaktische Blutentziehungen namentlich Blutegel ad anum. Um der Menstruation ihren normalen Weg zu weisen, sind Scarificationen der Vaginalportion, warme Irrigationen, heisse Fussbäder, Pilulae aloeticae ferratae zu verordnen. Hämatome müssen an der tiefstgelegenen Stelle baldigst entleert eventuell in ganzer Ausdehnung gespalten werden, ebenso wenn ihr Inhalt bereits eitrig geworden ist.

Fremdkörper und Concretionen.

Fremdkörper in der Nase kommen fast nur bei Kindern, selten bei Erwachsenen und da meist nur bei Geisteskranken zur Beobachtung.

Zu den gewöhnlichen Dingen, welche sich Kinder beim Spielen in die Nase stecken, gehören Erbsen, Bohnen, Knöpfe, Kirschen- und Zwetschkenkerne, Glasperlen, Nägel, Steine, Holzstücke, kleine Schwämme, Papier- und andere Kugeln, Sohlenleder etc. Bei Erwachsenen bleiben manchmal nach Verletzungen Kugeln oder abgebrochene Messerklingen oder anderweitige Dinge stecken, wie bei einem von Voltolini beobachteten Kranken, der nach einem Falle eine grosse Anzahl zerbrochener Schilfrohre ein Vierteljahr lang in seiner Nase beherbergte. Endlich können auch Tampone aus Vergessenheit zurückbleiben oder Speisetheile durch den Brechact in die Choanen gelangen.

Die Erscheinungen, welche Fremdkörper verursachen, sind bedingt durch ihre physikalischen Eigenschaften und den Zeitraum, während dessen sie in der Nase verbleiben. Bohnen, Erbsen, quellen auf und treiben Wurzeln und Auswüchse. Spitzige Gegenstände verursachen bald nach ihrem Hineingerathen ausser Schmerz Blutungen, rundliche erzeugen Schwellungen der Schleimhaut mit Anfangs seröser später eitriger Secretion, geringerer oder stärkerer Unwegsamkeit der betroffenen Nasenhälfte. Je länger ein Fremdkörper in der Nase verbleibt, um so fötider wird die Secretion, um so heftiger der Kopfschmerz und der Druck im Gehirne; Ulcerationen, Usur der Knochen, polypöse Wucherungen sind die gewöhnlichen Folgen. Nicht selten schwillt auch die Haut der Nase und der Wangen an, durch das

scharfe fötid-sanguinolente Secret wird die Oberlippe erodirt, oder es entsteht durch Verlegung des Thränennasenganges Thränenträufeln, Conjunctivitis etc.

Dieselben Erscheinungen machen auch Concretionen, die sogenannten Nasensteine oder Rhinolithen, zu deren Ablagerung die unregelmässige Form der Nasenhöhle besonders geeignet erscheint. Den häufigsten Anlass zur Bildung derselben geben Fremdkörper, welche sich an ihrer Oberfläche mit Kalk incrustiren; manchmal wird der Kern einer solchen Concretion von eingetrocknetem Secrete oder einem Blutcoagulum gebildet. Zuweilen findet sich nichts dergleichen, wie in einem von Schmiegelow mitgetheilten und auch symptomatisch wegen halbseitigen Schwitzens am Kopfe interessanten Falle. Hering beobachtete einmal eine fast vollständige cementharte Verkittung der Nasenhöhle; die Rhinolithe bestehen der Hauptmasse nach aus 80% anorganischer Substanzen besonders aus phosphorsaurem kohlensaurem Kalk, phosphorsaurer Magnesia, etwas Eisenoxyd und zu 20% aus organischen Stoffen.

Nach B. Fränkel darf man die Steinbildung mit der Verkalkung der Schleimhaut nicht verwechseln; die letztere findet sich in der Nase alter Leute, zuweilen auch bei jüngeren Personen, in Folge der Diathesis ossificans; namentlich kann die Schleimhaut der Nebenhöhlen und die der Muscheln feinkörnig und in Plattenform verkalken und ein weisses Aussehen annehmen.

Die Diagnose der Fremdkörper und Concretionen ist bei Kindern oder da, wo die Anamnese fehlt, nur durch die objective Untersuchung zu stellen. Fötider auf eine Nasenhälfte beschränkter Ausfluss bei Kindern muss stets in erster Linie den Verdacht erwecken, dass derselbe durch einen Fremdkörper bedingt sei. Bei dem heftigen Widerstande der kleinen Patienten ist behufs genauer Untersuchung der ohnehin engen Nase die Narkose meist unentbehrlich; da die Inspection wegen der oft enormen Schwellung und reichlichen Secretion in der Regel keinen oder ungenügenden Aufschluss gibt, so beruht die Diagnose meist auf der Sondirung, aber auch diese kann irreführen so z. B. zu einer Verwechslung eines Rhinolithen mit einem Sequester Anlass geben.

Die Entfernung der Fremdkörper oder Rhinolithen erheischt nicht nur Umsicht sondern auch Geschicklichkeit. Frisch in die Nase gelangte rundliche Körper können unter Umständen durch Schneuzen, durch Niespulver oder die Douche in die freie Nasenhöhle herausbefördert werden; Fremdkörper, welche längere Zeit liegen und sich eingekeilt haben, müssen unter Leitung des Spiegels mit der Zange, Pincette oder anderen geeigneten Instrumenten extrahirt werden. Bei glatten Gegenständen, welche durch andere Instrumente sehr leicht noch tiefer in die Nase hineingetrieben werden, benützt man am besten eine an ihrem vorderen Ende löffel- oder ösenartig umgebogene Sonde, welche vorsichtig hinter den Fremdkörper gebracht wird. Bei Kindern ist die Narkose meist unentbehrlich, bei Erwachsenen unnöthig oder durch Cocainisirung zu ersetzen. Concremente, welche wegen ihrer

Grösse oder Härte nicht in toto extrahirt werden können, müssen mittelst Zangen oder lithothriptorartiger Instrumente zuerst verkleinert und stückweise entfernt werden. Dieselben ebenso wie Fremdkörper ohne weiteres durch die Choanen in den Rachen zu stossen, ist roh und nur dann gestattet, wenn die Entfernung durch die vorderen Nasenöffnungen unmöglich ist; doch verbiete man während dieser Manipulation das Athmen oder führe den Finger in den Nasenrachenraum ein.

Neubildungen und Geschwülste.

Es ist sehr schwer, eine strenge Grenze zu ziehen zwischen Schleimhauthypertrophie und wirklicher Neubildung; man wird deshalb im Hinblicke auf die zahlreichen Uebergangsformen, die wir bereits bei der chronischen Rhinitis kennen lernten, gut thun, nach dem Vorgange Hopmann's die letzteren namentlich die cavernösen, teleangectatischen Tumoren und warzigen Gebilde der Muscheln als polypoide Geschwülste (Schleimhauthypertrophien), die wirklichen Neubildungen aber als Polypen zu bezeichnen.

Ihre Aetiologie ist ziemlich dunkel; dass Reizzustände der Schleimhaut namentlich chronische Katarrhe eine gewisse wenn auch nicht einzige Rolle spielen, ist umsoweniger zweifelhaft, als Polypen in der einen, Schleimhauthypertrophien in der andern oder gleichzeitig nebeneinander ganz gewöhnlich vorkommen.

Das männliche Geschlecht ist ganz besonders bevorzugt, was mit der geringeren Schonung der Schleimhäute, also auch jener der Nase, zusammenhängen mag. Auffallend bleibt nur, dass trotz der grossen Häufigkeit der Nasenkatarrhe im Kindesalter Neubildungen vor dem 15. Lebensjahre relativ sehr selten sind, eine Thatsache, die von den meisten Autoren constatirt ist, von Hopmann aber auf Grund mehrerer Beobachtungen in Zweifel gezogen wird. Ueber die Aetiologie der bösartigen Neubildungen wissen wir ebensowenig wie über jene in anderen Körpertheilen.

Die häufigste Art der gutartigen Neubildungen sind die Schleimpolypen.

Sie stellen weiche, ödematöse, gallertartig durchscheinende, bläulichweisse oder gelbliche, seltener röthliche oder intensiv rothe Geschwülste von Stecknadelkopfgrösse bis Daumenlänge vor. Ihre Form ist meist länglich-rund, birnförmig; die grösseren nehmen constant die Form des Raumes an, in welchem sie sich accomodirend weiterwachsen, und sind deshalb in der Regel platt, mehr lang als breit. Sind sie gestielt, dann hängen sie als längliche sackartige, im Luftstrome bewegliche Gebilde in die Nasengänge herein oder füllen den Nasenrachenraum aus, bei sehr breitem Stiele oder diffuser Insertion bilden sie unregelmässige, wenig oder gar nicht bewegliche Geschwülste. Mit besonderer Vorliebe entspringen sie von den Kanten der mittleren Muschel oder vom Nasendach, von der äusseren Wand

der Nase, in dem Zwischenraum zwischen unterer und mittlerer Muschel, so namentlich in den Vorsprüngen und Leisten des Infundibulum, seltener an der unteren Muschel, am seltensten am Septum oder dem Boden der Nasenhöhle. Sie lieben die Gesellschaft, ein Exemplar gehört zu den grössten Seltenheiten, meist sind mehrere vorhanden, oft steigt ihre Zahl auf 20, doch hat Verfasser auch schon 30—40 ja einmal bei einem Kranken 65 Stück aus beiden Nasenhöhlen entfernt; seltener ist nur eine Nase befallen, meistens beide, in hochgradigen Fällen sind beide von vorne bis hinten förmlich damit ausgestopft. Die Schleimpolypen behalten die Elemente der Schleimhaut, aus welcher sie hervorgehen, bei, ihr Epithel besteht fast immer aus Flimmerzellen, deren Bewegung an frischexstirpirten Exemplaren ein interessantes Demonstrationsobject abgibt.

Nach Billroth überwiegt bald das Bindegewebe bald das Drüsengewebe; in ersterem Falle stellen sie weiche Fibrome, in letzterem Adenome vor, deren neugebildete hypertrophische Drüsen durch ein weitmaschiges ödematöses Bindegewebe zusammengehalten werden. M. Mackenzie nennt die Schleimpolypen myxomatöse Geschwülste, Hopmann weiche Fibrome, bestehend aus einem weitmaschigen Netzwerk von areolärem Bindegewebe, dessen Maschen zum Theil mit Zellen zum Theil mit Albuminserum gefüllt sind, und die manchmal serum- oder eiterhaltige Cysten enthalten. Verfasser operirte ferner einmal eine von dem hinteren Ende der mittleren Muschel entspringende und den ganzen Nasenrachenraum ausfüllende Geschwulst, welche eine einzige Cyste mit dickem chocoladefarbigem Inhalt darstellte.

Eine andere Form von Nasenpolypen sind die Papillome. Sie kommen ausschliesslich an den unteren Muscheln vor als partielle oder diffuse, selten gestielte oder scharf von der gesunden Schleimhaut abgrenzbare breitbasige Geschwülste von papillärem Bau. Die Papillen sind entweder dicht gedrängt oder locker stehend, in letzterem Falle sind die einzelnen mehr entwickelt und hängen beerengleich an kurzen dicken Stielen zusammen. Ihre Farbe variirt von hellrosa bis kirschroth, ihre Consistenz von der Weichheit der Schleimpolypen bis zur Derbheit eines Fibrosarcoms. Die meisten sind weich, beerenartig, seltener aus blattförmig angeordneten Papillen zusammengesetzt. Von Andern, so besonders von Schäffer und Zuckerkandl, werden diese Papillome als teleangectatische Tumoren, von Steinbrügge als teleangectatische Fibrome beschrieben. Am Septum namentlich dem vorderen unteren Ende, kommen Angiome, die man auch als erectile Geschwülste bezeichnet, nicht selten vor.

Geschwülste, deren Hauptmasse aus derbem Bindegewebe besteht, bezeichnet man als Fibrome. In den vorderen Theilen der Nase gehören dieselben zu den Seltenheiten, häufiger sind sie in den hintersten Abschnitten der Nase und stellen dann die Nasenrachenpolypen in engerem Sinne vor. Meist enthalten sie neben Bindegewebe elastische Fasern, Rundzellen und erweiterte Gefässe, können also auch Fibrosarcome genannt werden. Sie entspringen fast ausschliesslich

von der oberen Wand der Nase, von der Schleimhaut oder dem Periost des Vomer, der Pars perpendicularis des Gaumenbeins, von dem Keilbeinkörper oder dem inneren Flügel seines Proc. pterygoideus, der Keilbeinhöhle oder von der Aponeurose des Foram. lacer. anter. (siehe Fig. 12 und 13). Sie stellen derbe, kugelige oder flaschenförmige, meist breitgestielte, langsam wachsende, solitär auftretende Geschwülste vor, welche oft eine enorme Grösse erreichen, den ganzen Rachen ausfüllen und in die Nase hineinwuchern. Die mehr sarcomatösen sehr zellenreichen Formen dringen mit Vorliebe in die Schädelhöhle ein, während die rein fibrösen als gutartige Geschwülste zu bezeichnen sind.



Fig. 12.

Vom Vomer ausgehender Nasenrachenpolyp.



Fig. 13.

Vom Keilbein ausgehender Nasenrachenpolyp.

Zu den bösartigen aus kleinen oder grossen Rund- oder Spindelzellen bestehenden Neubildungen gehören die Sarcome. Sie sind von verschiedener Consistenz und sehr blutreich; manche Formen wachsen äusserst langsam, manche sehr schnell. Mit besonderer Vorliebe nehmen sie vom Septum cartilagineum ihren Ausgang, und zwar theils als circumscripte breitbasige Geschwülste, theils als diffuse flache oder knotige Infiltrate, die auf den Nasenboden, die Muscheln, den Nasenrachenraum etc. fortwuchern und zu Perforation des Septum, Caries der Knochen, Anlass geben. Sie kommen in jedem namentlich in höherem Alter vor, doch hat Moure auch einen Fall bei einem $2^1/_2$jährigen Kinde beschrieben.

Carcinome gehören glücklicherweise zu den Seltenheiten; sie bestehen aus Pflasterepithel und stellen bald flache oder knotige Infiltrate, bald weiche blumenkohlartige Gebilde dar, welche äusserst rasch wachsen, in die Nebenhöhlen eindringen, die benachbarten Theile, Orbita und Mundhöhle, verdrängen, in den Nasenrachenraum und die Schädelhöhle hineinwachsen und selbst auf die äussere Haut übergreifen.

Die Möglichkeit, dass ursprünglich gutartige Neubildungen sich mit der Zeit in bösartige umwandeln, ist von Bayer mit Recht zugegeben worden; Verfasser sah selbst zu wiederholten Malen Schleimpolypen in sarcomatöse fast nur aus Zellen bestehende Geschwülste sich umwandeln.

Die bereits früher erwähnten Leisten und Spinen des Septum sind theils Ecchondrosen, theils Exostosen und Hyperostosen. Ausserdem kommen noch Knochenblasen, Echinococcus-Geschwülste, Enchondrome, Osteome, die beiden letzteren namentlich am Septum und den Muscheln und bei jugendlichen Personen Myxome, Elfenbeinosteome, Hirnbrüche vor. Zu den merkwürdigsten Gebilden gehören jene Geschwülste, welche theilweise oder ganz aus Haaren bestehen, oder Knorpel, Knochen, Fett und Bindegewebe, Drüsensubstanz enthalten; Zahnbildung in der Nase ist mehrfach unter Anderen von Schäffer und Fletcher Ingals beobachtet worden.

Die Symptome der Neubildungen sind bedingt durch ihre Grösse und ihren Sitz. Kleinere Geschwülste, besonders Schleimpolypen am Nasendache und an der mittleren Muschel, können völlig symptomlos verlaufen und werden oft zufällig entdeckt. Mit dem weiteren Wachsthum treten die bereits öfters geschilderten Erscheinungen nasaler Obstruction ein. Teleangektatische Geschwülste (Angiome) namentlich solche am Septum sowie Papillome geben zu häufigen und profusen Blutungen Anlass. Durch die Ausfüllung der Nase mit sehr vielen oder sehr grossen Polypen werden nicht nur das Septum verdrängt und die Muscheln atrophisch, sondern auch die äussere Form der Nase verändert, der Nasenrücken erscheint breiter und platter, die Nasenbeine stehen in stumpfem Winkel zu einander. Zuweilen ist das Gefühl eines in der Nase sich bewegenden Fremdkörpers vorhanden, oft treten die Polypen zur vorderen Nasenöffnung heraus. Nasenrachenpolypen haben ausser Störung der Sprache Obstruction der Nase und Schluckbeschwerden oder das Gefühl eines Fremdkörpers im Rachen, Brechneigung, reichliche Secretion, dumpfen Druck im Kopfe und oft eine ganz auffallende Schläfrigkeit sowie Gehörstörungen zur Folge. Durch Druck auf den Thränennasengang entsteht Thränenträufeln, durch Verschluss der Sinusmündungen Mukokele oder Empyem. Bösartige Neubildungen machen oft lange Zeit dieselben Erscheinungen wie gutartige, im weiteren Verlaufe stellen sich jedoch blutig-eitrige äusserst fötide Secretion, heftiges und häufiges Nasenbluten, Schmerzen in der Nase und unter den Augen, Trigeminusneuralgien, Exophthalmus, Röthung und Ulceration der Haut, Kachexie, Pyämie oder Gehirnerscheinungen ein. Constant schwellen die Lymphdrüsen unter dem oberen Ende des Kopfnickers an und bilden im weiteren Verlaufe faustgrosse, steinharte Tumoren, die wiederum Unbeweglichkeit des Kopfes, Schmerzen und Neuralgien im Gebiete des Plexus cervicalis erzeugen.

Besonders häufig sind bei allen Neubildungen Erscheinungen von Seite des Nervensystems, Kopfschmerz, Schwindel, Abnahme des

Gedächtnisses, Unfähigkeit zu geistiger Arbeit, sowie die später zu besprechenden Reflexneurosen.

Da das Nähere in dem Capitel Reflexneurosen besprochen werden wird, so kann an dieser Stelle nur das Asthma in seinen Beziehungen zu Nasenpolypen erörtert werden.

Vor allen Dingen ist zu constatiren, dass Asthma im Verhältnisse zu der grossen Häufigkeit der Polypen nicht gar häufig auftritt, auch stimmen die meisten Beobachter darin überein, dass Asthma bei Polypen, welche symptomlos verlaufen oder die Nase nur theilweise verstopfen, häufiger ist als da, wo beide Nasenhöhlen völlig undurchgängig sind. Das Fehlen von Asthma bei völliger Verlegung der Nase erklärt sich einestheils aus der Gewöhnung an die ausschliessliche Mundathmung, der Herabsetzung der Reizempfänglichkeit der in beständigem Contacte mit den Neubildungen befindlichen Schleimhaut, sowie aus der Unmöglichkeit des Hineingerathens von äussern Reizen in die Nase und der durch die Compression des erectilen Muschelüberzugs erzeugten Unfähigkeit, anzuschwellen und sich auszudehnen.

Die Diagnose stützt sich auf die Inspection und Palpation. Während die erstere mehr im Allgemeinen über das Vorhandensein von Polypen Aufschluss gibt, belehrt uns die Sonde über Anheftungsweise, annähernde Grösse und beiläufige Zahl. Niemals versäume man, beide Nasenhöhlen zu untersuchen, selbst wenn die Kranken angeben, nur auf einer Seite verstopft zu sein. Sehr schwer, ja unmöglich ist die Diagnose der kleineren Geschwülste am Nasendach oder in der Tiefe des mittleren Nasenganges sowie der lateralen Wand der Nase, oder wenn Verbiegungen des Septum oder Spinen vorhanden sind. Die Nasenrachenpolypen können nur durch die Rhinoscopia poster. und die Digitaluntersuchung ermittelt werden.

Die Prognose richtet sich nach dem Sitze und dem histologischen Bau. Dass die Prognose in Folge der Fortschritte der Rhinochirurgie gegen früher eine viel günstigere wurde, wird Niemand leugnen wollen. Wiederherstellung der Nasenathmung kann fast immer erzielt werden und damit auch die Beseitigung der durch sie bedingten Beschwerden; die Prognose wird nur einigermassen getrübt durch die ausgesprochene Tendenz der meisten Nasenpolypen zu Recidiven; dennoch wird sehr oft Radicalheilung erzielt; die Recidiven sind nicht zum geringsten Theile durch zu geringe Ausdauer der Patienten bedingt, theilweise auch durch zu wenig energische Behandlung des Stieles und durch die Unmöglichkeit, in der Tiefe verborgenen Neubildungen beizukommen. Selbst sarcomatöse Polypen können bei günstigem Sitze gründlich geheilt werden; dass bösartige Geschwülste so besonders weiche Carcinome oder diffuse Sarcome eine infauste Prognose geben, ist erklärlich.

Die Behandlung kann nur eine operative sein. Aetzungen mit Höllenstein oder Betupfen mit Chromsäure oder die Elektrolyse müssen als zwecklose oder zu zeitraubende Spielereien bezeichnet werden.

Dass durch die früher und noch heute vielfach geübte Methode, das Ausreissen mit der Kornzange ohne Controle des Spiegels, nur ausnahmsweise Radicalheilung erzielt wird, ist einleuchtend; was soll es auch dem meist mit zahlreichen Polypen behafteten Kranken nützen, wenn der vorderste gerade sichtbare Polyp theilweise oder auch ganz entfernt wird? Abgesehen von der Nutzlosigkeit dieses Verfahrens ist dasselbe, wie Voltolini es schon vor Jahren mit Recht nannte, ein sehr rohes und schmerzhaftes, indem Verletzungen der Muscheln, Ausreissen gesunder Schleimhauttheile, ganz unvermeidlich sind.



Fig. 14. Schlingenschnürer für die Nase (kalte Schlinge).

Etwas Anderes ist die Operation mit passend gekrümmten schneidenden Zangen, wenn sie von kundiger Hand und unter Leitung des Spiegels vorgenommen wird; dass durch diese Methode Radicalheilung erzielt werden kann, wird Niemand in Abrede stellen.

Die schonendste Methode aber ist die Entfernung mit der kalten Schlinge, um deren Einführung sich besonders Zaufal verdient machte; die schon einmal mit der Kornzange Operirten können dieselbe nicht genug loben. Die Zahl der Polypenschnürer und Ecraseure ist eine sehr grosse. Ob der Handgriff ein viereckiges abgebogenes Metallstück mit einem darauf verschiebbaren Querbalken oder wie beim Tobold'schen Ecraseur einen flachen Stab mit Schlitten vorstellt, ob die Biegung im Handgriff oder in der Röhre liegt, ist höchst gleichgiltig, fast jeder Operateur hat sein eigenes Instrument und bezweifelt Verfasser nicht im Geringsten, dass jedes geeignet ist. Verfasser hat, um das Instrumentarium nicht unnöthigerweise zu vertheuern und um den Handgriff auch für Operationen im Kehlkopf verwenden zu können, den Tobold'schen Ecraseur (Figur 14) etwas

modificirt und durch Verstärkung des Griffes, Versetzen des einen Ringes an das hintere Ende und durch die Drehbarkeit desselben dem Instrumente für Operationen in der Nase grössere Kraft und Handlichkeit verschafft. Die Röhren, durch welche guter Eisendraht oder Messingdraht gezogen wird, gehen von dem Handgriffe in stumpfem Winkel ab, haben eine Länge von circa 14 Centim. und beiläufig 1 Millim. vom vordern Ende entfernt einen Querbalken, auf welchem die gefasste Geschwulst durchschnitten werden kann; die Schlinge wird um einen auf dem Schlitten angebrachten Haken durch mehrmaliges Umwickeln befestigt.

Die Operation gestaltet sich folgendermassen: Nachdem mit dem in der linken Hand gefassten Spiegel der Naseneingang dilatirt und mittelst des Stirnbindenreflectors gut beleuchtet wurde, bringt man die mit der andern Hand gefasste der Grösse des zu entfernenden Polypen entsprechende Schlinge in verticaler Richtung in die Nase, schiebt sie unter den zuvorderst sitzenden Polypen, bringt sie möglichst hoch gegen die Ursprungsstelle desselben hinauf und schnürt zu. Der Polyp bleibt entweder in der Schlinge oder er fällt aus der Nase heraus, bei sehr beträchtlicher Grösse muss er förmlich entbunden werden; die Blutung ist bei dünnem Stiele äusserst gering, bei breiter Anheftung manchmal beträchtlich aber ungefährlich, der Schmerz gering oder mässig. Nach Stillung der Blutung und Entfernung der Coagula und des Schleims legt man die Schlinge an den zunächst folgenden Polypen in derselben Weise an und so fort bis alle entfernt sind. Bei dünnem Stiele, geringer Blutung und wenigen Polypen ist die Operation in kürzester Zeit vollendet.

Ganz anders ist dies, wenn eine oder gar beide Nasenhöhlen vollständig impermeabel sind, oder wenn man es mit breitaufsitzenden, flachen Neubildungen zu thun hat. In ersterem Falle muss das abträufelnde und sofort gerinnende Blut und der reichlich abgesonderte Schleim nach jedem Eingriff mit der Pincette oder Spritze entfernt werden, was nicht nur äusserst zeitraubend sondern auch oft recht schwierig ist. In solchen Fällen braucht man bis zur Wiederherstellung des Luftdurchzugs stets wiederholter Sitzungen.

Polypen mit sehr dickem Stiele oder flache, breit aufsitzende Wucherungen setzen der kalten Schlinge energischen Widerstand entgegen; sie müssen deshalb mit der galvanokaustischen Schlinge entfernt werden; oft muss man abwechselnd mit beiden Schlingen arbeiten. Trotz des hohen Preises kann Verfasser zur Glühschlinge nur Platindraht empfehlen; Eisen- oder Stahldraht ist viel brüchiger als Platin, schmilzt bei dem Zusammenziehen der Schlinge leicht und macht durch Rostbildung die Röhren sehr bald unbrauchbar.

Die grössten Schwierigkeiten bieten sich bei der Entfernung von Neubildungen in engen oder krummen Nasen sowie bei solchen in der Nähe der Choanen. Durch Uebung und Geschicklichkeit wird man unter Benützung der beschränktesten Raumverhältnisse mit der Zeit auch diese Hindernisse überwinden lernen.

Wie es zur Ausrottung eines Unkrautes nicht genügt, dasselbe über dem Boden abzuschneiden, ebenso darf man sich auch mit dem Abschneiden der Polypen nicht zufrieden geben. Jetzt erst beginnt der wichtigste Theil der Behandlung, die Zerstörung des Stieles und des Mutterbodens. Je energischer und sorgfältiger dieselbe geschieht, um so günstiger sind die Aussichten auf Radicalheilung, je nachlässiger, um so sicherer sind Recidiven. Man hat oft seine liebe Noth, dem mit der Wiederwegsammachung der Nase völlig zufriedenen Patienten die Nothwendigkeit dieser Procedur begreiflich zu machen. Aetzungen mit Lapis in Substanz sind zu schwach; besser ist die Chromsäure oder Chlorzink, am besten aber die Galvanokaustik; passend geformte Brenner werden an die Stielreste angedrückt oder in dieselben eingebohrt und möglichst tief zerstört. Die Cauterisation ist so gut wie nicht schmerzhaft, so lange man sich auf krankem Boden befindet, wird aber schmerzhafter, je mehr man sich dem gesunden Gewebe nähert; meist werden in die Augen, die Stirne sowie in die Zähne des Ober- und Unterkiefers ausstrahlende Schmerzen angegeben.

Operirt man auf diese Weise, dann erzielt man selbst da noch Radicalheilung, wo es kaum möglich erschien. Nicht so günstig sind die Aussichten bei den sarcomatösen Polypen oder bei förmlicher polypöser Degeneration der Muscheln. Wenn auch eine oft mehrere Monate selbst Jahre anhaltende Heilung erzielt werden kann, so hat man doch neue Recidiven zu bekämpfen. M. Mackenzie empfiehlt deshalb bei stets wiederkehrenden Polypen, nicht ein Stück der Schleimhaut sondern die ganze Muschel mit der Zange oder dem schneidenden Meissel abzutragen.

Im Hinblicke auf den praktischen Standpunkt dieses Buches mögen hier noch einige Bemerkungen über unangenehme Zwischenfälle, Reaction und Nachbehandlung Platz finden.

Unter den unangenehmen Ereignissen während oder nach der Operation ist die Blutung die häufigste. Man hat es früher als einen besonderen Vorzug der Galvanokaustik bezeichnet, dass Blutungen durch dieselbe so gut wie völlig verhütet würden. Wenn dies auch nicht richtig ist, so kann doch einer profusen Blutung dadurch vorgebeugt werden, dass man den Strom öfters unterbricht und das Weissglühen des Instrumentes vermeidet. Geringfügigere Blutungen stehen meist nach Injection kalten oder mit Eisenchlorid versetzten Wassers, stärkere durch Einlage von (Eisenchlorid-) Wattetampons auf die blutende Stelle, eventuell durch die Tamponade der ganzen Nase. Zuweilen entstehen, namentlich bei Operationen am Nasendache und der mittleren Muschel, Nieskrämpfe oder Thränenträufeln, in die Augen, die Stirnhöhlen, auf den Scheitel des Kopfes ausstrahlende Schmerzen, ferner Ueblichkeit, Erbrechen, Ohnmacht, Schwächegefühle sogar zuweilen momentanes Irresein (Ziem). Durch Aussetzen der Operation und belebende Mittel, Riechsalze und Wein werden die Erscheinungen bald verschwinden. Hat man nicht zu viele Polypen auf einmal entfernt, dann können die Patienten nach antiseptischer Occlu-

sion der Nase ihren Geschäften nachgehen oder nach Hause reisen; es ist aber gut, sie aufmerksam zu machen, dass die Nase einige Zeit sehr viel schleimiges, blutiges, selbst eitriges Secret absondern und sich vielleicht wieder ganz verstopfen wird.

Das letztere tritt meist nach Cauterisation grösserer Polypenreste oder der hypertrophischen oder polypös-degenerirten Schleimhaut auf; es bildet sich ein Croupexsudat, das raumbeengend wirkt und sich zuweilen erst nach Wochen abstösst; da durch Organisirung solcher Exsudate Verwachsungen gegenüberliegender Theile eintreten können, so ist es gut, dieselben nach 6—10 Tagen zu entfernen. In selteneren Fällen hat man Sehstörungen, ödematöse Anschwellungen der Augenlider, der Haut, der Wange und der Nase, Gesichtserysipel, Mittelohrkatarrh und Caries der Knochen nachfolgen sehen.

Die Nachbehandlung beginnt sofort mit der Beendigung der Operation. Verfasser reinigt zuerst die Nase mit 2% Carbol- oder 4% Borlösung gründlich von Blut und Schleim und insufflirt dann eine Portion Jodoform oder des angenehmeren Jodols. Etwa noch blutende Stellen werden mit antiseptischer Watte tamponirt. Stets lässt Verfasser die operirte Nase mehrere Tage mit Bruns'scher Watte verschliessen und dieselbe nur entfernen, wenn die Nase (3mal täglich) mit 4% Borlösung oder 1% Carbollösung gereinigt wird. Auf diese Weise kann am wirksamsten den Wundinfectionskrankheiten, von denen das Erysipel unstreitig die häufigste ist, vorgebeugt werden; doch kann Verfasser nicht verschweigen, dass trotz aller Cautelen Erysipel nicht immer verhütet wird; es ist eben absolut unmöglich, die Nase vollständig aseptisch zu machen. Die Reinigung der Nase soll niemals mittelst Aufschnupfen der Flüssigkeit mit den Händen sondern stets mittelst einer reinen neuen Spritze oder Douche vorgenommen werden.

Zu den schwierigsten Operationen gehört unstreitig die Entfernung der Nasenrachenpolypen.

Sie kann von der Nase und von der Mundrachenhöhle aus bewerkstelligt werden. Wählt man den Weg durch die Nase, dann kommen zunächst die kalte und die Glühschlinge in Betracht. Die Schwierigkeit ist, die Schlinge bis an die Basis der Geschwulst zu bringen, was man entweder durch passende Drehung der Schlinge oder dadurch erreicht, dass man mit dem in den Nasenrachenraum eingeführten Zeigefinger die zu den Choanen hinaustretende Schlinge über die Geschwulst schiebt, was aber leichter gesagt als gethan ist. Zaufal construirte, um die Schlinge erst im Rachen entfalten zu können, einen eigenen Schlingenschnürer mit Federkraft. Bei der ausserordentlichen Derbheit und breiten Anhaftung der Nasenrachenpolypen muss der Glühschlinge der Sicherheit wegen der Vorzug eingeräumt werden.

Nicht selten misslingen alle Versuche, die Geschwulst in die Schlinge zu fassen. Man verzichte in solchen Fällen auf weitere Experimente und rücke der Wurzel des Polypen direct auf den Leib, vorausgesetzt, dass dieselbe gesehen oder wenigstens mit der

Sonde gefühlt werden kann; oft gelingt es, durch Einbohren spitziger oder messerförmiger Cauteren die Basis der Geschwulst zu mortificiren und dieselbe zur Schrumpfung und zum Abfall zu bringen; dass dadurch eine eigene Nachbehandlung des Stieles überflüssig wird, ist ein weiterer Vortheil dieser vom Verfasser schon längst vor Moldenhauer geübten und beschriebenen Methode. Lässt auch diese im Stich, dann versuche man die Entfernung vom Rachen aus.

Das Abquetschen mit der schneidenden Choanenzange ist weder ein so gefährlicher noch roher Eingriff, wie das Ausreissen mit der gewöhnlichen Zange; die Schwierigkeit liegt nur darin, die Branchen des Instrumentes möglichst nahe an die Insertionsstelle zu bringen; die Cauterisation derselben mit Lapis oder Galvanokauter muss auch hier vorgenommen werden.

Das Anlegen der kalten und der Glühschlinge vom Rachen aus bietet nicht geringere Schwierigkeit als von der Nase aus. Wenn auch die Controle mit dem Spiegel erwünscht ist, so ist dieselbe doch nicht absolut nöthig, zumal Raumverhältnisse sehr oft zu Concessionen nöthigen. Das progressive Zerstören durch Andrücken eines soliden Galvanokauters oder der Lincoln'schen gedeckten Glühscheibe ist zwar sehr zeitraubend, führt aber doch auch zum Ziele.

Mehr Berücksichtigung als bisher geschehen, verdient bei sehr blutreichen Nasenrachengeschwülsten die Elektrolyse.

Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass diese Methode eine ausserordentlich zeitraubende und langwierige ist, und dass wenige Patienten Geld, Zeit und Geduld haben, in einer fremden Stadt 20—70 Sitzungen innerhalb mehrerer Monate oder noch längerer Zeit (siehe die Mittheilungen von Michel) über sich ergehen zu lassen, so ist anderseits das Verfahren doch ein so schonendes, relativ schmerzloses und erfolgreiches, dass es in geeigneten Fällen als das empfehlenswertheste erscheint.

Sarcome und Carcinome können, wenn auch nicht geheilt, so doch durch möglichst energische und häufige Eingriffe, Abtragen mit der Schlinge, multiple Galvanokauterisation, Auskratzen mit dem scharfen Löffel und darauffolgende Aetzung mit Chromsäure eine zeitlang in ihrem Wachsthum aufgehalten werden. Die Blutung ist bei dem grossen Gefässreichthum dieser Geschwülste zuweilen eine so bedrohliche, dass man von weiteren Eingriffen absehen muss. Bei bösartigen Neubildungen, welche jedoch sehr grosse Strecken der Nase oder den Nasenrachenraum befallen haben, enthalte man sich jeglicher Eingriffe und trage Sorge für Beseitigung des üblen Geruchs durch desinficirende Einspritzungen, für Erhaltung der Kräfte, auch ist Arsen zu versuchen. Enchondrome können zuweilen mit der kalten Schlinge entfernt werden, sicherer ist jedenfalls die heisse. Weichere spongiöse Osteome oder Exostosen, Knochenblasen, können mit der Zange zerbrochen und stückweise entfernt werden, compacte erfordern die Ausmeisselung oder die Anwendung der Stichsäge oder des Drillbohrers.

Die eingreifenderen Operationsmethoden zur Entfernung der Neubildungen in der Nase und dem Nasenrachenraum, als da sind: Spaltung des harten und weichen Gaumens, Resection des Oberkiefers, Spaltung der Nasenlöcher mit Beiseiteklappen der Nasenflügel, sind für maligne Geschwülste zu reserviren oder für solche gutartige, welche wegen ihrer ausserordentlichen Grösse oder hochgradiger Septumdeviation, Spinenbildung, narbiger Verengerung der Nasenlöcher oder aus anderen Gründen nach den oben beschriebenen Methoden nicht operirt werden können.

Nervenkrankheiten.

Entsprechend den beiden Hauptfunctionen der Nase, Vermittelung der Sensibilität und des Geruchs, unterscheiden wir Störungen im Bereiche des N. trigeminus und des N. olfactorius.

Die Störungen im Bereiche des N. trigeminus im engern Sinne gehören zu den selteneren Affectionen.

Anästhesie der Nasenschleimhaut für sich allein ist äusserst selten. In der Regel sind centrale Erkrankungen, Lähmungen des Trigeminusstammes in Folge von Hirntumoren und Hirnsyphilis, schwere Hysterie, die Ursache. Die Unempfindlichkeit der Nasenschleimhaut manifestirt sich durch Mangel an Reflexen bei der Berührung, durch Ausbleiben des Niesens. Dass dabei auch scheinbar der Geruch leidet, hat seinen Grund darin, dass die Perception scharfer stechender Riechstoffe wie Salmiak, Essigsäure etc. keine Geruchs- sondern eine Tastempfindung ist.

Hyperästhesie der Nasenschleimhaut hingegen ist sehr häufig. Sie äussert sich dadurch, dass die geringfügigsten Reize, welche die Schleimhaut der Nase, das Auge, selbst entfernt liegende Organe wie die Haut, Sexualorgane oder den Mastdarm treffen, nicht nur kitzelnde und andere unangenehme Empfindungen erzeugen, sondern auch die heftigsten Erscheinungen, wie Niesanfälle, Kopfschmerz, Husten etc. zur Folge haben. Hieher gehört auch das kitzelnde und juckende Gefühl in der Nase bei Entozoen namentlich Spulwürmern oder Bandwurm. Die Hyperästhesie der Nasenschleimhaut ist, wie im nächsten Capitel dargethan werden soll, die nothwendige Vorbedingung und Grundlage der sogenannten Reflexneurosen.

Parästhesie der Nasenschleimhaut ist im Verhältniss zu jener im Rachen eine relativ seltene Erscheinung. Sie äussert sich entweder als ein Gefühl von Kriebeln, Ameisenlaufen, oder als Gefühl von Hitze oder Kälte spontan oder beim Durchtritt der Luft; auch Gefühle von Schwere oder Ziehen in der Nase mit Ausstrahlen in die Haut der Wange kommen vor. Die Schleimhaut kann völlig normal aber auch verändert sein.

Neuralgie der Nasenäste des Trigeminus beobachtet man häufig während des Verlaufes eines acuten Schnupfens. Der dumpfe

Stirn- oder Hinterhauptskopfschmerz, die bohrenden, pochenden und hämmernden mit dem Pulse isochronen Schmerzen in der Tiefe des Auges und über den Augenbrauen bei acuter und chronischer Rhinitis, Nasenpolypen, adenoiden Wucherungen, welche, wie Ziem richtig bemerkt, wenigstens theilweise auf gestörten Abfluss der Lymphe und des venösen Blutes aus dem Gehirne zurückzuführen sind, tragen oft den typischen Charakter der Neuralgie. Bei Affectionen der Nebenhöhlen namentlich der Stirnhöhle ist Supraorbitalneuralgie eine sehr häufige wenn auch nicht constante Erscheinung; blitzartig durchschiessende, elektrischen Strömen vergleichbare Schmerzen, welche in die Augenhöhle, die Zähne des Ober- und Unterkiefers, die Haut der Wangen, der Nasenwurzel und in die Mundschleimhaut ausstrahlen, beobachtet man bei Ulcerationen, namentlich syphilitischen, welche mit Caries und Nekrose der Knochen einhergehen, ferner bei operativen, besonders galvanokaustischen Eingriffen, Abmeisseln von Septumdeviationen etc. Schmerzen in der Nase sind endlich auch Theilerscheinungen centraler oder peripherer Quintusneuralgien, Neurogliome des Ganglion Gasseri. Einen exquisiten Fall von Neuralgie beider Ethmoidales mit reflectorischen Krämpfen am weichen Gaumen hat Verfasser beschrieben.

Die Behandlung richtet sich bei den bisher besprochenen Leiden nach der Ursache; bei nicht centraler Anästhesie versuche man den galvanischen Strom von der Nase aus; gegen Hyperästhesie und Neuralgie empfiehlt sich die Abhaltung aller Reize, die Behandlung etwaiger kranker Schleimhautstellen, die Extraction von Sequestern; innerlich Nervina, ausserdem Kaltwassereeuren, Elektricität, Durchschneidung des Ethmoidalis von der Orbita aus, palliativ Narcotica.

Die häufigste den N. olfactorius treffende Affection ist die Anosmie, Geruchlosigkeit.

Sie ist entweder eine totale oder partielle, halbseitige oder doppelseitige.

Unter den centralen Ursachen sind zu erwähnen: angeborener Mangel der Olfactorii, Zerreissungen der Olfactorii und ihrer Endausbreitungen in Folge von Schlag auf den Kopf, Schädelfractur, Hirndruck (Quincke), Exsudate in der vordern Schädelgrube, Abscesse und Gehirntumoren, namentlich Gliome, Syphilome des Vorderhirns und der Schädelbasis, Embolie der linken Art. cerebri media, Atrophie der Olfactorii und ihrer centralen Ursprünge im höheren Alter. Langanhaltende Trigeminuslähmung führt in Folge mangelhafter Ernährung der Nasenschleimhaut zu Abschwächung des Geruches; Facialislähmung hat gleichfalls Geruchsstörungen zur Folge durch Behinderung des Schnüffelns in Folge der Lähmung der Verengerer und Erweiterer der Nasenlöcher und dadurch, dass bei Lähmung des Orbic. palpeb. die Conjunctivalflüssigkeit über die Wange abläuft und die Nasenschleimhaut vertrocknet. Centralen Ursprungs ist offenbar die bei Hysterischen vorkommende Hemianosmie.

Unter den peripheren Ursachen ist behinderte Einwirkung der Riechstoffe die häufigste; die riechenden Substanzen gelangen entweder überhaupt nicht in die Regio olfactoria, wie bei hochgradigen Verbiegungen und Auswüchsen des Septum, Occlusion der Nase, Neubildungen, Fremdkörpern, oder sie können in Folge der Schwellung oder Hypertrophie oder polypösen Degeneration der Schleimhaut nicht auf die Endausbreitungen des Olfactorius einwirken. Die nach Abschwellung der Schleimhaut so häufig zurückbleibenden Geruchstörungen verdanken einer Neuritis oder Perineuritis der peripheren Olfactoriusfasern ihre Entstehung. Weitere Ursachen der Anosmie sind Zerstörung oder Compression der Nerven durch Caries und Tumoren des Siebbeins, abnorme Durchfeuchtung sowie zu grosse Trockenheit der Schneider'schen Membran, Mangel von Pigment in den Schultze'schen Riechzellen, allzu energischer Gebrauch der Nasendouche namentlich von Alaun- und Zinklösungen oder Carbolsäure, Einathmung von Ammoniakdämpfen und Aether. Dass durch allzulange und intensive Gerüche Geruchsverminderung zu Stande kommt ist wahrscheinlich, doch spricht andererseits das Fehlen derselben bei Abdeckern, Anatomen, Chemikern, Leichendienern, Latrinenreinigern etc. dagegen. Intermittirende Anosmie wurde von Raynaud beobachtet bei einer Dame, welche täglich Nachmittags 4 Uhr für 18 Stunden den Geruch verlor.

Die Prognose der Anosmie ist zweifelhaft. Am günstigsten ist sie bei Hysterie oder bei acuten und chronischen Katarrhen, Nasenpolypen, Fremdkörpern etc.; Morell Mackenzie sah jedoch niemals den Geruch wiederkehren, wenn diese Affectionen länger als 2 Jahre gedauert hatten; ganz ungünstig ist die Prognose bei Hirntumoren, Tumoren und Caries des Siebbeins, Schädelfractur, etwas besser bei Syphilis.

Die Diagnose stützt sich auf die Prüfung des Geruchssinnes, indem man zuerst das eine, dann das andere Nasenloch verschliesst und die riechenden Substanzen, Pfeffermünzöl, Zimmttropfen, Baldrian, Terpentinöl oder Carbolsäure, Kreosot, kölnisches Wasser, vor die zu untersuchende Nase hält.

Die Behandlung muss sich nach der Ursache richten; Anosmien durch Kopfverletzungen, Blutergüsse, Exsudate, Embolien, bilden sich öfters mit der Zeit von selbst zurück. Katarrhe, Neubildungen müssen nach den angegebenen Methoden beseitigt werden. Bei den rein functionellen Anosmien ist ein Versuch mit dem constanten Strom angezeigt; leider ist nach Althaus zur Erregung der Olfactoriusfasern ein sehr starker Strom erforderlich, so dass heftige Schmerzen, Schwellungen der Schleimhaut, unausbleiblich sind. Subcutane Injectionen von Strychnin, Bepinselungen der Nasenschleimhaut mit Strychnini 1·0 : 100·0 Ol. olivar, sowie Insufflationen von Strychnin 0·003—0·005 : 0·2 Amylum zweimal täglich sind zuweilen von Nutzen. Bei intermittirender Anosmie empfehlen sich Chinin, Natr. salicyl., Tinct. Eucalypti glob., Arsen, Eisen.

Die Steigerung des Geruchssinnes, Hyperosmie, oder Hyperaesthesia olfactoria ist zuweilen wie die Verschärfung des Geschmackes eine physiologische Erscheinung. Wilde, uncivilisirte Völker scheinen durchwegs einen ausserordentlich feinen Geruchssinn zu besitzen. Ob dies auf der dunkleren Hautfarbe dieser Völker resp. der stärkeren Pigmentirung der Riechschleimhaut beruht, ist zur Zeit noch unerwiesen, aber sehr wahrscheinlich.

Berühmt ist auch der Knabe James Mitchell, der mit Verlust aller anderen Sinne geboren, den Geruchssinn so ausgebildet hatte, dass er durch denselben wie ein Hund Personen und Sachen unterscheiden konnte. Als pathologische Erscheinung kommt Hyperosmie häufig bei Neurasthenischen, Hysterischen, Dyspeptischen, Anämischen und namentlich bei Schwangeren vor; sie riechen nicht nur die geringsten Quantitäten duftender Stoffe, die unter normalen Verhältnissen nicht percipirt werden können, ja sogar Dinge, die gewöhnlich für geruchlos gelten, z. B. Kirschen, sondern werden auch durch gewisse Gerüche von Kopfschmerz, Herzklopfen, Ueblichkeit und Brechneigung, Ohnmacht etc. befallen. Welche grosse Rolle die Hyperästhesie des Olfactorius bei der Entstehung des nervösen Schnupfens und des Asthma spielt, wurde bereits erwähnt.

Relativ häufig ist auch die perverse Geruchsempfindung, Parosmie, Parästhesia olfactoria, auch Kakosmia subjectiva genannt.

Die Ursachen sind so ziemlich dieselben wie bei Anosmie, also hauptsächlich acute und chronische Katarrhe, Polypen etc. Tumoren des Vorderhirns und der Schädelbasis, Gehirnsyphilis, apoplektische Insulte, Gehirnhyperämien, Atheromatose der Gehirngefässe, entzündliche Affectionen der Riechnerven, allgemeine Nervosität. Bei manchen Epileptischen geht dem Anfalle als Aura eine perverse Geruchsempfindung voraus; sehr häufig sind ferner Illusionen und Geruchshalluciationen bei Geisteskranken. Hieher gehören auch die Geruchsverirrungen der Hysterischen und Schwangeren, welche mit Vorliebe angebrannte Federn, Valeriana, Asa foetida etc. riechen. Bei der Parosmie werden entweder Gerüche wahrgenommen, die in der That nicht existiren, oder was häufiger ist, existirende Gerüche erscheinen verändert, meist unangenehm, brandig, phosphorartig, schwefelig, faulig, leichenhaft (Allotrioosmie). Nicht selten beobachtete Verfasser Parosmie bei Hypochondern; so glaubte unter Anderen ein junger, geistig sonst gesunder Arbeiter, aus dem Anus einen solchen Kothgeruch zu verbreiten, dass ihn seine Collegen mieden, während ein älterer nervöser Beamter nicht von dem Gedanken loskommen konnte, dass er einen pestilenzialischen Geruch aus seiner Nase verbreite. Periodisch auftretende und einige Stunden anhaltende Parosmie mit Kothgeruch beobachtete Verfasser bei einem 14jährigen sonst völlig gesunden Knaben, dessen Vater eine Zeit lang dieselbe Erscheinung gehabt haben soll.

Bei Erkrankungen des Gehirns, namentlich Tumoren, alterniren nicht selten Parosmie mit Anosmie, was wohl mit Schwankungen des

intracraniellen Blutdruckes zusammenhängen dürfte; auch ein häufiger Wechsel der Geruchsempfindungen ist dabei vorhanden.

Die Prognose der Parosmie ist am günstigsten bei materiellen Veränderungen in der Nase, zweifelhaft bei Hypochondern, Hysterischen, Schwangeren; ganz ungünstig bei Gehirntumoren und anderen intercraniellen Erkrankungen.

Die Behandlung hat zuerst die Aetiologie zu berücksichtigen. Insufflationen von Arg. nitr., Bepinselungen mit Jodlösung, Galvanokaustik bei acuten und chronischen Katarrhen, Operation von Neubildungen, Beseitigung der Septumdeviationen, Behandlung der Anämie, Epilepsie und Hysterie werden am ehesten zum Ziele führen. Bei Hypochondern versuche man ausser Regelung der Verdauung, des Stuhlgangs, durch Bewegung, Landaufenthalt und Bitterwässer, aromatische Einspritzungen oder Insufflationen von Myrrha, Benzoe etc., Ueberstreichen der Regio olfactoria mit dem Galvanokauter; doch wird man glänzende Erfolge damit kaum erzielen.

Reflexneurosen.

Schon lange wusste man, dass von verschiedenen Organen, so namentlich den weiblichen Genitalien aus, in anderen nähergelegenen oder entfernteren Körpertheilen durch Vermittlung des Gehirns und Rückenmarks Erscheinungen hervorgerufen werden können, welche man als reflectorische bezeichnet. Der neuesten Zeit blieb die Erkenntniss vorbehalten, dass unter den Organen, von welchen Reflexe ausgelöst werden, die Nase und der Nasenrachenraum eine äusserst wichtige Rolle spielt. Nachdem schon Voltolini, B. Fränkel, Hänisch und Andere auf den Zusammenhang zwischen Nasenpolypen und Asthma hingewiesen hatten, war es besonders Hack, welcher die Abhängigkeit zahlreicher anderer Erscheinungen von Nasenkrankheiten behauptete. Wenn auch einzelne von Hack's Ansichten sich bei näherer Prüfung als unrichtig erwiesen, so wurde doch die Mehrzahl derselben allseitig als richtig anerkannt.

Die nothwendigste Bedingung zur Auslösung von nasalen Reflexen ist die gesteigerte Erregbarkeit des Nervensystems. Diese Erregbarkeit kann eine allgemeine sein, d. h. das betreffende Individuum besitzt eine universelle neuropathische Disposition, es ist neurasthenisch oder hysterisch, oder die erhöhte Erregbarkeit beschränkt sich auf die Nerven der Nase und ihrer Adnexa, es besteht eine locale Hyperästhesie, eine nasale Neurasthenie. Beide Arten können angeboren sein oder erworben, durch acute Exantheme, Keuchhusten, mangelhafte und unzweckmässige Ernährung, falsche Erziehung, Excesse in Baccho et Venere, geistige Ueberanstrengung, psychische Momente, Krankheiten der Nase oder anderer Organe.

Zur Entstehung der Reflexe ist in zweiter Linie ein Reiz nothwendig, welcher die Nerven der Nase und ihrer Adnexa in Erregung

versetzt und dann auf andere Nervenbahnen überspringt. Die Reize, welche die hyperästetischen Nerven der Nase und ihrer Adnexa in Erregung versetzen, gelangen entweder von aussen in die Nase und den Nasenrachenraum, oder sie werden in diesen Organen selbst erzeugt (periphere Reize).

Die von aussen in die Nase gelangenden Reize sind äusserst zahlreich. Es besteht in diesem Punkte eine ganz ausserordentliche Variabilität, eine individuelle Disposition und Idiosyncrasie. Während bei den Einen die die Reflexe erzeugenden Reize das Gebiet der Gefühlssphäre speciell des Trigeminus betreffen, gehören sie bei den Anderen in die Kategorie der Geruchsempfindungen resp. des Olfactorius, bei wieder Anderen in beide zugleich. Die specielle Aufzählung dieser Reize wird, um Wiederholungen zu vermeiden, bei den einzelnen Formen der Reflexneurosen ihren Platz finden.

Die in der Nase selbst erzeugten Reize verdanken entweder vorübergehenden oder bleibenden pathologischen Veränderungen ihre Entstehung. Unter den vorübergehenden spielen active und passive Hyperämien, so namentlich abnorm starke Füllung des Schwellgewebes, die Hauptrolle. Unter den bleibenden Veränderungen sind zu nennen: Hypertrophien der Schleimhaut, einfache oder polypoide Wucherungen der Muscheln, Verbiegungen und Auswüchse der Scheidewand, Verwachsungen des Septums mit der Muschel, Neubildungen, besonders Schleimpolypen, chronische Nasenrachenkatarrhe, Erkrankungen der Bursa pharyngea, adenoide Wucherungen, Tonsillarhypertrophie.

Die Erregung der Nerven bei Anwesenheit der genannten vorübergehenden oder bleibenden Veränderungen geschieht auf mechanischem Wege, und zwar dadurch, dass Theile miteinander in Berührung treten, welche normalerweise unter sich keinen Contact haben. So tritt z. B. durch eine plötzliche starke Füllung des cavernösen Gewebes die untere Muschel mit dem Septum in Berührung und erregt die in den berührten Theilen verlaufenden Nervenfasern; noch leichter geschieht dies bei Verbiegungen oder Auswüchsen des Septum oder in sehr engen Nasen. Mechanisch erregend wirken ferner Schleimpolypen oder polypöse Hypertrophien der mittleren Muscheln, wenn sie mit der Scheidewand oder mit der äusseren Nasenwand oder der unteren Muschel in Contact gerathen. Dasselbe thun des weiteren pendelnde Polypen, wenn sie ihre Lage wechseln oder wenn sie durch vermehrten Blutzufluss oder feuchte Witterung an Volumen zunehmen.

Ausser der zeitweisen Berührung benachbarter Schleimhautpartien kommt ferner in Betracht der directe Zug oder Druck, welchen die hypertrophirte Schleimhaut oder Neubildungen auf die in den veränderten Theilen verlaufenden Nerven ausüben, die Störung der Nasenathmung und die Behinderung der Circulation des Blutes und der Lymphe in der Nase und dem Gehirn.

Die nasalen Reflexe werden jedoch nicht nur durch periphere Reize hervorgerufen, sondern auch durch centrale, d. h. durch solche, welche vom Gehirn oder Rückenmark ausgehen, die Nerven der Nase treffen, und von diesen auf andere Nervenbahnen überspringen. Aus

diesem Grunde kann die Schleimhaut der Nase vollkommen intact befunden werden.

Ueber den Ort, von welchem aus die Reflexe erregt werden, ist viel gestritten worden.

Von Hack wurde das Schwellgewebe namentlich das der unteren Muscheln als der alleinige Ort der Auslösung betrachtet; die Auslösung käme leichter zu Stande bei unbedeutenden und streng localisirten Processen als bei diffuser hyperplastischer Rhinitis, welche letztere geradezu die Schwellung des cavernösen Gewebes verhindere; gelänge es, die Schwellkörper auszuschalten, dann würden auch die durch sie bedingten Erscheinungen aufhören. Andere, wie Baratoux und Hering, verlegen die Reflexzone in die Nasenscheidewand, namentlich den hinteren Theil derselben, weil es ihnen gelang, durch Berührung dieser Stelle Husten, Niesen und Dyspnoe zu erzeugen. Ganz sichergestellt ist jetzt, dass von jedem Punkte der Nase ohne Vermittlung des cavernösen Gewebes Reflexe ausgelöst werden können. Dass aber das Schwellgewebe doch bei der Entstehung gewisser Reflexe so namentlich des Asthma eine Rolle spielt, wird später erörtert werden.

Bevor wir die einzelnen von der Nase erzeugten Reflexe näher besprechen, muss nochmals nachdrücklichst betont werden, dass die Schleimhaut der Nase normal sein aber auch die verschiedensten Veränderungen aufweisen kann, und dass alle die Nase treffenden Reize ohne gesteigerte allgemeine oder locale Hyperästhesie vollkommen wirkungslos bleiben.

Eine der häufigsten auf vasomotorischem Wege zu Stande gekommene Erscheinung ist die abnorme Füllung und Schwellbarkeit des erectilen Gewebes der untern Muscheln.

Auf geringfügige und mannigfaltige Reize hin, Temperaturschwankungen, Veränderungen der Körperlage, Genuss alkoholischer Getränke, Menstruation, psychische Erregungen, erfolgt anfallweise, zuweilen blitzschnell, eine mehr oder weniger hochgradige, kürzere oder längere Zeit anhaltende oder wechselweise Verstopfung der einen oder andern Nase oder beider zugleich mit den bekannten schon öfters besprochenen Folgeerscheinungen. Nach dem Anfalle oder während der Untersuchung, durch psychische Momente, Angst, Furcht vor Operation, verlieren sich diese Schwellungen meist ebenso schnell, wie sie gekommen waren. Dass die mit diesem Uebel Behafteten bei Tag und Nacht vielfach belästigt, ja wie Verfasser einmal bei einem Geistlichen gesehen, wegen des nasalen Timbres der Stimme in der Ausübung ihres Berufes in höchstem Grade behindert werden, ist leicht einzusehen. Im Allgemeinen ist das Uebel, so lange sich keine andern Erscheinungen daran schliessen, ein leicht zu tragendes; es wird aber zu einem sehr verhängnissvollen, wenn die abnorme Schwellbarkeit des cavernösen Gewebes den Anstoss gibt zu der Auslösung sogenannter secundärer Reflexe, namentlich des Asthma. Dass das cavernöse Gewebe besonders bei einfacher chronischer Rhinitis Neigung zum Intumesciren zeigt, wurde bereits früher erwähnt.

Zu den vasomotorischen Reflexen gehört auch die Röthung der Nasenspitze, die ödematöse Schwellung der Augenlider und wahrscheinlich auch das vicariirende Nasenbluten.

Die sogenannte „rothe Nase" besteht theils in einer plötzlich auftretenden und plötzlich verschwindenden theils bleibenden erythematösen Röthung der Nasenspitze und Nasenflügel. Selbstverständlich kann nur in dem erstgenannten Falle von einer Neurose die Rede sein, während den bleibenden Röthungen venöse Hyperämien zu Grunde liegen; doch darf man nicht vergessen, dass sehr häufig wiederkehrende flüchtige Gefässerweiterungen mit der Zeit zu dauernder Dilatation und Gewebsstörungen Anlass geben können.

Die von der Röthe ergriffene Partie ist in der Regel scharf abgegrenzt; die Nasenspitze ist bald nur leicht rosig angehaucht, bald kugelig aufgetrieben, glänzend wie erysipelatös und ebenso wie die Nasenflügel von zahlreichen sich vielfach verästelnden Gefässen durchzogen. Bei sehr langer Dauer kommt es zu Verdickung der Cutis, zu schwammigen, warzigen, blaurothen Excrescenzen und zu Pustelbildung, kurz zu dem vollen Bilde der Acne rosacea. Ganz besonders häufig und entstellend ist die flüchtige Röthung bei jungen Mädchen. Unzweifelhaft spielen bei diesen sexuelle Vorgänge die Hauptrolle, da die Röthung am intensivsten und regelmässigsten zur Zeit der Menses auftritt. Ebenso können psychische und erotische Erregungen, Wärme und Kälte, geringe Erhöhung des Blutdruckes, wie sie nach dem Genusse sehr warmer Getränke — Kaffee, Thee, Suppe oder geringer Mengen Alcoholica — auftritt, die Röthung hervorrufen und unterhalten. Wie beim Erscheinen der Menses wird die Affection auch beim Verschwinden derselben im Klimakterium und während der Schwangerschaft beobachtet. Dass die rothe Nase auch bei chronischer Rhinitis resp. die durch dieselbe im Naseninnern erzeugte Stauung beobachtet wird, wurde ebenfalls schon erwähnt.

Während die flüchtige Röthung bei Vermeidung der genannten Schädlichkeiten nach längerem oder kürzerem Bestande sich von selbst verliert oder nur bei besondern Anlässen erscheint, bleibt die mit sichtbaren Gefässerweiterungen verbundene Form stabil. Bei Männern gilt mit Recht der Missbrauch des Alkohols, namentlich des Weins und Branntweins als Ursache. Auch bei Leuten, welche sich häufig und lange der Kälte aussetzen, Kutscher, Dienstmänner, Marktweiber etc. kommt die rothe Nase sehr häufig vor; freilich spielt bei diesen ausser der Kälte meistens auch der Alkohol eine Rolle.

Eine sehr merkwürdige vasomotorisch-secretorische Neurose beobachtete Verfasser einmal bei einem jungen Manne, welcher angeblich nach einem Falle auf die Nase bei hoher Zimmer- oder Sommertemperatur an der Nasenspitze derart zu schwitzen begann, dass der Schweiss in grossen Tropfen herabfiel und die geringste Reibung der Nase heftiges Nasenbluten zur Folge hatte. Objectiv ergab sich ausser einer Deviation eine starke Gefässramification des Septum cartilag. Der Kranke wurde melancholisch, verschwand eines

Tages spurlos aus seiner Wohnung und endete wahrscheinlich durch Selbstmord.

Zu den vasomotorisch-secretorischen Neurosen gehört ferner auch der nervöse Schnupfen, Coryza nervosa, Rhinitis vasomotoria, sympathetica. Eine Abart des letzteren ist das Heufieber und der Catarrhus autumnalis.

Die Rhinitis vasomotoria, wegen ihres periodischen Auftretens auch Rhinitis vasomotoria periodica genannt, hält Herzog für eine Affection des Sympathicus, da Reizung des Sympathicus vermehrten Blutzufluss zu dem cavernösen Gewebe und Hyperämie der Nasenschleimhaut zur Folge habe. Aschenbrandt hingegen hält den nervösen Schnupfen für eine Affection des Trigeminus resp. des Ramus sphenopalatinus, und stützt seine Ansicht auf die Thatsache, dass Reizung dieser Nerven Volumzunahme des cavernösen Gewebes der untern Muschel, Gefässerweiterungen am Septum und vermehrte Secretion nach sich ziehe. Bei den vielfachen Anastomosen zwischen Trigeminus und Sympathicus ist es am wahrscheinlichsten, dass sowohl Reizung des ersteren als auch Reizung des letzteren die obencitirten Erscheinungen hervorbringe.

Die Reize, welche den nervösen Schnupfen, unter Umständen sogar Asthma hervorrufen, sind ausserordentlich zahlreich. Solche Reize sind z. B. Gerüche der verschiedensten Art, der Geruch von Blumen, Rosen, Veilchen, Reseden, Camillen, Maiblumen, Pfirsich- und Hollunderblüthen — daher der Name Rosenschnupfen oder Rosenfieber — ferner der Duft gewisser Speisen und aromatischer Substanzen und ätherischer Oele, wie Benzoe, Cumarin, Ol. menth. pip., Perubalsam, Thymol, Moschus etc., ferner die Ausdünstungen mancher Thiere wie der Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Kaninchen und Pferde — daher der Name Stallfieber. Weitere Reize für die hyperästhetische Nase sind: die Einathmung der heissen, verunreinigten, kohlensäureüberladenen Luft der Theater, Ball- und Concertsäle, das Betreten einer lohebedeckten Reitbahn, das Einathmen von Zimmer- und Strassenstaub oder von staubenden Substanzen wie z. B. Mehl, Kalkstaub, Ipecacuanha, Lycopodium, Digitalis, Salicylsäure, Veratrin. Nicht selten ruft sogar der Wechsel des Zimmers oder des Wohnortes, das Uebernachten auf dem Lande, gleichgiltig zu welcher Jahreszeit, das Verweilen in einem Eisenbahncoupée, die heftigsten Schnupfen- und Asthmaanfälle hervor.

Die schon längst als Heufieber, Heuschnupfen, Heuasthma, Frühsommerkatarrh, Niesefieber, Junischnupfen bekannte Affection ist nach John Mackenzie ihrem Wesen nach ebenfalls ein nervöser Schnupfen, der dem Reize der eingeathmeten Blüthenpollen gewisser Pflanzen seine Entstehung verdankt.

Nach Blackley sind es in Europa besonders die Pollen blühender Gräser, des Roggens, des Hafers, der Gerste, zuweilen auch der Blüthenstaub der Rosen, in Amerika ausser den genannten auch jene der Ambrosia artemisiaefolia und des Wermuths, welche durch ihre mechanischen und chemischen Eigenschaften, hauptsächlich durch

ihre zitternde Eigenbewegung, Ausdehnbarkeit und Aufquellungsfähigkeit bei Einwirkung von Feuchtigkeit die Schleimhaut der Nase reizen. Dass der Heuschnupfen in der That durch die erwähnten Pollen bedingt ist, beweist sein Vorkommen zur Zeit der Blüthe jener Pflanzen in Europa von Ende Mai bis Mitte Juli, in Amerika auch noch von August bis September, seine regelmässig jedes Jahr zur bestimmten Zeit erfolgende Wiederkehr, seine der Quantität der in der Atmosphäre suspendirten Pollen entsprechende Zu- und Abnahme, sein häufiges und heftiges Auftreten auf dem Lande. Die Krankheit befällt mit Vorliebe Männer, ganz besonders gerne Engländer und Amerikaner, verschont aber auch nicht Angehörige anderer Nationen; am stärksten ergriffen werden die gebildeten Kreise, die Städtebewohner, während die Landbewohner und die der Einathmung der Pollen am meisten ausgesetzten Arbeiter auffallend selten erkranken.

Eine dem typischen Frühsommerkatarrh völlig gleiche im Herbst auftretende und gleichfalls in das Capitel der Rhinitis vasomotoria gehörige Affection bezeichnet man als Catarrhus autumnalis.

Die Ansicht von Wyman, derselbe sei eine nur den Amerikanern eigenthümliche zur Zeit der Blüthe der Ambrosia artemisiaefolia vorkommende Krankheit ist wohl unhaltbar, da die Affection nach Hack auch in Deutschland vorkommt, wo die genannte Pflanze keine Rolle spielt.

Der nervöse Schnupfen sowohl wie das eigentliche Heufieber beginnt in der Regel plötzlich und unerwartet oder nach kurzen Prodromalerscheinungen mit einem heftigen, juckenden, kitzelnden Gefühle in der Nase, dem Nasenrachenraum und den Augenwinkeln, welchem intensive Niesanfälle mit profuser, dünner, wässeriger oder dicker albuminöser Secretion, Thränenträufeln und Lichtscheu nachfolgen; der Geruch kann während der Anfälle erhalten bleiben oder herabgesetzt ja ganz aufgehoben werden, ebenso kann die Athmung durch die Nase frei bleiben aber auch ganz unmöglich werden; die Reizung der Conjunctiva steigert sich zuweilen zu förmlicher Chemosis, nicht selten tritt Flimmerscotom auf. Zuweilen ist auch Fieber und quälender Hustenreiz vorhanden. Die Anfälle, die beim gewöhnlichen nervösen Schnupfen sehr oft am Morgen oder Abend auftreten, dauern manchmal nur einige Minuten aber auch Stunden oder Tage, ja wie bei dem eigentlichen Heufieber Wochen, um erst mit der Beendigung der Grasblüthe aufzuhören und im nächsten Jahre wiederzukehren. Man bezeichnet diese Form des Heufiebers als katarrhalische. In schweren Fällen gesellt sich zu den geschilderten Erscheinungen Asthma, das ganz den Charakter des bronchialen trägt, ebenfalls Stunden, Tage und Wochen anhalten kann und sowohl bei Tag als bei Nacht zum Ausbruch kommt (katarrhalisch-asthmatische Form).

Eine der häufigsten und qualvollsten nasalen Reflexneurosen ist das Asthma.

Die Anfälle stellen sich in der Regel Nachts während des Schlafes oder zur Zeit der Menses oder nach psychischen Erregungen ein, um mehrere Stunden, Tage oder Wochen zu dauern und sich theils plötzlich

theils allmählich zu verlieren; manche Kranke werden jede Nacht, Andere nur jede Woche oder einmal im Monat oder noch seltener von Anfällen heimgesucht und sind in der Zwischenzeit meist ganz frei, während bei Anderen auch bei Tage bronchitische Erscheinungen und eine geringe Dyspnoe fortbestehen. Vor oder während des Anfalles stellt sich öfters profuser Nasenfluss mit heftigem Niesreiz und Thränenträufeln, allgemeine Abgespanntheit oder Aufgeregtheit ein; zuweilen folgt dem Anfall eine Eruption von Urticaria, Herpes oder anderen Efflorescenzen der Haut nach. Ebenso verschieden wie die Häufigkeit ist die Heftigkeit der Anfälle. Während bei den Einen der volle Symptomencomplex des Asthma sich entwickelt — hochgradigste in- und exspiratorische Dyspnoe, acute Lungenblähung, sibilirende Geräusche, Unregelmässigkeit der Herzthätigkeit, zähe oft blutige Expectoration, zeigen Andere nur geringe Dyspnoe, geringe oder gar keine Lungenblähung, keine oder nur unbedeutende sibilirende Geräusche. Wieder andere Kranke werden plötzlich von Bronchitis mit schnurrenden, pfeifenden, giemenden Rasselgeräuschen befallen. Dass diese Affection, das bronchitische Asthma, in der That zum Asthma gehört, beweist sein Vorkommen und Alterniren mit schweren Asthmaattaken und sein Verschwinden nach Heilung der letzteren.

Für die Entstehung des nasalen Asthma müssen ausser den bei der Aetiologie des nervösen Schnupfens angegebenen von aussen in die Nase gelangenden Reizen ganz besonders die innerhalb der Nase producirten Reize, speciell der Contact gegenüberliegender Schleimhautpartien verantwortlich gemacht werden. Dem entsprechend beobachtet man auch am häufigsten Asthma bei polypoiden Hypertrophien und Schleimpolypen der mittleren Muscheln. Ausserdem gibt es nach des Verfassers Ansicht Fälle, bei denen das Asthma erst in secundärer Weise durch Vermittlung des Schwellgewebes zu Stande kommt. Erst dann, wenn dieses in horizontaler oder Seitenlage oder durch andere Einflüsse im Schlafe anschwillt, wird der Contact der unteren Muschel mit der Scheidewand hergestellt und das Asthma ausgelöst. Es ist aber der Contact des Schwellgewebes mit der Scheidewand nicht einmal nöthig; die durch Schwellung des erectilen Gewebes erzeugte Veränderung des Mechanismus und Chemismus der Athmung genügt bei Neuropathischen allein, um Asthma auszulösen. Substituirt der Schlafende instinctmässig bei plötzlicher Verschliessung der Nase sofort die Mundathmung, so wird er gezwungen, alle Nachtheile der Mundathmung, Einathmuug einer kälteren, verunreinigten, wasserärmeren Luft plötzlich über sich ergehen zu lassen; athmet er bei langsam sich entwickelnder Nasenschwellung unbewusst durch die verengte Nase weiter, so tritt Kohlensäureüberladung des Blutes ein. Wenn ungenügende Nasenathmung resp. ungenügende Zufuhr von Sauerstoff erfahrungsgemäss bei vielen Gesunden schreckhafte Träume, Alpdruck und Jactation erzeugt, so ist nicht zu verwundern, wenn dieselbe bei Neuropathischen zu Asthma und Epilepsie Anlass gibt. Auch Erlenmayer hat in seiner neuesten Schrift die nächtlichen Anfälle mancher Epileptiker mit Anomalien der nasalen Respiration

in Verbindung gebracht; überdies sind auch bereits mehrere Heilungen von Epilepsie nach Behandlung der Nase constatirt.

Das nasale Asthma unterscheidet sich in Nichts von dem von andern Organen ausgelösten Asthma: Von den Nerven der Nase springt der Reiz auf den Vagus über und erzeugt hier Bronchialkrampf; der letztere genügt allein zur Erklärung des Asthma und seiner Erscheinungen. Die während und nach dem Anfalle auftretenden bronchitischen Erscheinungen sind secundär und theils Folge des Druckes der sich contrahirenden Bronchialmuskeln auf die zwischen Längs- und Ringmuskulatur eingelagerten Drüsen, theils Folge der durch den Bronchialkrampf erzeugten Circulationsstörung. Die acute Blähung der Lunge ist hauptsächlich die Folge der erschwerten Exspiration, deren Kräfte schwächer sind als jene der Inspiration.

Die sogenannten Asthmakrystalle sind Zerfallsproducte von Eiweisskörpern, die Curschmann'schen Spiralen in die Form kleinster Bronchiolen gepresstes und durch den mühsam ein- und austretenden Luftstrom spiralig gewundenes Mucin und nicht die Ursachen sondern nur die Producte des Asthma.

Ausser den bisher besprochenen Erscheinungen können auch andere in theils näher theils entfernter gelegenen Organen sich abspielende Symptome durch Affectionen der Nase hervorgerufen werden.

Sehr selten ist der einmal vom Verfasser und von E. Fränkel beobachtete Speichelfluss. Häufiger sind Neuralgien eines oder mehrerer Aeste des Trigeminus, besonders des Supraorbitalis, ferner die verschiedenen Arten des Kopfschmerzes, die Migräne, der Hinterhaupt-, Stirn-, Scheitelkopfschmerz. Nach des Verfassers Erfahrung kommen diese fast ausschliesslich im Gefolge diffuser Verdickungen der unteren und mittleren Muschel vor. Auch Schwindel, epileptische Anfälle und Zwangsvorstellungen (Schech) können von der Nase und ihren Adnexen aus erregt werden.

Nicht selten ist der nasale Husten.

Derselbe beginnt bald früh Morgens, bald während des Tages, bald in der Nacht plötzlich unter lebhaftem Kitzelreiz, dauert bald nur einige Minuten bald mehrere Stunden, und charakterisirt sich durch den Mangel jeglichen Auswurfs und völlige Intactheit des Kehlkopfes, der Bronchien und der Lunge. Der hochgradigste Fall, den Verfasser gesehen, betraf einen herkulisch gebauten jungen Mann mit symptomlos verlaufenden Nasenpolypen, nach deren Entfernung die täglich Morgens zwischen 8—11 Uhr auftretenden enormen Hustenanfälle völlig verschwanden.

Dass der von der Nase ausgelöste Husten — der Trigeminushusten von Wille und Schadewaldt — der constante Begleiter des Asthma sei und sich stets durch Berührung, Sondirung oder Elektrisiren der Nasenschleimhaut willkürlich erzeugen lasse, kann Verfasser nicht bestätigen.

Das plötzliche Auftreten von bronchitischen Erscheinungen theils in Folge von Fluxion, theils von geringem Bronchialkrampf wurde bereits bei der Besprechung des Asthma erwähnt.

Zuweilen springt der Reiz von der Nase auf den Plexus cervicobrachialis über und erzeugt neuralgische Schmerzen in den Oberarmen, Stechen auf der Brust und zwischen den Schulterblättern.

Noch eine grosse Anzahl anderer Erscheinungen hat man mit Nasenerkrankungen in Connex gebracht; so Blepharospasmus, Gesichtskrampf, Keuchhusten, Morbus Basedowii (Hack), nervöses Herzklopfen, Stenocardie, Dyspepsie, Erbrechen, Enuresis nocturna, Erblassen der äusseren Haut mit Frieren und Schüttelfrösten; die wissenschaftliche Begründung eines Theiles derselben geht allerdings nicht über blosse Vermuthungen hinaus.

In praktischer Hinsicht ist es unbedingt geboten, beim Auftreten gewisser Reflexerscheinungen namentlich des Asthma, der anfallweise auftretenden Bronchitis, Migräne, Trigeminusneuralgien etc., die Nase auf das Sorgfältigste zu untersuchen oder an competenter Stelle untersuchen zu lassen, selbst dann, wenn keine Beschwerden von Seite der Nase geklagt werden oder die betreffenden Erscheinungen sich aus anderweitigen Organerkrankungen erklären liessen; es sei hier nur erinnert an einen von E. Fränkel mitgetheilten Fall von Asthma bei einer Dame, welche mit einem linksseitigen Klappenfehler behaftet war und durch Behandlung eines Anfangs als nebensächlich betrachteten Nasenleidens radical von ihrem Asthma befreit wurde.

Ebenso muss aber auch vor übereilten Diagnosen und Speculationen dringend gewarnt werden. Die Lehre von den Reflexneurosen ist gegenwärtig leider in ein Stadium getreten, welches die Skepsis nicht nur berechtigt erscheinen lässt, sondern geradezu herausfordert. Es wäre sehr zu wünschen, dass des allzufrüh der Wissenschaft entrissenen Böcker's Mahnruf mehr beherzigt würde und dass der bisherige übertriebene Enthusiasmus einer ruhigeren und objectiveren Anschauung Platz machte!

Die Diagnose stützt sich einestheils auf die subjectiven Beschwerden, anderntheils auf den objectiven Befund, namentlich auf die leichte Schwellbarkeit des cavernösen Gewebes, die Hyperästhesie der Schleimhaut bei Sondenberührung, chronische hyperplastische Rhinitis, polypoide Excrescenzen und Schleimpolypen, Deviationen und Auswüchse des Septum, Verwachsungen, chronischen Katarrh des Rachens, adenoide Wucherungen, Hyperplasien der Gaumenmandeln, Erkrankungen der Bursa pharyngea, Nasenrachenpolypen. Bei nervösem Schnupfen entscheidet das plötzliche und regelmässige nach Einwirkung der früher genannten Schädlichkeiten oder wie beim Heufieber das zur Zeit der Grasblüthe erfolgende Auftreten der Erscheinungen sowie die etwaige Anwesenheit materieller Veränderungen der Nase und anderweitiger nervöser Symptome. Sehr schwer wird der Nachweis des nasalen Ursprungs bei den in entfernteren Organen sich abspielenden Symptomen, wenn keine oder nur geringfügige materielle Erkrankungen der Nase sich vorfinden und auch andere Organe, welche die geklagten Erscheinungen hervorrufen könnten, normal befunden werden.

Der sicherste Beweis, dass die jeweilig geklagten nervösen Erscheinungen von der Nase ausgehen, wäre ihre experimentelle Erzeugung durch Sondenreiz. Die Erzeugung von Asthma, Neuralgie etc. oder des von Schadewaldt-Wille als sicheren Beweises für den nasalen Ursprung behaupteten Trigeminushustens gelingt recht selten, wie Verfasser in Uebereinstimmung mit Heymann constatiren muss. Aehnlich verhält es sich mit dem „Aufsuchen der Reflexzone" mittelst Cocain oder Menthol. Während die Verhütung resp. Coupirung der Reflexe durch locale Application dieser Mittel ein sicherer Beweis für den nasalen Ursprung oder doch wenigstens für die Mitbetheiligung der Nase ist, ist der negative Erfolg kein Beweis für das Gegentheil, da die Reflexzone nicht getroffen worden sein kann, oder wenn sie wirklich getroffen wurde, die angewandten Mittel zur Erzeugung von Areflexie zu schwach gewesen sein können. Auch die dem Ausbruche des Asthma oder anderer Reflexe vorausgehenden oder dieselben begleitenden nasalen Symptome sind nicht absolut beweisend; denn einerseits treten nasale Erscheinungen auch bei solchen Kranken auf, deren Asthma nicht von der Nase ausgeht, andererseits fehlen sie nicht selten bei Solchen, deren Asthma unzweifelhaft nasalen Ursprungs ist.

Verfasser muss, wie die Sache zur Zeit steht, behaupten, dass wir immer noch kein absolut sicheres Kriterium besitzen, um zu entscheiden, ob die Nase für die geklagten Erscheinungen verantwortlich zu machen ist oder nicht. Diese Unsicherheit in der Diagnose führt nothwendigerweise auch in der Praxis zu mannigfaltigen Zweifeln und Bedenken. Soll ich die Nase dieses oder jenes Kranken behandeln oder nicht? ist die Frage, welche sich der gewissenhafte Arzt immer wieder vorlegt. Da, wo materielle Veränderungen vorhanden sind, gleichgiltig, ob der Kranke Beschwerden davon hat oder nicht, ist die locale Behandlung nicht nur angezeigt, sondern geradezu geboten. Ganz besonders gilt dies für die Asthmatiker, welche meist keine Ahnung haben, dass sie nasenkrank seien und dass davon ihr Leiden herrühren könne. Wie oft dies der Fall ist, beweist eine vom Verfasser auf Grund eigener Beobachtungen hergestellte Statistik, nach welcher sich nahezu 64% aller Asthmatiker als nasenkrank erwiesen. Eine locale Behandlung ist ferner auch angezeigt in jenen Fällen, bei denen sich keine materiellen Veränderungen der Nase vorfinden und trotzdem sich die Erscheinungen durch Cocain beeinflussen lassen.

Der Nutzen der localen Behandlung besteht in erster Linie in der Aufhebung des anormalen Contactes und Reizes gegenüberliegender Schleimhautpartien, in der Beseitigung des directen Druckes und Zuges auf die Nervenfasern der erkrankt gewesenen Partien, in der Wiederherstellung der nasalen Respiration und normaler Circulationsverhältnisse des Blutes und der Lymphe in der Nase und dem Gehirne.

Dass die locale Behandlung namentlich bei intacter Nasenschleimhaut auch als Gegenreiz, als Derivans wirkt, wie Mc. Bride annimmt durch moleculäre Veränderung in einem gewissen Gebiet des Gehirns, oder wie Verfasser glaubt, durch Beseitigung der Circu-

lationsstörung, soll nicht geleugnet werden, ebensowenig wie die Thatsache, dass manche Asthmatiker sich erleichtert fühlen, wenn spontan oder künstlich Niesen sich einstellt. Deswegen aber das Asthma für eine pathologische Umwandlung des Niesactes zu erklären, die verschwinde, wenn es gelänge, den Trigeminus wieder zu seinen normalen Reflexen zu veranlassen, wie dies Wille und Schadewaldt gethan haben, erscheint mehr als gewagt. Dass, wie dieselben Autoren behaupten, es völlig gleichgiltig sei, ob die Nase materielle Veränderungen aufweise oder nicht, ist absolut unrichtig. Wäre diese Ansicht richtig, so müsste bei Anwesenheit von Hypertrophien oder Schleimpolypen die einfache Sondenberührung oder das Elektrisiren oder Kauterisiren der Polypen oder irgend eines andern beliebigen Punktes der Nase behufs „Entladung der elektrisch gespannten Nerven" schon genügen, das Asthma zu beseitigen; dass aber nur die gründliche Ausrottung der Polypen das Ausbleiben des Asthma zur Folge hat, das Wiederwachsen derselben von Neuem aber hervorruft, weiss Jeder, der mit Asthmatikern viel zu thun gehabt.

Die Prognose der Reflexneurosen ist stets zweifelhaft zu stellen. Wenn auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl derselben eine günstige Prognose zulässt, so muss doch nachdrücklichst betont werden, dass Schein- und Misserfolge sowie Recidiven durchaus nicht so selten sind, wie der Nichteingeweihte vielleicht aus den glänzenden Berichten so vieler Publicisten schliessen könnte. Verfasser muss dringend rathen, den meist schon vielfach behandelten und mit übertriebenen Hoffnungen erfüllten Kranken kurz und bündig zu erklären, dass man zwar eine Behandlung der erkrankten Nase für angezeigt halte, aber durchaus nicht für den Erfolg garantiren könne.

Ganz besonders gilt dies für das Asthma, das auch ohne Behandlung oft lange Pausen macht. Die besten Erfolge, definitive Heilung, erzielt man in frischen Fällen; geringe Erfolge da, wo die Anfälle schon jahrelang bestanden und sich schon Emphysem und Herzdilatation entwickelt haben; ab und zu ist jedoch auch bei veralteten Fällen noch Besserung zu erzielen. Sehr gering oder völlig negativ sind ferner die Resultate der rein localen Behandlung in jenen Fällen, in welchen die Reflexe so namentlich Kopfschmerz, die verschiedenen Neuralgien und ganz besonders das Asthma, auch noch von andern Organen (Uterus, Magendarmcanal) ausgelöst oder wenigstens von dort aus unterhalten werden, oder wenn die Anfälle auf die geringfügigste Veranlassung hin auftreten, wie z. B. beim Wechsel des Wohnorts, minimalen Temperaturdifferenzen, Eintritt der Menses, Gemüthsbewegungen. Asthmatiker werden häufig nur insoferne gebessert, als ihre Anfälle seltener und weniger heftig auftreten oder einen andern Charakter annehmen.

Die Prognose des nervösen Schnupfens und des Heufiebers ist insoferne ungünstig, als die zu diesen Affectionen Disponirten meist von Neuem erkranken; günstig insoferne, als durch zweckmässige Behandlung der kranken Nase und des hyperästhetischen Nervensystems das Uebel definitiv geheilt werden kann. Eine günstige Pro-

gnose gestattet die abnorme Schwellbarkeit des cavernösen Gewebes, eine minder gute die rothe Nase.

Die Heilung kommt selten plötzlich zu Stande; in der Regel bedarf es wiederholter Eingriffe und längerer sorgfältigster namentlich auch allgemeiner Behandlung.

Die Behandlung der Reflexneurosen muss eine locale und allgemeine sein. Die locale Behandlung hat da, wo materielle Veränderungen vorhanden sind, nach den in den betreffenden Capiteln niedergelegten Principien zu geschehen.

Bei periodischer Schwellung des cavernösen Gewebes empfiehlt sich das Ziehen von Längsfurchen, das Einstechen und Vorschieben eines galvanokaustischen Spitzbrenners bis auf die Knochen an verschiedenen Stellen der Muscheln, eventuell parenchymatöse Einspritzungen von Jod, Ergotin oder Sclerotinsäure.

Die Behandlung der rothen Nase ist im Allgemeinen eine undankbare. Die gewöhnlich verordneten medicamentösen Umschläge, Bepinselungen, Waschwasser und Salben nützen nur dem Apotheker. Ein Versuch mit Ergotin innerlich ist jedoch gerechtfertigt; Unna empfiehlt die äussere und innere Anwendung des Ichthyols und des sulfoichthyolsauren Ammonium. (Ichthyoli 1·0—3·0, Lanolini 10·0 als Salbe; Ammon. sulfoichthyol. 5·0—10·0, Aqua destill. 20·0. D. S. 2mal täglich 15—20 Tropfen allmählich steigend innerlich.) Besondere Erfolge hat Verfasser davon auch nicht gesehen. Am meisten zu empfehlen ist die methodische Stichelung und das Aufschlitzen der erweiterten Gefässe.

Die Behandlung des nervösen Schnupfens und des Heufiebers sowie des Catarrhus autumnalis muss bei Anwesenheit pathologischer Veränderungen eine locale sein, ausserdem auch noch eine medicamentöse. Fernbleiben von den veranlassenden Schädlichkeiten ist nöthig bei nervösem Schnupfen; bei Heufieber empfehlen sich Seereisen, Aufenthalt an der See, auf sterilen Inseln oder in einer Stadt oder in heufieberfreien Gegenden (Heufieberasyle in Amerika), Hüten des Zimmers zur Zeit der Grasblüthe, Verstopfen der Nasenlöcher mit Watte, Tragen eines engmaschigen Schleiers oder Respirators oder einer Brille mit breiten die Augenhöhlen genau umschliessenden Rändern. Die nervöse Disposition ist durch methodische Abhärtung, Seebäder, Kaltwasserkuren, Aufenthalt im Hochgebirge, Fusstouren, Turnen, innerlich durch Arsenik, Eisen, Bromkali (sehr zweckmässig als Bromwasser), Chinin etc. zu beseitigen. Zur Abkürzung der Anfälle empfehlen sich Einathmungen von Amylnitrit 2—5 Tropfen, Campher-, Chloroform mit Perubalsam-, Carbolsäure-, Salmiakdämpfen, Einträufelung von 5—10% Cocainlösung oder Insufflation von Cocain oder Morphiumpulver in die Nase.

Gegen nervösen Husten empfehlen sich Bromkali, Chloral, Opium, Morphium; Beschorner rühmt Trochisci aus 0·01 Cocain und 0·005 Morphium.

Als Palliativa während der Asthmaanfälle sind zu verordnen: Hautreize, Senfteige, heisse Umschläge auf Brust und Hals,

heisse Fuss- und Handbäder; Atropin 0·001—0·002, Cocain 0·04, Morphium 0·02—0·03 pro dosi subcutan; Einathmungen von 2 bis 5 Tropfen Amylnitrit, Pyridin, Chloroform, Salpeterpapier, Strammonium- und Cannabis indica-Cigaretten; innerlich Chinin, Extr. Quebracho, Chloral oder Morphium mit Jodkali (Chlorali 5·0 oder Morph. mur. 0·1, Kalijodati 3·0, Aq. destill. 150·0, Succ. liq. 10·0, anfangs halbstündlich dann einstündlich 1 Esslöffel), bei unregelmässiger Herzthätigkeit Digitalis. Auch die von Schäffer geübte Faradisation der Vagi unterhalb und einwärts der Kieferwinkel in $^1/_4$—1stündiger Sitzung wirkt zuweilen überraschend. Selbstverständlich müssen auch hier die neuropathische Anlage sowie allenfalls bestehende Constitutionsanomalien sowie gastrische und sexuelle Störungen mit den entsprechenden Mitteln bekämpft werden. Sehr gut wirkt auch längerer Aufenthalt an einem hochgelegenen Orte (St. Moritz, Engadin, Engelberg, Kainzenbad etc.) sowie der mehrmonatliche Gebrauch von Solut. arsen. Fowleri mit oder ohne Tinct. ferri pomata.

Die

Krankheiten der Nebenhöhlen.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Mit der Nasenhöhle stehen die Nebenhöhlen, auch Sinus, pneumatische Räume oder Anhänge genannt, in Verbindung.

Die grösste Nebenhöhle ist der Sinus maxillaris, die Kiefer- oder Highmorshöhle. Sie besitzt eine unregelmässige pyramidale Gestalt, ihre Spitze ist dem Jochfortsatz zugekehrt, ihre Seitenwände werden durch die Augenhöhle und Seitenplatte des Oberkieferbeins gebildet, ihre Basis oder innere Wand, welche sie von der Nasenhöhle scheidet, besteht aus Theilen des Oberkiefers, Gaumenbeins, der unteren Muschel und des Hakenfortsatzes des Siebbeins. Die Kieferhöhle ist von sehr verschiedener Grösse und ragt bald weiter herab als die Nasenhöhle, bald bleibt sie in derselben Höhe mit dieser, bald oberhalb derselben. Sie besitzt verschieden grosse und zahlreiche Ausbuchtungen.

Die Nase communicirt mit der Kieferhöhle durch Vermittlung des zwischen unterer und mittlerer Muschel gelegenen schlitzförmigen Hiatus semilunaris, auch Infundibulum oder Bulla ethmoidalis genannt, in dessen mittlerem oder vorderem Theil sich eine bald rundliche, bald längliche grössere oder kleinere Oeffnung befindet, welche in die Highmorshöhle führt. Von der Höhle aus betrachtet befindet sich die Communicationsöffnung am vorderen Theil der unteren Orbitalwand; sehr oft findet sich noch eine zweite Communicationsöffnung weiter nach hinten an der äusseren Wand der Nase im mittleren Nasengang, gegenüber der Mitte der mittleren Muschel; an dieser Stelle fehlt der Knochen meist vollständig und ist durch eine Membran ersetzt. Die Kieferhöhle beherbergt namentlich in ihrem unteren Theile mehrere grosse Buchten, welche durch Knochenkämme mehr oder weniger von einander geschieden sind. Ihre sehr dünne Bekleidungsmembran enthält acinöse und tubulöse Drüsen und dient theils als Schleimhaut, theils als Matrix einer Beinhaut für die Wandungen der Höhle.

Der Sinus frontalis, die Stirnhöhle, gleicht einer dreiseitigen Pyramide, deren Spitze in dem aufsteigenden Theil des Stirnbeins liegt und deren Basis von dem Uebergang der Schuppe in das Orbitaldach gebildet wird. Wie ihre Form so ist auch ihre Grösse sehr variabel, bald überschreitet sie nur um ein Geringes die Augenbrauenbögen, bald erstreckt sie sich bis in die Jochfortsätze des Stirnbeins, bald reicht sie in sagittaler Richtung blos in den vordersten Abschnitt des Orbitaldaches hinein, dehnt sich aber auch über dem Orbitaldache zu den Seiten der Crista galli tief nach hinten gegen das Keilbein zu aus; bei vielen Menschen ist die Stirnhöhle in mehrere Abtheilungen getheilt, bei Anderen ist sie sehr klein und kaum angedeutet, bei Einigen fehlt sie ganz, sehr oft sind sie in einer Person ungleich entwickelt.

Die Stirnhöhle steht mit der Nase durch eine Oeffnung in Verbindung, welche über dem vorderen Ende der mittleren Muschel, in dem erweiterten vordersten Theil des Infundibulum liegt und senkrecht in die Höhe steigt. Zuweilen findet sich nach des Verfassers Beobachtung namentlich dann, wenn sich der Sinus frontalis sehr weit nach rückwärts zieht, noch eine zweite Communicationsöffnung vor dem vorderen Ende der obersten Muschel, und nach Zuckerkandl sogar noch eine dritte in einem Recessus zwischen mittlerer Muschel und Siebbeinlabyrinth. Der Ausführungsgang der Stirnhöhle ist am günstigsten situirt, auch findet, wie die Erfahrung lehrt, ein Verschluss desselben seltener statt, als bei jenen der anderen Nebenhöhlen.

Sehr verborgen liegt der Sinus sphenoidalis, die Keilbeinhöhle. Ihre vordere obere und seitliche Wand sind dünn und compact, während auf die hintere und untere Wand eine Schichte spongiösen Knochengewebes folgt; zuweilen ist die Keilbeinhöhle von der Schädelhöhle durch dicke Knochenlamellen getrennt; zuweilen ist sie excessiv gross, durch eine Scheidewand in zwei Hälften getheilt, und sendet Buchten in die Pars basilaris ossis occipitis und in die grossen und kleinen Keilbeinflügel und flügelförmigen Fortsätze.

Die verschieden grosse zuweilen nur einseitig vorhandene Communicationsöffnung mit der Nase liegt oberhalb des hinteren Endes der oberen Muschel auf der vorderen Wand der Höhle.

Sehr zahlreich sind die pneumatischen Räume des Siebbeins, der Sinus ethmoidalis.

Sie liegen in den Seitentheilen des Siebbeins und bestehen aus Zellen von sehr verschiedener Grösse und Zahl, die sowohl unter sich als auch mit der Nasenhöhle communiciren; man unterscheidet vordere, mittlere und hintere Siebbeinzellen; die lateral gelegenen sind oft so stark entwickelt, dass durch sie das Orbitaldach vorgewölbt wird. Die mittleren und hinteren Zellen münden in den oberen Nasengang, die vordern communiciren mit dem mittleren Nasengange wiederum durch Vermittlung des Hiatus semilunaris etwas hinter der Mündung des Sinus frontalis.

An der normalen Nase des lebenden Menschen sind die Ausführungsgänge der Nebenhöhlen kaum jemals zu sehen; nur einmal

gelang es dem Verfasser, die accesorische Mündung des Sinus maxillaris bei einem jungen Mädchen zu erblicken, dessen rechte mittlere Muschel auffallend stark gegen die Scheidewand zu aufgerollt erschien.

An kranken Nasen hingegen, so namentlich bei atrophischer Rhinitis oder nach Verlust der unteren oder mittleren Muschel sowie des Septum, hatte Verfasser öfters Gelegenheit, sowohl den Hiatus semilunaris und die accessorische Oeffnung für die Kieferhöhle als auch den Eingang zur Keilbeinhöhle zu sehen.

Die physiologische Bedeutung der Nebenhöhlen ist noch nicht aufgeklärt. Während die Einen glauben, dieselben seien nur dazu da, die Schwere des Schädels zu vermindern, und dadurch die Beweglichkeit des Kopfes zu erleichtern, meinen die Andern, sie seien dazu bestimmt, eine schleimige Flüssigkeit abzusondern und damit die Nase feucht zu erhalten.

Braune und Clasen halten die erstere Ansicht für unwahrscheinlich, weil der Schädel, wenn die Nebenhöhlen statt mit Luft mit Knochenmasse gefüllt wären, doch nur um ein Geringes schwerer wäre, was kaum in Betracht käme. Gegen die letztere Ansicht spräche nicht nur die Beschaffenheit der Sinusschleimhaut, die sehr dünn, arm an Gefässen und zu einer regelmässigen Schleimproduction untauglich wäre, sondern auch die hohe Lage der Abflussöffnungen, aus welchen das Secret nur in ungewöhnlicher Körperstellung abfliessen könne. Sie glauben deshalb, die Nebenhöhlen dienten zur besseren Perception des Geruches. Sie fanden ferner, dass in den Nebenhöhlen bei der Inspiration eine Luftverdünnung, bei der Exspiration eine Luftverdichtung zu Stande kommt.

Zu ähnlichen Resultaten gelangte Paulsen. Er fand, dass unter gewöhnlichen Verhältnissen beim Durchstreichen eines continuirlichen Luftstromes der Luftwechsel in den Nebenhöhlen ein höchst unbedeutender ist, dass derselbe aber sofort ergiebiger wird, wenn der Luftstrom zeitweise gehemmt, oder wie unter normalen Verhältnissen, einmal nach innen und einmal nach aussen gerichtet ist.

Nach Kessel und M. J. Weber bilden die Nase, ihre Nebenhöhlen und das Mittelohr mit seinen anhängenden Zellen ein um das Vorder- und Mittelhirn herumliegendes System von Hohlräumen, welche Wasserdampf, Kohlensäure, Ammoniak und Wasser an dasselbe abgeben und deshalb als Respirationsorgane des Vorder- und Mittelhirns aufgefasst werden können.

Missbildungen, Formfehler und sonstige Anomalien.

Die Nebenhöhlen der Nase zeigen verschiedene Anomalien der Form und anderweitige Veränderungen.

Asymmetrische Entwicklung der Nebenhöhlen selbst an einem und demselben Schädel sind ganz gewöhnlich; abnorme Grösse resp. Erweiterung der Kieferhöhle ist nach Zuckerkandl

bedingt durch sehr tiefe Aushöhlung der Alveolarfortsätze (Alveolarbucht) oder durch Excavation des Nasenbodens, wobei sich die Highmorshöhle zwischen die Platten des harten Gaumens erstreckt (Gaumenbucht), durch Ausbreitung der Höhle in den Stirnfortsatz des Oberkiefers, durch Buchten zwischen stark vortretenden Nervencanälen (Infraorbitalbucht), durch Ausweitung an der Verbindung des Oberkiefers mit dem Jochbein, und endlich durch Einbezogenwerden eines Divertikels der Pars orbitalis ossis palati. Verkleinerung, Verkümmerung und Defect der Kieferhöhle treten auf: durch mangelhafte Resorption der Kieferspongiosa, durch Annäherung der äusseren Kieferwandung an die innere, durch mächtige Ausbauchung der äusseren Nasenwand, durch Verdickung der Kieferwände und endlich durch Retention von Zähnen im Alveolarfortsatze.

Die Diagnose der Verengerungen gründet sich auf den rhinoskopischen Befund, resp. die Hervorwölbung der äusseren Nasenwand, auf die tiefe Einsenkung der Fossa canina und die Asymmetrie des Gesichts. Die erwähnten Grössenanomalien sind praktisch deshalb von Wichtigkeit, weil dieselben auf die Ausbreitung von angesammelten Flüssigkeiten, Ausdehnung und Eröffnung der Höhle Einfluss haben. So kann z. B. in einem engen Sinus die angesammelte Flüssigkeit sich nur wenig ausbreiten, auch wird bei Höhlen mit sehr verdickten Wandungen eine Ausdehnung sehr schwer oder gar nicht zu Stande kommen.

Dehiscenzen der Highmorshöhle treten in dreierlei Form auf. Am häufigsten bilden sie sich im Alter durch Schwund der Knochensubstanz aus, die Wandungen werden papierdünn, durchsichtig, und stellenweise treten Lücken auf; in anderen Fällen entwickeln sich die Dehiscenzen am Grund von Gefässcanälen und endlich auch in Folge einer Bildungshemmung des Knochensystems.

Auch an der Stirnhöhle sind abnorme Erweiterungen und Verengerungen sowie Dehiscenzen und völliges Fehlen beobachtet. Lückenbildung der Stirnhöhlenwände ist bedingt durch Bildungsanomalien oder Atrophie oder Erkrankung der Stirnbeintafeln. Bei Mangel der Keilbeinhöhle findet sich an der vorderen Wand des Keilbeinkörpers statt des Processus sphenoideus ein Grübchen als Anfang der Höhlenbildung; in diesem Grübchen steckt ein flaschenförmiger Anhang der Nasenschleimhaut. Zuweilen wölbt eine hintere Siebbeinzelle die vordere Wand der Keilbeinhöhle unter Verlegung ihres Ausführungsganges nach hinten. Die Siebbeinzellen können zuweilen völlig fehlen, aber auch doppelt vorhanden sein, auch kommen Dehiscenzen der Lamina papyracea mit Eröffnung der Siebbeinzellen gegen die Augenhöhle vor.

Die Krankheiten der Kieferhöhle.

Unter allen Nebenhöhlen erkrankt der Sinus maxillaris am öftesten.

Die Ursachen liegen hauptsächlich in der grossen Häufigkeit krankhafter Veränderungen der Zähne und ihrer Alveolen sowie der Nasenhöhle selbst. Meist geben Caries, Alveolarperiostitis, granulöse Odontitis, Fistelbildung, mangelhafte Zahnung, Einwachsen oder Einstossen von Zähnen in die Höhle oder Liegenbleiben von Fremdkörpern, Wattetampons, Rhinolithen, Verletzungen wie z. B. nach Durchschneidung des N. infraorbitalis, oder Fracturen des Oberkiefers und die verschiedenen primären und secundären, acuten und chronischen Entzündungen der Nase zu Kieferhöhlenaffectionen Anlass, besonders wenn die Schleimhautschwellung das Infundibulum oder dessen nächste Umgebung betrifft.

Man hat vielfach bezweifelt, ob die Verlegung der Ausführungsgänge durch Schwellung der Schleimhaut oder Polypen genüge, um Schleim- oder Eiterbildung in den Nebenhöhlen zu erzeugen. Des Verfassers Beobachtungen sprechen mit Bestimmtheit dafür, dass eitrige Katarrhe der Nebenhöhlen, namentlich der Stirnhöhlen, äusserst häufig durch den erwähnten Verschluss erzeugt und unterhalten werden. Auch Knapp erwähnt gelegentlich eines Falles, auf den wir bei der Diagnose der Nebenhöhlenerkrankungen zurückkommen müssen, es sei gefährlich, Nasenpolypen so lange wachsen zu lassen, denn nur dadurch entstünden durch Verlegung der Eingangsöffnungen die erwähnten Sinusaffectionen. Zuckerkandl erklärt den Vorgang folgendermassen: Während bei freier Communicationsöffnung die Wände der Nebenhöhlen durch das Secret derselben feucht erhalten werden, und dasselbe sich nicht im Sinus ansammelt, weil es theils resorbirt wird, theils durch die passirende Luftströmung verdunstet, wird bei Verschluss des Ausführungsganges die in der Höhle befindliche Luft vom Gefässsystem aufgenommen; die Absonderung des Secretes übersteigt jetzt die Aufsaugung, das angesammelte Secret wird zersetzt und reizt die Schleimhaut. Hartmann glaubt, dass die in den Nebenhöhlen eingeschlossene unter vermindertem Drucke stehende Luft zu stärkerer Füllung der Gefässe, Schwellung der Schleimhaut und gesteigerter Secretion Anlass gibt.

Die verschiedenen acuten und chronischen Katarrhe der Nase pflanzen sich durch das Infundibulum auf den Sinus maxillaris fort; das Lumen der Oeffnung kann wegsam bleiben, oder verengt oder völlig verstopft werden, was bei ovaler und schlitzartiger Form derselben leichter ist, als bei runder und weiter. Nach Zuckerkandl zeigt sich anfangs die Bekleidungsmembran des Sinus in ganzer Dicke injicirt, geröthet, zuweilen ecchymosirt; Secret fehlt anfangs, später wenn die Schleimhaut namhaft geschwellt ist, erfolgt Exsudation. Die Schleimhaut erscheint dann ödematös, sulzig, an der Oberfläche mit grossen, weingelben, hydropischen Hervorwölbungen versehen; die Höhle enthält ausserdem noch freie Flüssigkeit von theils eitriger,

theils schleimiger oder hämorrhagischer Beschaffenheit und glasiger Consistenz.

Die Ansammlung von schleimiger Flüssigkeit bezeichnet man als Mukokele oder Hydrops, jene von Eiter als Empyem.

Von den meisten Autoren wird das Vorkommen freier Schleimansammlung in den Kieferhöhlen geleugnet, und der unpassender Weise so genannte Hydrops antri Highmori mit cystöser Degeneration der Schleimhaut identificirt. Abgesehen von einem von Verneuil mitgetheilten Falle von freier nicht in Cysten eingeschlossener Flüssigkeit unterscheidet auch Zuckerkandl die chronisch-entzündlichen und ödematösen Schwellungen und Cysten der Kieferhöhle von den Ergüssen, welche durch Retention von Secret entstehen, und bei welchen bisher noch keine Erweiterung der Highmorshöhle beobachtet wurde.

Viel häufiger ist die Ansammlung von eitriger Flüssigkeit. Verfasser zieht es vor, jene Fälle, bei denen die Communicationsöffnungen der Sinus frei sind, und eiteriger Nasenfluss vorhanden ist, als eitrige Katarrhe, Blennorrhoen der Nebenhöhlen zu bezeichnen, das Wort Empyem hingegen auf jene Fälle zu beschränken, bei denen die Ausführungsgänge der Nebenhöhlen verlegt sind und durch die natürlichen Oeffnungen kein Secretabfluss stattfindet.

Die Erscheinungen der Eiteransammlung der Kieferhöhle sind verschieden, je nachdem die Erkrankung acut oder chronisch auftritt, und je nachdem die Communicationsöffnung frei oder verlegt ist.

Entsteht die Affection acut, wie z. B. nach Fracturen, Stichverletzungen des Oberkiefers oder ungeschickter Zahnextraction, so kann mehr oder weniger heftiges Fieber, allgemeines Unbehagen, Kopfschmerz, dumpfer, bohrender Schmerz in den Zähnen des Oberkiefers oder in der Tiefe der Wangen vorhanden sein; der durch Druck auf den Knochen oder durch geistige Ueberanstrengung, Körperbewegung, Alkoholgenuss, sich verstärkende Schmerz ist theils continuirlich, theils intermittirend, und erklärt sich aus der Entzündung und dem Drucke, welchen die sich rasch ansammelnde Flüssigkeit auf die Nervenendigungen ausübt.

Anders sind die Symptome bei chronischem Verlauf, wenn die Communicationsöffnung mit der Nase nicht oder nur vorübergehend verlegt ist.

In solchen Fällen können zwar auch das Gefühl der Verlängerung der Zähne oder zeitweiser Schmerz in den Zähnen, Ohren, Wangen, in der Stirngegend, unter den Augen, an der Nasenwurzel der befallenen Seite auftreten, sowie Schwindel, einseitiger Kopfschmerz, Unlust zu geistiger Arbeit und andere nervöse Erscheinungen vorhanden sein, doch können ebensogut alle diese Erscheinungen fehlen. Der eitrige Katarrh der Kieferhöhle verläuft unstreitig am häufigsten unter dem Bilde einer chronischen Naseneiterung. Der Ausfluss von übelriechendem, dünn- oder dickflüssigem, käsig-krümeligem oder sanguinolentem Eiter ist einseitig, bei Affection beider Sinus natürlich doppelseitig, und zwar entweder continuirlich oder nur zeit-

weise auftretend. Bei der für den Abfluss des Eiters höchst ungünstigen Lage der Communicationsöffnung am obersten Theile der Höhle muss der Eiter zuerst die ganze Höhle erfüllen, bis er abfliessen kann; sein Abfluss wird deshalb durch gewisse Körperstellungen, bei dem Neigen des Kopfes nach der entgegengesetzten Seite, nach vorne und unten, beim Verlassen der horizontalen Lage am Morgen nach dem Aufstehen, begünstigt. Bei continuirlichem Abflusse muss man eine sehr schnelle, bei zeitweiser eine langsame Wiederansammlung des Eiters annehmen. Nicht selten fühlen sich die Kranken nach dem Abflusse des Secretes bedeutend erleichtert. Der üble Geruch des Secretes wird in der Regel vom Kranken selbst wahrgenommen, was insoferne von diagnostischer Bedeutung ist, als bei genuiner Ozaena, nicht selten auch bei syphilitischer, der Fötor den Patienten nicht zur Wahrnehmung gelangt.

Bei der objectiven Untersuchung erscheint die Nasenschleimhaut theils normal, theils diffus sammtartig geschwellt, theils hochgradig succulent, letzteres namentlich in der Umgebung des Hiatus semilunaris oder an der untern Muschel. Ziemlich häufig sind die den Hiatus semilunaris umgebenden Knochen oder deren Nachbarschaft von Periost entblösst und fühlen sich rauh an. Das wichtigste diagnostische Merkmal neben der periodisch auftretenden Entleerung grösserer Eitermassen ist der mit dem Spiegel zu constatirende Abfluss von Eiter aus dem Hiatus semilunaris resp. dem mittleren Nasengange, zwischen dem äusseren Rand der mittleren Muschel und der äussern Nasenwand oder der untern Muschel.

Deutlicher und ausgebildeter sind die Erscheinungen der Kieferhöhleneiterung resp. des Empyems, wenn durch dauernden Verschluss der Communicationsöffnung der Abfluss des Eiters verhindert wird.

Zu den frühesten und häufigsten Erscheinungen gehören nach Wernher Neuralgien des Gesichtes und der Zähne, sowie durch den Druck des Exsudates bedingte Caries des ersten bis dritten Backzahnes, deren Wurzeln sehr weit in die Highmorshöhle hinaufragen und oft nur durch eine papierdünne Knochenlamelle von der Kieferhöhle getrennt sind. Auch ödematöse, erysipelatöse Schwellungen der Wange wurden beobachtet. Mit dem Anwachsen des Exsudates kommt es zu Erweiterung, Hervorwölbung und Verdünnung der Sinuswände, die bald mehr in der Gegend der obern Eck- und Backzähne oder am harten Gaumen, bald mehr in der Fossa canina oder Regio zygomatica, bald am innern untern Rande der Orbita ihren Sitz hat. Durch Hervorwölbung der orbitalen Wand der Kieferhöhle entsteht Verdrängung des Bulbus mit Exophthalmus und mehr oder weniger beträchtlicher Sehstörung, bei Vorwölbung der äussern Wand der Nase Verstopfung. Zuweilen findet sich am Zahnfleisch eine Fistel oder am harten Gaumen eine Perforation.

Eine sehr seltene Erkrankung scheint nach Weichselbaum die Phlegmone der Highmorshöhle zu sein.

Sie charakterisirt sich als Entzündung der Auskleidungsmembran mit Einlagerung disseminirter oder confluirender und in Zerfall übergehender fibrinöser Plaques in die Membran selbst. Am häufigsten und intensivsten scheint die Kieferhöhle befallen zu werden, doch erkranken auch die andern Nebenhöhlen; die Nase ist entweder nicht betheiligt, oder zeigt nur geringfügige Veränderungen.

Sowohl bei primärem als secundärem Auftreten der Affection, namentlich bei phlegmonösen Processen der Zunge oder des Rachens oder bei Croup des Larynx und Pharynx, sind die Erscheinungen äusserst stürmisch und bestehen ausser in Fieber und Schmerzen in der Oberkiefer- und Stirnhöhlengegend in Störungen der Gehirnthätigkeit, die schon nach 2—4 Tagen zum Tode führen können. Als Complicationen der primären Form fand Weichselbaum Milzschwellung, Schwellung und Trübung der Leber und Nieren mit theilweiser fettiger Degeneration, Ecchymosen der Pleura und des Pericards.

Das Gesichtserysipel führt gleichfalls zuweilen zu phlegmonöser Entzündung der Sinusmembran, dieselbe unterscheidet sich jedoch von der ebengenannten Form durch den Mangel fibrinöser Einlagerungen. In umgekehrter Weise führt auch die Sinusphlegmone zu Gesichtserysipel, was namentlich bei den den Abdominaltyphus begleitenden Erysipelen der Fall sein soll.

Diphtherie des Sinus maxillaris soll nach Zuckerkandl ohne Membranbildung verlaufen, da die sogenannte Schleimhaut des Sinus vermöge ihres anatomischen Baues unfähig ist, eine Pseudomembran zu bilden, es findet sich nur Ecchymosirung und Oedem.

Die Kieferhöhle ist ferner nicht selten Sitz von Neubildungen.

Zu den häufigsten gehören die Schleimpolypen, die von Zuckerkandl in gestielte, in brückenartig zwischen den Wänden ausgespannte Geschwülste und in flache breitbasige Schleimhauttumoren eingetheilt werden.

Die Cysten gehen aus den Schleimdrüsen der Sinusmembran hervor, ihre Grösse schwankt zwischen der eines Hirsekorns und einer Haselnuss. Ausserdem wurden noch beobachtet: Fibrome, Osteome, todte Osteome, Osteophyten, ossificirende Fibrome, Myxochondrosarcome, Epithelialcarcinome.

Die Symptome der Kieferhöhlengeschwülste sind, so lange die letzteren die Höhle nicht ausdehnen oder durchbrechen, dunkel oder identisch mit den bei Mukokele oder Empyem geschilderten. Bei Ausdehnung der Sinuswände mache man eine Probepunction, auch spricht die Anwesenheit von Geschwulstmassen in der Nase für Tumor. Die Cysten können nach Wernher spontan bersten; die Ausdehnung der Sinuswände verschwindet nach Abfluss einer albuminösen Flüssigkeit oft von selbst, auch nehmen die erweichten Knochen wieder Kalksalze auf.

Die Krankheiten der Stirnhöhle.

Sie nehmen in Bezug auf Häufigkeit die zweite Stelle ein und sind so ziemlich dieselben, wie die des Sinus maxillaris. Aeusserst häufig werden die Stirnhöhlen bei dem acuten und chronischen Nasenkatarrh, manchmal auch bei phlegmonöser Angina, in Mitleidenschaft gezogen.

Die acute Entzündung der Schleimhaut des Sinus frontalis verursacht das heftige Stirnkopfweh, welches theils dem Ausbruche des acuten Nasenkatarrhs oder Jodschnupfens vorhergeht, theils denselben begleitet oder ihm nachfolgt. Bei manchen Personen wird bei jedem Schnupfen der gleiche Sinus befallen. Der Schmerz, dessen Sitz die Kranken theils in die Gegend der Glabella, theils in die Tiefe des Auges oder der Augenbrauen verlegen, ist bald continuirlich, bald intermittirend, von deutlich neuralgischem an gewisse Stunden gebundenem Charakter. Er wird oft durch geistige Thätigkeit und durch Körperbewegungen, Husten, Schneuzen, Alcoholica oder Druck auf den Knochen gesteigert, und kann selbst zu Uebelkeit und Erbrechen führen, wodurch das Krankheitsbild mit jenem der Migräne ausserordentliche Aehnlichkeit gewinnt. Supraorbitalneuralgie fehlt kaum jemals in dem Bilde der Sinusentzündung.

Trotz der Häufigkeit dieses Symptomes bei Stirnhöhlenkatarrh vergesse man aber nicht, dass dasselbe zuweilen auch durch Ulcerationen und Granulationen der Nasenschleimhaut bedingt ist.

Untersucht man im acuten Stadium des Katarrhs die Sinusmembran, so erscheint sie beträchtlich geschwellt, ödematös und ecchymosirt. Die Exsudation von schleimiger oder eitriger Flüssigkeit kommt meist erst nach längerem Bestehen zu Stande.

Wie in der Kieferhöhle, so kommt auch in der Stirnhöhle die Ansammlung von schleimiger Flüssigkeit (Mukokele) und von Eiter (Empyem) vor. Uebergangsformen, d. h. Ergüsse von schleimig-eitriger, eitrig-hämorrhagischer Flüssigkeit sind gleichfalls beobachtet.

Als Ursachen der beiden Erkrankungen sind nach Emil König anzuführen: chronische eitrige Katarrhe der Nase, primärer oder secundärer Natur, letztere in Folge von Infection mit Trippergift oder der Anwesenheit von Fremdkörpern, Nasensteinen, Polypen, Parasiten, ferner von Erysipelas faciei, Traumen des Stirnbeins, Fall oder Stoss auf die Gegend der Augenbrauen, der Nasenwurzel oder Glabella, Fracturen der Knochen, Caries und Nekrose in Folge von Syphilis, jauchiger Zerfall von Polypen und Entwicklung von Rotzknoten.

Die Erscheinungen sind ebenso wie jene bei Erkrankung der Kieferhöhle verschieden, je nachdem der Ausführungsgang geschlossen ist oder offen bleibt.

Bei der Mukokele findet sich wie bei jener der Kieferhöhle die Schleimhaut Anfangs injicirt, ecchymosirt, später bis zu gänzlicher Ausfüllung der Höhle aufgequollen, ödematös, und von gelblichem Serum durchsetzt, auch freie Flüssigkeit ist in verschiedener Menge

vorhanden. Die Affection entwickelt sich in der Regel äusserst langsam und nicht selten ohne besondere Beschwerden, doch kann Druck im Kopfe sowie Supraorbital-Neuralgie den Beginn der Erkrankung anzeigen. Wird der Ausführungsgang verlegt, so bildet sich allmählich am inneren Augenwinkel eine weiche fluctuirende Geschwulst, meist in der Nähe der Nasenwurzel, etwas oberhalb des Thränensackes. Durch den wachsenden Druck der Flüssigkeit wird die Knochennaht zwischen Thränenbein und Orbita auseinandergedrängt, so dass die ödematöse Sinusmembran in die Nasenhöhle gelangt und dort als ein bisweilen auf den Nasenboden herabhängender Tumor gesehen werden kann. Natürlich ist in solchen Fällen die betreffende Nasenhöhle mehr oder weniger verstopft, und treten Erscheinungen wie bei Neubildungen der Nase auf. Exophthalmus mit Verdrängung des Auges nach vorne, aussen und unten, sowie Hervorwölbung der Stirngegend gehören zu den weiteren Erscheinungen. Die vordere Wand der Stirnhöhle wird verdünnt, bei Druck nachgiebig, zuweilen wie der Deckel einer blechernen Dose, oder fluctuirend; die Geschwulst zeigt sich in Form und Grösse sehr veränderlich, was in der zeitweisen Entleerung des Sinusinhaltes seinen Grund hat; manchmal entleert sich plötzlich mit momentaner Erleichterung eine grosse Menge Flüssigkeit durch die Nase, wie die von H. Fischer und Paget mitgetheilten Fälle beweisen. Schwere Gehirnsymptome kommen nur ausnahmsweise vor, meist dann, wenn der Sinusinhalt eitrig geworden ist; im Uebrigen hat der Stirnhöhlen-Hydrops keine oder nur eine sehr geringe Neigung zum Durchbruch nach aussen und verläuft meist ohne Ostitis oder Periostitis der Sinuswandungen. Immerhin ist er eine ernste Erkrankung, doch ist die Prognose insoferne günstig, als letaler Ausgang äusserst selten ist, und nach Beseitigung der Flüssigkeit die Störungen sich meist völlig zurückbilden.

Dieselben Erscheinungen machen auch Blutergüsse, die nach Steiner zu den allergrössten Seltenheiten gehören, und durch heftigen Stoss auf die Augenlidgegend erzeugt werden können.

Bei dem eitrigen Katarrhe der Stirnhöhle ohne oder mit nur zeitweisem und unvollständigem Verschlusse des Ausführungsganges sind die Erscheinungen oft sehr geringfügig und wechselnd; sie beschränken sich in der Regel, ebenso wie bei eitrigem Kieferhöhlenkatarrh, auf zeitweisen oder immerwährenden Ausfluss eines dicken, rahmartigen, wenig oder sehr übelriechenden Eiters; doch sind daneben meist zeitweiser Kopfschmerz, Eingenommenheit, dumpfer Druck über dem Auge oder in dem innern Augenwinkel, oder Supraorbitalneuralgie, Unlust und Unvermögen zu angestrengter geistiger oder körperlicher Arbeit vorhanden. Wie bei Kieferhöhleneiterung so beobachtet man auch hier Nachlass der Beschwerden nach Abgang grösserer Quantitäten Secretes.

Das Empyem der Stirnhöhle, d. h. die Ansammlung von Eiter bei Verschluss der Communicationsöffnung, geht bei acutem Verlaufe mit Fieber, bohrenden Schmerzen in und über dem Auge, unerträglicher Supraorbitalneuralgie, Schwindel, ja sogar mit Sopor, Delirien

und Nackensteifheit einher; das obere Augenlid, die Gegend der Nasenwurzel und Augenbrauen, ja die ganze Gesichtshälfte erscheint ödematös, oder es bildet sich bei chronischem Verlauf ohne Schwellung der Weichtheile an der Innenseite der Orbita eine zuerst harte, dann weicher werdende und fluctuirende Geschwulst, welche in die Nasenhöhle oder durch die Weichtheile nach aussen durchbricht. In andern Fällen, wie z. B. in dem von Otto mitgetheilten, kommt es in Folge von allmählicher Anstauung des Secretes und Ausdehnung der Sinuswände durch Druck auf das Stirnhirn zu halbseitiger Lähmung; auch Schwindelanfälle, apoplektische Insulte, Lähmung der Arme wurden beobachtet; andererseits scheint sich das Gehirn an den langsam wachsenden Druck zu gewöhnen. Zuweilen bricht das Empyem ohne vorherige objective Veränderungen in die Schädelhöhle durch und führt so unerwartet durch Meningitis zum Tode; gewöhnlich bildet sich jedoch wie bei Mukokele, eine Hervorwölbung oder ein Tumor der innern Orbitalwand mit Entstellung des Gesichts durch Schiefstellung der Lidspalte oder Exophthalmus oder Verdrängung des Auges nach unten und aussen, welches in einem Falle im Niveau der Nasenspitze gefunden wurde. Die Hervorwölbungen der inneren oberen Orbitalwand sind in Folge der beträchtlichen Verdünnung der Knochen meist von geringer Resistenz, elastisch, eindrückbar, oder sogar fluctuirend; doch können dieselben ausnahmsweise, wie in einem von Herzog Carl mitgetheilten Falle, eine derartige Härte besitzen, dass sie selbstständige Knochenneubildungen, namentlich Exostosen der Orbita vortäuschen; auch hatte in dem eben citirten Falle der Eiter die dünne Scheidewand zwischen beiden Stirnhöhlen durchbrochen, und eine Communication beider Sinus frontales bewerkstelligt. Die Beweglichkeit des Bulbus ist in der Regel wenig oder nicht verändert, aber fast immer Diplopie, Strabismus divergens, in hochgradigen Fällen partielle oder totale Amaurose, Conjunctivitis oder Keratitis mit Immobilität des Bulbus vorhanden. Der Exophthalmus bildet sich, vorausgesetzt dass nicht auch die am weitesten nach hinten gelegenen Zellen des Sinus frontalis mit Eiter gefüllt sind, nach Eröffnung der Höhle von selbst zurück. Die durch spontanen Durchbruch entstandenen Fisteln heilen selten ohne Kunsthilfe. Von Mason Warren wurde ein Fall von Stirnhöhleneiterung in Folge von Periostitis und Nekrose an der äussern Tafel des Stirnbeins beschrieben, bei welchem es später zur Bildung eines Lufttumors kam.

Zu den seltensten Vorkommnissen gehören Hernien der Stirnhöhle. Ausser dem eben erwähnten Falle von Warren ist noch einer von Rizet berichtet, ein anderer von König. In dem letzteren hatte sich ein wahrscheinlich syphilitischer Defect wieder überhäutet und nun trat, nachdem früher der Durchtritt der Luft beim Schneuzen beobachtet worden war, bei der Exspiration unter den Hautdecken eine Geschwulst hervor, weich und reponibel, welche durch eine bruchbandartige Vorrichtung zurückgehalten wurde. In dem Rizet'schen Falle lag ebenfalls Syphilis vor; die Hernie verschwand aber nach Abgang eines nekrotischen Knochenstückes.

Auch Neubildungen kommen in der Stirnhöhle vor. Sicher constatirt und ziemlich häufig sind Schleimpolypen, Cysten, hauptsächlich aber Osteome, die nach Arnold, Banga, Bornhaupt und Anderen von der Innenfläche der Stirnhöhle ihren Ausgang nehmen, und theils aus compacter, theils spongiöser Knochenmasse bestehen, local bleiben, aber auch in den Schädel eindringen können.

Die von Dolbeau und Tillmanns beschriebenen todten Osteome haben daher ihren Namen, weil sie nicht von Weichtheilen bedeckt sind und keinen Stiel haben, sondern als abgestossene Sequester frei in den Nebenhöhlen liegen.

Zu den grössten Seltenheiten gehören Teratome; so beobachtete Salzer einen eigrossen Tumor der Stirnhöhle, der aus Fettgewebe, glatten Muskelfasern, kleinen Knöchelchen und haarenthaltenden Cysten bestand.

Die Symptome sind bedingt durch die Grösse, den Sitz und das Wachsthum der Geschwülste und mit den bei dem Empyem beschriebenen grösstentheils identisch.

Die Krankheiten der Keilbeinhöhle.

Acute und chronische Entzündungen der Sinusmembran entstehen fast nur durch Fortpflanzung entzündlicher Processe der Nase, des Nasenrachenraumes oder anderer Nebenhöhlen. Die Retention von Secret findet wegen der günstigen Lage der Abflussöffnung nicht so häufig statt wie in der Kieferhöhle. Die anatomischen Veränderungen sind dieselben wie bei den Entzündungsprocessen der Kiefer- oder Stirnhöhle.

Die chronische eitrige Entzündung der Keilbein- und Siebbeinhöhle wird von Michel als die Ursache der Ozaena angesehen. Wenn es auch richtig ist, dass die Keilbeinhöhle oder die anderen Sinus bei Ozaena öfters miterkrankt befunden werden und fötides Secret liefern, so ist doch andrerseits sicher, dass die genuine Ozaena auf einem chronischen mit Atrophie der Schleimhaut einhergehenden Katarrh der Nasenhöhle selbst beruht. Eitrige Katarrhe der Keilbeinhöhle verdanken in der Regel der Scrophulose oder der Syphilis der Nasenschleimhaut ihre Entstehung und können nach Ablauf dieser Processe für sich fortbestehen. So konnte Verfasser bei einem seit seiner Kindheit mit atrophischer Rhinitis auf scrophulöser Basis behafteten Kranken einen auf die Umgebung des Ausführungsganges der Keilbeinhöhle localisirten cariösen Process mit der Sonde constatiren und den Abfluss des Eiters direct sehen. Schleim- und Eiteransammlung in der Keilbeinhöhle wurde endlich auch bei Meningitis tuberculosa und cerebrospinalis beobachtet.

Subjective Beschwerden können bei unbehindertem Abfluss des Secretes völlig fehlen, doch besteht zuweilen Druck und Schwere im Kopfe, sowie Verschleimung im Rachen.

Objectiv verläuft die Erkrankung unter dem Bilde eines mehr oder weniger fötiden Nasenausflusses; längere Zeit hindurch beobachtetes Abträufeln von Eiter zwischen der medialen Fläche der mittleren Muschel und Nasenscheidewand hoch oben und hinten am Nasendache spricht mit grosser Wahrscheinlichkeit für eine Eiterung in der Keilbeinhöhle.

Die Erscheinungen, welche Empyeme der Keilbeinhöhle bei Verschluss der Communicationsöffnung machen, können denen in anderen Höhlen völlig gleichen. So berichtet unter Anderen Rouge über eine Dame, welche an Näseln, Schmerzen in den obern Zähnen, Exophthalmus, Strabismus, später an linksseitiger Taubheit und Blindheit litt, und welcher er in der Meinung, der Sitz des Uebels sei die Kieferhöhle, diese resecirte; die letztere fand sich aber bei der Section gesund, dagegen die Keilbeinhöhle mit Eiter gefüllt. Deutlicher sind die Symptome, wenn sich zu dem Empyem Caries und Nekrose der Sinuswände gesellen. In solchen Fällen kommt es nach Berger und Tyrman zuweilen zu plötzlicher einseitiger Erblindung, Phlegmone und Emphysem der Orbita, oder zu Retropharyngealabscess, Sinusthrombose, Meningitis, tödtlicher Blutung aus dem Sinus cavernosus, Abstossung einzelner Theile des Keilbeinkörpers durch die Nase oder den Rachen.

Neubildungen der Keilbeinhöhle, welche theils primär in ihr entstehen, wie Schleimpolypen, Osteome, Sarcome oder Carcinome, theils von der Nachbarschaft vom Siebbein oder Nasenrachenraum in dieselbe hineinwuchern, machen meist erst Symptome, wenn sie die Höhle erweitern oder über dieselbe hinauswachsen; heftiger Kopfschmerz, Amaurose, Exophthalmus, Meningitis, epileptiforme Anfälle, Metastasen in andern Organen, sind nach Berger und Tyrman die gewöhnlichen Erscheinungen.

Die Krankheiten der Siebbeinhöhlen.

Erkrankungen des Sinus ethmoidalis kommen theils für sich theils in Verbindung mit solchen anderer Nebenhöhlen vor. Bei der exponirten Lage und der häufigen Erkrankung der mittleren Muscheln erscheint es auffallend, dass Affectionen der Siebbeinzellen nicht öfter zur Beobachtung gelangen; sicher liegt der Grund hiefür in der Kleinheit der Zellen, der Dünne ihrer Wandungen und der grösseren Zahl von Communicationswegen mit der Nasenhöhle, welche es ermöglichen, dass pathologische Producte leichter weggeschafft werden resp. sich selbst einen Ausweg bahnen.

Acute und chronische Entzündungen der Siebbeinhöhlen entstehen durch Fortpflanzung entzündlicher Processe von der Nase und dem Nasenrachenraum, der Orbita und anderen Nebenhöhlen sowie durch Verlegung der Ausführungsgänge durch Muschelhypertrophie oder Polypenbildung. Wie in den anderen Nebenhöhlen kommt

es auch in den Siebbeinhöhlen theils zu Ansammlung freier Flüssigkeit, theils zur Entwicklung cystenartiger Tumoren in der Sinusmembran. Die Folgen dieser Veränderungen gestalten sich sehr verschieden. So kann es z. B. nach Berger und Tyrman zu Atrophie der Scheidewände mehrerer benachbarter Siebbeinzellen kommen, oder zu Verschmelzung mehrerer Höhlen in eine, zur Bildung glatter einkammeriger Cysten, zu Verschmelzung der Siebbeinzellen mit der Stirnhöhle oder der Orbita.

Relativ selten bilden sich eitergefüllte Hohlräume (Empyeme) oder Knochencysten oder Knochenblasen, welche durch allmähliche Expansion des Siebbeins zu Verbreiterung des Nasenrückens, Hervorwölbung der inneren unteren Wand der Orbita mit oder ohne Exophthalmus, ferner zu Verstopfung der Nase und Compression des Thränennasenganges führen. In einem vom Verfasser beobachteten, ein 17jähriges scrophulöses Mädchen betreffenden Falle, zeigte sich neben hochgradiger Verdrängung des rechten Auges nach aussen und unten durch Hervorwölbung der rechten inneren unteren Orbitalwand und kolossaler Verbreiterung des Nasenrückens die rechte mittlere Muschel so beträchtlich durch eine schleimig-eitrige Flüssigkeit ausgedehnt, dass sie bis auf den Boden der Nasenhöhle herabreichte. Knochencysten im Siebbein wurden ferner auch von Bayer und Schmithuisen beobachtet. Empyeme des Siebbeinlabyrinthes, die mit Caries und Nekrose der Knochen combinirt sind, haben, wie die von Hartmann und Schäfer mitgetheilten Fälle beweisen, zuweilen Abscesse und Emphysem der Orbita, Exfoliation von Knochensequestern ja selbst den Tod zur Folge. Umgekehrt können aber auch Empyeme der Orbita in die Siebbeinzellen durchbrechen.

Die Diagnose der Siebbeineiterungen und Siebbeincysten stützt sich einestheils auf das Abträufeln von Eiter aus dem mittleren Nasengang zwischen äusserem Rande der mittleren Muschel und der äusseren Nasenwand (bei Erkrankung der vorderen Siebbeinzellen) oder aus der Rima olfactoria resp. dem oberen Nasengang (bei Erkrankung der mittleren und hinteren Siebbeinzellen), anderntheils auf die Anwesenheit von Auftreibungen und Tumoren der mittleren Muschel, Hervorwölbung der inneren unteren Orbitalwand und Verbreiterung des Nasenrückens.

Neubildungen des Siebbeinlabyrinthes sind theils primäre wie Schleimpolypen, Fibrome, Elfenbeinexostosen, Osteome, Sarcome, Carcinome, theils secundäre, d. h. von der Nachbarschaft hineingewachsen. Die Erscheinungen bestehen meist in Verlegung der Nase, Hervorwölbung der inneren Orbitalwand, Verdrängung des Bulbus nach aussen mit beschränkter Beweglichkeit des Augapfels, Verminderung oder völliger Aufhebung der Sehschärfe, Thränenträufeln etc. Verletzungen des Siebbeinlabyrinthes haben öfters Emphysem der Orbita und der Augenlider, Blutung aus der Nase, und bei Communication der oberen Wand des Siebbeins mit Fissuren der Schädelbasis continuirliches Abträufeln von Cerebrospinalflüssigkeit zur Folge.

Der Vollständigkeit wegen sei am Schlusse noch erwähnt, dass in sämmtlichen Nebenhöhlen nach Virchow eine kalkige Degeneration der Schleimhaut beobachtet wird, welche meist auf die Nasenhöhle übergeht. Auch sind die Nebenhöhlen zuweilen der Sitz von Rhinosclerom- und Rotzknoten, sowie von Parasiten, namentlich Spulwürmern und Oestruslarven.

Tuberculose der Nebenhöhlen scheint nach Weichselbaum selbst bei ausgesprochener Tuberculose der Nasenschleimhaut nicht vorzukommen; es findet sich nur eine einzige gegentheilige Notiz bei Tornwaldt, der erwähnt, Neumann habe einmal bei Caries des Oberkiefers in der Highmorshöhle fungöse Granulationen untersucht, welche von Tuberkeln durchsetzt gewesen seien.

Nachdem die Affectionen der einzelnen Nebenhöhlen im Detail geschildert wurden, erübrigt noch, einige allgemeine Gesichtspunkte über die Diagnose und Therapie hinzuzufügen.

Die **Diagnose** der Nebenhöhlenerkrankungen stösst trotz der beschriebenen subjectiven und objectiven Erscheinungen oftmals auf grosse selbst unüberwindliche Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten beziehen sich sowohl auf den Entscheid, ob überhaupt eine Nebenhöhlenerkrankung vorliegt, als auch auf die Frage, welche Nebenhöhle erkrankt ist. In ersterer Hinsicht fällt die Beantwortung um so schwieriger, je vieldeutiger die subjectiven und je weniger entwickelt die objectiven Symptome sind. Die Versuche von W. Zenker und Czernicki, die Auscultation und Percussion in zweifelhaften Fällen zur Diagnose heranzuziehen, müssen im Allgemeinen als gescheitert betrachtet werden, wenn dieselben auch in äusserst seltenen Fällen, wie bei blasenartiger Verdünnung der Sinuswände, brauchbare Resultate ergeben. Für alle Fälle empfiehlt sich zur Fixirung der Diagnose die längere Beobachtung, die Untersuchung in verschiedenen Tageszeiten und Körperstellungen (Ziem), die Anwendung der Luftdouche (Hartmann), das Cocainisiren und Einlegen von Wattetampons oder Pressschwamm (Hopmann, Störk) in den mittleren Nasengang. Noch schwieriger zu entscheiden, ob eine Sinusaffection vorhanden ist, ist es oft zu bestimmen, welcher Sinus erkrankt ist, und ob nicht gleichzeitig mehrere afficirt sind. Wie leicht eine Täuschung in Bezug auf die Localität möglich ist, beweist der oben erwähnte Fall von Rouge; in Bezug auf die gleichzeitige Erkrankung mehrerer Sinus ist ein Fall von Knapp sehr lehrreich; er betraf einen Kranken, welcher wiederholt an Nasenpolypen gelitten, und bei welchem sich eine Elfenbeinexostose des Siebbeins an der Nasenseite der linken Orbita unter Verdrängung des Bulbus entwickelt hatte. Bei der Entfernung derselben von der Orbita aus wurde der Sinus frontalis eröffnet und dieser mit Eiter und polypösen Massen erfüllt gefunden; nach dem in Folge von Meningitis erfolgten Tode fand sich auch noch die linke Keilbeinhöhle, deren Ausführungsgang durch einen Polypen

verlegt war, mit einer schmierigen, käsigen, aus eingedicktem Schleimeiter bestehenden Masse ausgefüllt.

Die locale Diagnose wird hauptsächlich erschwert durch die Enge, die verborgene Lage und die gemeinsame Mündung der Ausführungsgänge aller Nebenhöhlen im mittleren Nasengange. Wenn auch das Hervorquellen oder tropfenweise Erscheinen von Eiter zwischen mittlerer und unterer Muschel nach Beiseiteschieben oder Exstirpation eines Polypen oder hypertrophischer Schleimhautpartien oder bei Druck auf die mittlere Muschel mit Sicherheit die Diagnose einer Nebenhöhlenerkrankung im Allgemeinen gestattet, so ist damit doch noch nicht entschieden, welche der Nebenhöhlen die kranke sei. Mit Bestimmtheit zu eruiren, ob der Eiter von der äussern Nasenwand aus dem Hiatus semilunaris, also aus der Kieferhöhle komme, oder ob er mehr von oben, also aus der Stirnhöhle oder den vorderen Siebbeinhöhlen stamme, ist in der Regel unmöglich; nur unter sehr günstigen Verhältnissen, wenn die mittlere Muschel sehr weit von der äussern Nasenwand absteht, und man sehr tief in den mittleren Nasengang hineinschauen kann, lässt sich feststellen, aus welcher Höhle der Eiter stammt. Mehrmals wurde Verfasser durch die Anwesenheit einer stark pulsirenden, Lichtreflexe zeigenden, eiterbedeckten Stelle zwischen mittlerer und unterer Muschel auf das Vorhandensein einer Kieferhöhlenerkrankung aufmerksam gemacht.

Am schwierigsten und unsichersten ist die Diagnose der Keilbeinhöhlenaffectionen; längere Zeit hindurch beobachtetes Abträufeln von Eiter aus dem oberen Nasengang und der Rima olfactoria einestheils, auf das vorher gereinigte hintere Ende der Muscheln und in den Nasenrachenraum andererseits, spricht zwar sehr für eine Eiterung in der Keilbeinhöhle, doch sind Verwechselungen mit Empyem der hinteren Siebbeinhöhlen, mit Eiterungen am Nasendach oder mit Bursitis pharyngea nicht auszuschliessen. Die Sondirung der Nebenhöhlen würde ein ausgezeichneter diagnostischer Behelf sein, wenn sich dieselbe nur in allen Fällen und unter allen Umständen durchführen liesse.

Die **Behandlung** der Nebenhöhlenerkrankungen ist zur Zeit zwar noch eine mangelhafte, doch keineswegs ganz aussichtslose.

Vor Allem muss den ätiologischen Momenten Rechnung getragen werden; man beseitige daher cariöse Zähne, Fremdkörper, Fisteln oder sonstige die Zähne und Alveolen betreffende Anomalien. Da die meisten Sinuserkrankungen durch acute oder chronische Schwellungen der Nasenschleimhaut, namentlich der mittleren Muschel, oder durch polypoide Excrescenzen und Schleimpolypen verursacht oder unterhalten werden, so hat vor allen Dingen die Beseitigung derselben nach den bereits angegebenen Regeln zu geschehen.

Der Versuch, durch Neigen des Kopfes nach vorne oder der Seite die Sinus zu entleeren, gelingt nur bei freien Ausführungsgängen. Um diese, wenn sie verengt oder verschlossen sind, zu eröffnen, empfiehlt sich die Nasendouche, so namentlich die forcirte Ausspritzung mittelst Ballon. Michel lässt, nachdem das erste Wasser abgeflossen

ist, mit Daumen und Zeigefinger die Nase schliessen, den Kopf nach vorne beugen und einige Minuten nach abwärts halten.

Hartmann bedient sich zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken zur Austreibung des Eiters und Wegsammachung der verlegten Sinusmündungen der comprimirten Luft in Form der Politzer'schen Luftdouche. Werden die Symptome vorübergehend durch dieselbe gebessert, so sind dieselben nach Hartmann höchst wahrscheinlich durch ein gleichzeitig bestehendes Nasenleiden bedingt, während bei negativem Erfolge dies fraglich erscheint.

Ziem verwirft die Luftdouche von vorne, weil Fäulnisserreger von der Nase in das Mittelohr gelangen und dort deletäre Wirkungen erzeugen könnten. Er erzeugt daher die Luftverdichtung von hinten durch einen hinter das Velum geschobenen gebogenen Katheter, welcher mit einem Treteballon in Verbindung steht, während der Kranke mit dem Finger ein oder beide Nasenlöcher fest verschlossen hält.

Man machte ferner den Vorschlag, durch Einführen von sehr feinen, geknöpften, 11—15 Centim. langen Metall- oder Fischbeinsonden die verlegten Ausführungsgänge der Nebenhöhlen zu eröffnen, und durch passend gekrümmte Röhren direct Medicamente auf die erkrankte Schleimhaut zu bringen. Wenn auch die Ausführbarkeit dieser Manipulation am Lebenden im Allgemeinen nicht im Mindesten bezweifelt werden kann, so ist dieselbe doch wegen der verdeckten und verborgenen Lage und höchst verschiedenen Grösse der Ausführungsgänge äusserst schwierig und nur in relativ wenigen Fällen möglich. Die Sondirung und Drainirung der Kieferhöhle gelingt zuweilen besser durch die accidentelle als durch die im Infundibulum gelegene Oeffnung. Die Sondirung der Stirnhöhle ist, wie auch Jurasz zugesteht, nur in einer relativ geringen Anzahl von Fällen von Erfolg gekrönt, hauptsächlich deshalb, weil das Ostium frontale auf einer Seite zuweilen vollständig fehlt, weil das Lumen eine sehr verschiedene Weite hat, und weil der Canal nicht immer gerade, d. h. in sagittaler Richtung, sondern häufig gekrümmt verläuft. Die Sondirung und Drainirung der Keilbeinhöhle gelang dem Verfasser wiederholt, namentlich wenn die Rima olfactoria weit war, und der oberste Theil des Septum ganz gerade stand; am leichtesten ist sie natürlich dann, wenn bei Defecten oder hochgradigem Schwund der mittleren Muschel oder Verlust des hinteren Theiles des Septums das Ostium gesehen werden kann. Nicht nur gänzlich aussichtslos, sondern auch unnöthig ist die Sondirung der Siebbeinhöhlen.

Die Ausspülung, Drainirung der Nebenhöhlen, früher schon von Kessel empfohlen, wurde in den letzten Jahren hauptsächlich wieder von Jurasz, Hartmann, Störk und Anderen befürwortet. Störk benützt dazu eine in eine kurze feine Röhre endigende Spritze. Handlicher ist eine 15 Centim. lange, 1—1½ Millim. dicke, vorne leicht nach oben abgebogene, hinten trichterförmig endigende und im stumpfen Winkel abgehende Röhre, welche mittelst eines Gummischlauches mit einem Ballon in Verbindung steht, aus dem die zu injicirende Flüssigkeit, meist Sublimat 1‰, 1—5% Carbol-

säure, Borlösung, Kali hypermang. etc. ausgetrieben wird. Wenn es auch sicher ist, dass durch die Ausspülung der Nebenhöhlen Affectionen geheilt werden, welche allen bisher besprochenen Methoden widerstanden, so ist andrerseits nicht in Abrede zu stellen, dass diese Methode sich sehr oft als unausführbar oder unzureichend und langwierig erweist. Michel hat Recht, wenn er zur Ausführung der Drainage à tout prix die Entfernung der mittleren Muschel für nöthig hält; musste doch auch Hartmann in einem Falle mit einer schneidenden Ringzange das vordere Ende der mittleren Muschel reseciren, ehe er sich mit seiner Canule Zugang verschaffen konnte.

Gelingt es mit den bisher beschriebenen Methoden nicht, die in den pneumatischen Räumen angesammelten Secrete zu entfernen, dann muss zur Eröffnung der Nebenhöhlen geschritten werden.

Die Eröffnung der Kieferhöhle findet am unblutigsten von den Alveolen der oberen Backzähne oder von einer etwa bestehenden Fistel aus statt; eine an dieser Stelle angelegte Oeffnung trifft den tiefsten Punkt der Höhle und ermöglicht einen fortwährenden Secretabfluss. Der erste oder zweite Backzahn, wenn nöthig beide, werden extrahirt und durch die Alveolen derselben ein Stilet oder die Spitze einer Scheere unter rotirenden Bewegungen in der Richtung von unten nach oben vorsichtig gegen den inneren Augenwinkel in den Sinus eingeführt; dass man in den Sinus eingedrungen ist, beweist die freie Beweglichkeit des eingeführten Instrumentes und der nachherige Abfluss von Secret. Man hat mit Recht gegen diese Methode eingewendet, dass bei dem Offenerhalten des Canales der abfliessende Eiter ekelerregend sei, dem Patienten den Appetit verderbe, dass das Hineingerathen von infectiösen Stoffen oder Speisetheilen in die Kieferhöhle die Heilung geradezu verhindere, dass das Tragen einer Verschlussvorrichtung sehr lästig sei und das Kauen erschwere. Aus diesem Grunde empfahl neuerdings Mikulicz die Eröffnung der Kieferhöhle von der äusseren Nasenwand aus durch Einbohren eines schneidenden Stilets unterhalb der unteren Muschel; schon früher hatte Schäffer bei den mit Schwund oder Usur der Knochen verbundenen Fällen mit seiner Löffelsonde dieselbe Methode geübt. Krause verwendet dazu theils den Troicar, theils einen mit einer sehr harten Stahlspitze versehenen Katheter à double courant. Wenn auch die hier geschaffene Oeffnung nicht den tiefsten Punkt der Höhle trifft, so liegt sie demselben doch sehr nahe. Trotz der Einwände Störk's, dass man dabei die dickste Wandung der Höhle durchbrechen müsse, was sehr schwierig sei, und dass oft eine eigene Lamelle oberhalb der Alveolen liege, welche den oberen Theil der Kieferhöhle vollständig von dem unteren abschliesse, muss Verfasser mit B. Fränkel und Krause diese Methode doch sehr empfehlen, namentlich wenn der Knochen in der Mitte des unteren Nasenganges, wo er am dünnsten ist, durchstossen wird. Die von Zuckerkandl vorgeschlagene Eröffnung der äusseren Nasenwand hinter und unter dem Infundibulum, da, wo der Sinus von der Nasenhöhle nur durch eine Membran oder ganz dünne Knochenlamelle getrennt ist, hat den Nachtheil, dass die angelegte

Oeffnung sich sehr hoch über dem Boden der Kieferhöhle befindet, wodurch der Abfluss des Secretes erschwert wird. Nach Entfernung der angesammelten Flüssigkeit wird die eröffnete Höhle mit Salicylwasser oder 3—5% Carbolsäure gereinigt; um die kranke Schleimhaut zur Norm zurückzuführen, wird dieselbe nach Einführen eines dicken Kautschuk- oder Bleidrain längere Zeit mit adstringirenden oder desinficirenden Flüssigkeiten, Zink, Tannin, Arg. nitr. oder mit Jodoform in Emulsion oder alkoholischer Jodlösung ausgespritzt. Das vielfach vorgeschlagene Tamponiren der Höhle mit Jodoformgaze muss mit der grössten Aufmerksamkeit und Vorsicht ausgeführt werden, damit nichts in der Höhle zurückbleibe und das Uebel noch mehr verschlimmert werde. Bei Anwesenheit von Geschwülsten in der Highmorshöhle ist die partielle Resection des Oberkiefers von der Fossa canina aus angezeigt.

Die Eröffnung der Stirnhöhle erfordert die Spaltung der Haut über den Augenbrauen bis zur Nasenwurzel und die Beiseiteschiebung des Periostes. Der Knochen wird bei grosser Härte mit Hohlmeissel oder Trepan, bei blasiger Verdünnung der Wände mit der Scheere abgetragen, oder mit einem dicken Troicar durchstossen, die Höhle ausgekratzt, mit Chlorzink geätzt und der Ausführungsgang mit Sonden erweitert; ist der letztere nicht aufzufinden, dann wird ein Troicar in die Nase durchgestossen und eine Drainage eingelegt.

Die Eröffnung der Siebbeinhöhlen ist sehr leicht und geschieht durch Einstossen eines Troicars oder einer starken Injectionsnadel, einer Sonde, oder mittelst Galvanokauter in die Masse der mittleren Muschel oder in den Raum zwischen äusserer Nasenwand und mittlerer Muschel.

Zur Eröffnung der Keilbeinhöhle wird man sich wegen der Unsicherheit der Diagnose nur ausnahmsweise entschliessen; es gibt zwei Wege in dieselbe; der eine führt vom Nasenrachenraum aus durch Eröffnung der unteren Wand in die Höhle, der andere leichtere und ungefährlichere geht durch die Nase. Nach Schäffer, welcher die Operation zuerst am Lebenden ausführte, nachdem Zuckerkandl dieselbe an der Leiche demonstrirt hatte, wird eine Löffelsonde oder ein Stilet neben dem Septum in der Projection der mittleren Muschel gerade nach rückwärts vorgeschoben und dadurch die vordere Wand der Keilbeinhöhle eröffnet; Verfasser möchte rathen, das Instrument etwas nach oben zu richten, da der tiefste Punkt der Keilbeinhöhle in der Regel noch 1—1½ Centimeter höher liegt als der untere Rand der mittleren Muschel.

Litteraturverzeichniss.

Albert. Einige seltenere Erkrankungen der Zunge. Wien. med. Presse Nr. 1—6. 1885.
Arnold. Zwei Osteome der Stirnhöhle. Virchow's Arch. LVII.
Aschenbrandt Th. Ueber den Einfluss der Nerven auf die Secretion der Nasenschleimhaut. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 3. 1885.
— Die Bedeutung der Nase für die Athmung. Würzburg 1886.
Bamberger. Die Krankheiten des chylopoetischen Systems. Erlangen 1864.
Banga. D. Zeitschr. f. Chirurg. IV. S. 486.
Baratoux. Reflexneurosen in Folge von Nasenkrankheiten. Internat. Centralbl. f. Laryng. etc. II. S. 424.
Baumgarten E. Ueber die Ursache der Verbiegungen der Nasenscheidewand. D. med. Wochenschr. Nr. 22. 1886.
Bayer L. Accumulator und Galvanokaustik. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 10. 1883.
— Ueber Knochencysten der Nasenhöhle. Intern. Centralbl. f. Lar. etc. II. S. 237.
Berger u. Tyrman. Die Krankheiten der Keilbeinhöhle und des Siebbeinlabyrinthes und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen des Sehorgans. Wiesbaden 1886.
Bergeron. Union medicale Nr. 54. 1859.
Bernhardt. Ueber idiopathischen Zungenkrampf. Centralbl. f. Nervenheilk. Nr. 11. 1886.
Beschorner. Ueber Heufieber und dessen Behandlung. Jahresber. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilkunde. Dresden 1886.
— Tonsillotomie und Blutungen. Debatte. Jahresber. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. Dresden 1883—1884.
Bezold. Zur operativen Behandlung der adenoiden Vegetationen des Nasenrachenraums. Aerztl. Intell.-Blatt Nr. 14. 1881.
Billroth. Ueber den Bau der Schleimpolypen. Berlin 1855.
Blackley. Hay-fever, its causes, treatment and effectiv prevention. 1873.
Bockhart. Zur Aetiologie und Behandlung der ulcerösen Mercurialstomatitis. Monatsh. f. prakt. Dermat. Nr. 8. 1885.
Böcker. Narbige Verwachsung des einen Nasenloches. D. med. Woch. Nr. 46. 1884.
— Die Beziehungen der erkrankten Schleimhaut der Nase zum Asthma und deren Behandlung. Ibidem Nr. 26 u. 27. 1886.
Bohn H. Die Mundkrankheiten. Gerhardt's Handb. d. Kinderkrankh. IV. 2. 1880.
Bokai. Neuere Mittheilungen über Retropharyngealabscess und retroph. Lymphdrüsenentzündungen. Jahrbücher f. Kinderheilk. XVII.
Bollinger O. Ziemssen's Handb. d. spec. Pathol. u. Ther. III.
Bornhaupt. Arch. f. klin. Chirurg. XXVI. S. 589.
Bournonville. Ein Fall von Coryza caseosa. Centralbl. f. Chirurg. Nr. 16. 1885.
Braune und Clasen. Die Nebenhöhlen der menschlichen Nase in ihrer Bedeutung für den Mechanismus d. Riechens. Zeitschr. f. Anat. u. Entwickl. II. 1 u. 2. 1876.

Bresgen M. Der chronische Nasen- und Rachenkatarrh. 2. Auflage. Wien 1883.
— Grundzüge einer Pathologie und Therapie der Nasen-, Mundrachen- und Kehlkopfkrankheiten. Wien u. Leipzig 1884.
Bride Mc. Internat. Centralbl. f. Laryng. etc. IV. S. 85.
Bryson Delavan. Arch. of Laryngol. III. 8. 1882.
Bumm E. Ueber Parotitis nach Ovariotomie. München. med. Woch. Nr. 10. 1887.
Burow. Uebertragung der Syphilis durch den Tubenkatheter. Monatschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 5. 1885.
Butlin H. Krankheiten der Zunge. Deutsch bearbeitet und herausgegeben von Jul. Beregszászy. Wien 1887.
Cahn. Ueber Gaumengeschwüre bei Typhus abdominalis. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 14. 1886.
Caspary. Ueber flüchtige gutartige Plaques der Zungenschleimhaut. Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. VII.
Chiari. Ueber retropharyngeale Strumen. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 11. 1881.
Chiari und Roth. Das Rhinosclerom der Schleimhaut. Zeitschr. f. Heilkunde VI. 4 u. 5.
Concato-Bufalini. L'eterizzazione nelle angine. Rivista clin. di Bologna III.
Cozzolino. Coryza caseosa. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. I. 1.
Czernicki. Referat in Schmidt's Jahrb., Bd. 162. S. 284.
Damaschino. Muguet pharyngien. Revue médicale Nr. 48. 1882.
Demme A. Zur diagnostischen Bedeutung der Tuberkelbacillen im Kindesalter. Berl. klin. Woch. Nr. 15. 1883.
Dessois. De la langue noire. Gaz. des hôpit. Nr. 28. 1879.
Dogiel. Ueber die Drüsen der Regio olfactoria. Arch. f. mikrosk. Anat. XXIV. 1. 1885.
Doutrelepont. Zur Therapie des Rhinoscleroms. D. med. Woch. Nr. 5. 1887.
Eberth. Zur Kenntniss der mykotischen Processe. D. Arch. f. klin. Med. XXVIII.
Ehrendorffer. Geheiltes plexiformes Sarcom der hinteren Pharynxwand. Arch. f. klin. Chirurg. XXVI.
Emmerich R. Ueber die Ursachen der Diphtherie des Menschen und der Taube. D. med. Woch. Nr. 38. 1884.
Epstein. Ueber Epithelperlen in der Mundhöhle neugeborener Kinder. Zeitschr. f. Heilk. I. 1880.
Erlenmayer. Die Principien der Epilepsiebehandlung. 1886.
— Zungenkrampf. Centralbl. f. Nervenkr. IX. 5. 1886.
Fischer H. Wässerige Ausscheidungen aus einer Nasenöffnung. D. Zeitschr. f. Chirurg. XII. 4 u. 5.
Fischer H. Ueber das Vorkommen von Sarcine in Mund und Lungen. D. Arch. f. klin. Medic. XXXVI.
Fischer L. Syphilitische Nekrose des Atlas, Heilung. D. Zeitschr. f. Chirurg XXII. 3.
Fischl. Zur Kenntniss der Nierenaffection bei Diphtherie. Zeitschr. f. klin. Medic. VII.
Fränkel B. Allgemeine Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Nase, des Nasenrachenraums, des Rachens und Kehlkopfes. Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. IV. 1.
— Die Krankheiten der Nase. Ibidem.
— Schlundkopf. Eulenburg's Realencyklop. XII. 1882.
— Ueber die Miliartuberculose des Pharynx. Berl. klin. Woch. Nr. 46 u. 47. 1876.
— Gutartige Mykosis des Pharynx. Berl. klin. Woch. 1873.
— Ueber adenoide Vegetationen. D. med. Woch. Nr. 41. 1884.
— Ueber das Empyem der Oberkieferhöhle. Berl. klin. Woch. Nr. 16. 1887.
— Ueber Angina lacunaris. Berl. klin. Woch. Nr. 17 u. 18. 1886.
Fränkel Eugen. Ueber Abdominaltyphus. D. med. Woch. Nr. 6. 1887.
— Ueber einen Fall von Mykosis tonsillaris et linguae benigna. Zeitschr. f. klin. Medic. IV.
— Zur Diagnostik und Therapie gewisser Erkrankungen der mittleren und unteren Nasenmuscheln. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 242. 1884.
Freudenberg. Ueber Soor beim gesunden Erwachsenen. Centralbl. f. klin. Medic. Nr. 48. 1886.

Friedreich. Der acute Milztumor und seine Beziehungen zu acuten Infectionskrankheiten. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 75. 1874.
— Beiträge zur Kenntniss der Sputa. Virch. Arch. XXX.
Frisch. Zur Aetiologie des Rhinoscleroms. Wien. med. Woch. Nr. 32. 1882.
Fronstein. Ein Fall von circumscriptem Oedem der Nasenschleimhaut. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. II. S. 420.
Gautier. De la desquamation de la langue. Génève 1882.
Geber. Ueber das Wesen des Rhinoscleroms. Arch. f. Dermat. u. Syph. IV.
Gerhardt. Zur Naturgeschichte der acuten Infectionskrankheiten. D. Arch. f. klin. Medic. XIV.
— Ueber Diphtherie. Verhandl. des II. medic. Congr. zu Wiesbaden 1883.
— Ueber Rothlauf des Rachens. Charité-Annalen XII.
Glasmacher. Knochenblasenbildung in der Nase. Berl. klin. Woch. Nr. 36. 1884.
Gottstein. Nasenkrankheiten. Eulenburg's Realencyclop. IX.
— Ueber die verschiedenen Formen der Rhinitis und deren Behandlung vermittelst der Tamponade. Berl. klin. Woch. Nr. 4. 1884.
— Zur Operation der adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum. Jbid. Nr. 2. 1886.
Gruber W. Ueber abnorm lange Proc. styloideus des Schläfenbeins. Virch. Arch. L.
Güterbock. Ueber Hemiglossitis. D. Zeitschr. f. Chirurg. XXII u. XXIII.
Habermann. Zur pathologischen Anatomie der Ozaena simplex. Zeitschr. f. Heilkunde. VII.
Hack. Ueber neuralgische Begleiterscheinungen bei Pharynxkrankheiten. D. med. Woch. Nr. 42. 1883.
— Reflexneurosen u. Nasenleiden. Berl. klin. Woch. Nr. 25. 1882.
— Ueber eine operative Radicalbehandlung bestimmter Formen von Migräne, Asthma, Heufieber, sowie zahlreicher verwandter Erscheinungen. Wiesbaden 1884.
— Ueber Catarrhus autumnalis und Heufieber. D. med. Woch. Nr. 9. 1886.
Hacker. Actinomykose der Zunge. Anzeiger d. Gesellsch. d. Aerzte Nr. 27. 1885.
Hallopeau. Herpes labialis, Gangrène etc. Revue méd. Nr. 8. 1882.
Hartmann A. Ueber die Operation der adenoiden Wucherungen und hypertrophischen Pharynxtonsillen. D. med. Woch. Nr. 35. 1885.
— Ueber Croup der Nasenschleimhaut (Rhinitis fibrinosa) D. med. Woch. Nr. 29. 1887.
— Ueber das Empyem der Stirnhöhlen. D. Arch. f. klin. Medic. XX.
— Supraorbitalneuralgie, hervorgerufen durch Empyem der Nebenhöhlen der Nase in Folge von Behinderung des Secretabflusses aus dem mittleren Nasengang. Berl. klin. Woch. Nr. 48. 1882.
— Abscessbildung in der Orbita durch acuten Schnupfen, mit Bemerkungen über die Behandlung fötider Blennorrhoe der Nase. Berl. klin. Woch. Nr. 21. 1884.
— Partielle Resection der Nasenscheidewand bei hochgradiger Verkrümmung. D. med. Woch. Nr. 51. 1882.
Hedinger. Die Galvanokaustik seit Middeldorpf. 1878.
— Die adenoiden Vegetationen. Württemb. Corresp.-Blatt. Nr. 34. 1885.
Henoch. Fall von acuter Anschwellung des Bodens der Mundhöhle. Charité-Annalen VI.
— Vorlesungen über Kinderkrankheiten. II. Auflage 1883.
— Mittheilungen aus den Diphtheritis-Epidemien der Jahre 1882 und 1883. Charité-Annalen X.
Hering. De la pharyngite chronique en general et de la pharyngite latérale en particulier. Revue mens. de laryng. 1882.
— Ueber Pharynxmykosis leptothricia. Zeitschr. f. klin. Medic. VII.
— Des névroses réflexes determinées par les affections nasales. Annales des malad. de l'oreille etc. Février 1886.
Herzog J. Der acute und chronische Nasenkatarrh mit besonderer Berücksichtigung des nervösen Schnupfens. 2. Auflage. Graz 1886.
— Ueber Herpes des Rachens. Pester med.-chir. Presse Nr. 18, 19. 1880.
Herzog Carl in Bayern. Beitrag zur Casuistik der Orbitaltumoren. Annalen des städt. Krankenhauses zu München. 1886.
Heubner. Die experimentelle Diphtherie. Leipzig 1883.
— Ueber Scharlachdiphtherie. Referat aus d. med. Gesellsch. Leipzig, 26. Jan. 1886.

Heymann. Ueber pathologische Zustände, die von der Nase ihre Entstehung finden können. Deutsche Medicinalzeit. Nr. 66. 1886.
Hoefler. Balneologische Studien aus dem Bade Krankenheil-Tölz. München 1886.
Hoffmann. Citirt von Liebermeister: Typhus; Ziemssen's Handbuch d. spec. Path. u. Ther. II. 1.
Homolle. Des scrofulides graves primitives de la gorge. Paris 1876.
Hopmann. Zur Nomenclatur der Nasenschleimhautgeschwülste. Wien. med. Presse Nr. 39. 1888.
— Ueber Nasenpolypen. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 6 u. 8. 1885 u. Nr. 6—9. 1887.
Hoppe. Rachenkatarrh mit stinkendem Geruch. Memorabil. I. Nr. 6. 1881.
Jacobson. Algosis faucium leptothricia. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. II. 4. 1886.
Joseph. Beitrag zur Therapie der Leukoplakie. D. med. Wochenschr. Nr. 43. 1885.
Johnston. Arch. of Laryngol. III. 9.
Ipscher. Noch ein Fall von Sialodochitis fibrinosa. Berl. klin. Woch. Nr. 36. 1879.
Isambert. Conférences cliniques sur les maladies du larynx. Paris, Masson. 1877.
Israel. Klinische Beiträge zur Kenntniss der Actinomykose des Menschen. 1885.
Jurasz. Casuistische Beiträge zur Lehre von den Anomalien der Gaumentonsillen. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 12. 1885.
— Ueber die Sensibilitätsneurosen des Rachens und des Kehlkopfes. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 195. 1881.
— Ueber die Behandlung hochgradiger Verkrümmungen der Nasenscheidewand. Berl. klin. Woch. Nr. 4. 1882.
— Seröse Perichondritis der Nasenscheidewand. D. med. Woch. Nr. 50. 1884.
— Ueber die Sondirung der Stirnbeinhöhle. Berl. klin. Woch. Nr. 3. 1887.
Justi. Ueber adenoide Neubildungen im Nasenrachenraum. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 125. 1878.
Kaposi. Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten. 1883.
— Glossodynia exfoliativa. Wien. med. Presse. Nr. 12—18. 1885.
Kapper. Ein Fall von acuter Actinomykose. Wien. med. Presse. Nr. 3. 1887.
Kaufmann. Die Struma retrooesophagea. D. Zeitschr. f. Chirurg. XVIII. 3 u. 4.
Keimer. Ein Fall von Angioma varicosum des Gaumensegels, der linken Mandelgegend und des vorderen Gaumenbogens, geheilt durch Elektropunctur. D. med. Woch. Nr. 33. 1887.
Kessel. Wien. med. Presse. Nr. 51. 1878.
Kiesselbach. Eczema introitus narium. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 2. 1885.
Kipp. Zwei Fälle von gänzlichem Verlust des Gehörs auf einem Ohre in Folge von Mumps. Zeitschr. f. Ohrenh. XIV.
Knapp. Ein Fall von Elfenbeinexostose der Siebbeinzellen. Zeitschr. f. Ohrenh. XIII. 4.
König. Lehrbuch der speciellen Chirurgie. 1885.
König Emil. Ueber Empyem und Hydrops der Stirnhöhle. Dissertation. Bern 1882.
Kohts. Die Krankheiten des Rachens. Gerhardt's Handb. d. Kinderkrankh. IV. 2. 1880.
Krause. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 15. 1887.
Krieg. Resection der Cartilago quadrangularis septi narium zur Heilung der Skoliosis septi. Med. Corresp.-Blatt d. Württemb. ärztl. Landesver. Nr. 26, 27. 1886.
Kussmaul. Berl. klin. Woch. Nr. 13. 1879.
Lange V. Die adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum nebst einer neuen Operationsmethode. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 2. 1880 und Nr. 2. 1882.
— Zur Frage nach den adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum. D. med. Woch. Nr. 51. 1883.
— Aus meinem Instrumentarium. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 11. 1885.
— Ueber Aluminium acetico-tartaric. etc. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 10. 1885.
— Zur Operation der Choanalpolypen. D. med. Woch. Nr. 11. 1887.
Lannois u. Lemoine. Des manifestations méningitiques et cerébrales des oreillons. Arch. de Neurol. XI. 31. 1886.
Lediard. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. III. 8. S. 287.
Lefferts. Chronic Nasal Catarrh. The med. News. 1884.
Lehmann. Experimentelle Studien über den Einfluss technisch und hygienisch wichtiger Gase und Dämpfe auf den Organismus. München, Oldenbourg, 1886.

Leichtenstern. Balneotherapie. Ziemssen's Handb. d. allg. Therapie. II. 1. 1880.
Leyden. Ueber die Herzaffectionen bei Diphtherie. Zeitschr. f. klin. Med. IV.
Löffler. Verhandl. d. Congr. f. innere Medic. zu Wiesbaden 1883 u. 1884.
Löri. Die durch anderweitige Erkrankungen bedingten Veränderungen des Rachens, Kehlkopfes und der Luftröhre. Stuttgart 1885.
Löwenberg. Les tumeurs adenoides du pharynx nasal, leur influence sur l'audition, la respiration et la phonation, leur traitement. Paris 1879.
— Natur und Behandlung der Ozaena. D. med. Woch. Nr. 1 u. 2. 1885.
Loewy. Ueber Verkrümmungen der Nasenscheidewand. Berl. klin. Woch. Nr. 47. 1886.
Lublinski. Ueber syphilitische Pharynxstricturen. Berl. klin. Woch. Nr. 24. 1883.
Lücke. Praktische Bedeutung des abnorm langen und verbogenen Proc. styloid. des Schläfenbeins. Virch. Arch. LI.
Lühe. Eine Parotitis-Epidemie. Berl. klin. Woch. Nr. 40. 1879.
Luschka. Ueber Papillargeschwülste des Schlundkopfes. Virch. Arch. L.
Mackenzie John. A contribution of the study of Coryza vasomotoria periodica or socalled Hay fever. New-York. Med. Record. 19. Juli 1884.
Mackenzie Morell. Die Krankheiten des Halses und der Nase. Deutsch von Felix Semon. 2 Bände. 1880 u. 1884.
Magnussen L. Beitrag zur Diagnostik und Casuistik der Actinomykose. Kiel 1885.
Meyer Wilh. Ueber adenoide Vegetationen in der Rachenhöhle. Arch. f. Ohrenheilk. 1873 u. 1874.
Michael. Doppelmeissel zur Behandlung adenoider Vegetationen des Nasenrachenraumes. Berl. klin. Woch. Nr. 5. 1885.
— Adenoide Vegetationen des Nasenrachenraumes. Wiener Klinik. 1885.
Michel C. Die Krankheiten der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes. 1876.
— Zur Behandlung der Krankheiten der Mundrachenhöhle und des Kehlkopfes. 1880.
— Ueber elektrolytische Behandlung der fibrösen und gefässreichen Nasenrachenpolypen. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 5. 1887.
Mikulicz. Ueber das Rhinosclerom. Arch. f. klin. Chir. XX.
— Zur operativen Behandlung des Empyems der Highmorshöhle. Zeitschr. f. Heilkunde. VII. 4. 1886.
Miller. Ueber Gährungsvorgänge im Verdauungstractus, und die dabei betheiligten Pilze. D. med. Woch. Nr. 49. 1885.
Moldenhauer. Das sogenannte Ekzem des Naseneinganges. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 5. 1885.
— Die Krankheiten der Nasenhöhlen, ihrer Nebenhöhlen und des Nasenrachenraumes. 1886.
Monti. Ueber Croup und Diphtherie im Kindesalter. 2. Auflage. 1884.
Moure. Manuel pratique des maladies des fosses nasales et de la cavité nasopharyngienne. Paris 1886.
Müller. Ein Fall von Lepra. D. Arch. f. klin. Med. XXXIV.
Nedopil. Ueber Psoriasis der Zungen- und Mundschleimhaut. Arch. f. klin. Chir. XX.
— Ueber tuberculöse Erkrankungen der Zunge. Wiener Klinik Nr. 9. 1881.
Neumann. Ueber die Entstehung der Ranula aus den Bochdalek'schen Drüsenschläuchen der Zungenwurzel. Arch. f. klin. Chir. XXXIII. 3.
Otto. Casuistischer Beitrag zur Erweiterung der Stirnhöhle durch Eiteransammlung, zugleich ein Beitrag zur centralen Galvanisation bei centraler Lähmung. D. Arch. f. klin. Med. XI.
Partsch. Einige neue Fälle von Actinomykose des Menschen. D. Zeitschr. f. Chir. XXIII. 5 u. 6.
Paulsen E. Experimentelle Untersuchungen über die Strömungen der Luft in der Nasenhöhle. Sitz.-Ber. d. Wien. Akad. Band 85. III. 1882.
— Zur acuten Entzündung des Nasenrachenraumes. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 7. 1887.
— Ueber die Drüsen der Nasenschleimhaut, besonders die Bowman'schen Drüsen. Arch. f. mikr. Anat. XXVI.
Pauly. Berl. klin. Woch. Nr. 22. 1877.
Penzoldt. Allgem. medic. Central-Ztg. Nr. 78. 1878 und Correspond.-Blatt d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen Nr. 9. 1878.

Petersen. Ueber die subperichondrale Resection der knorpeligen Nasenscheidewand. Berl. klin. Woch. Nr. 22. 1885.
Pitha. Angina nosocomialis phagedanica. Prag. Vierteljahrschr. II. 1857.
Preuschen von. Ueber Entzündung der Ohrspeicheldrüse nach Ovariotomie. D. med. Woch. Nr. 51. 1885.
Quincke. Ueber acutes umschriebenes Hautödem. Monatsh. f. prakt. Dermat. 1882.
Raynaud. Gazette hebdom. 2 Avril 1869.
Recklinghausen. Ueber die Ranula, die Cyste der Bartholinischen Drüse und die Flimmercyste der Leber. Virch. Arch. LXXXIV. 3.
Ried. Jenaische Zeitschr. f. Medic. I. 1864.
Riedel. Klinische Studien und Erfahrungen aus der chir. Klinik zu Göttingen. D. Zeitschr. f. Chir. X.
Rizet. Schmidt's Jahrb. Band 162. S. 260.
Roser. Zwei Fälle von acuter Actinomykose. D. med. Woch. Nr. 22. 1886.
— Die Ludwig'sche Angina. D. med. Woch. Nr. 11. 1883.
Rossbach. Ueber ein merkwürdiges vasomotorisches Verhalten der Halsschleimhäute. Berl. klin. Woch. Nr. 36. 1882.
Roth, Fr. Ueber die Incubation und Uebertragbarkeit der Parotitis epidemica. Münchn. med. Woch. Nr. 20. 1886.
Roth, W. Die chronische Rachenentzündung. Wien 1883.
— Ueber haarförmige Bildungen an der Zunge. Wien. med. Presse Nr. 26, 27. 1887.
Rouge. L'Union. 1872.
Rückert. Der Pharynx als Sprach- und Schluckapparat. München 1882.
Rüdinger. Beitrag zur Morphologie des weichen Gaumens und des Verdauungsapparates. Stuttgart 1879.
Rühle. Ueber Pharynxkrankheiten. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 6. 1870.
Saalfeld. Ueber die sogenannte Pharyngitis granulosa. Virch. Arch. LXXXII.
Sänger u. Schuster. Beiträge zur Pathologie und Therapie der Nasensyphilis. Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. 1877 u. 1878.
Salzer. Zur Casuistik der Geschwülste am Kopfe. Arch. f. klin. Chir. XXXIII.
Schadewaldt. Die Trigeminusneurosen. D. med. Woch. Nr. 37, 38. 1885.
Schäfer. Ein Fall von ulceröser Entzündung im Bereiche der rechten Siebbeinhälfte mit letalem Ausgang. Prag. med. Woch. Nr. 20. 1883.
Schäffer, M. Chirurgische Erfahrungen in der Rhinologie und Laryngologie. Wiesbaden 1885.
— Asthma und seine Behandlung. D. med. Woch. Nr. 32, 33. 1879.
— Nasenleiden und Reflexneurosen. D. med. Woch. Nr. 23, 24. 1884.
— Aluminium acetico-tartaricum. D. med. Woch. Nr. 20. 1885.
Schaus. Ueber Schiefstand der Nasenscheidewand. Arch. f. klin. Chir. XXXV. 1.
Schech, Ph. Ueber Leukoplakia oris. Aerztl. Intell.-Bl. Nr. 40, 41. 1885.
— Die schwarze Zunge. Münchn. med. Woch. Nr. 13. 1887.
— Die Galvanokaustik in der Laryngochirurgie. Aerztliches Intelligenz-Blatt Nr. 43, 44. 1877.
— Ueber Stenosirungen des Pharynx in Folge von Syphilis. D. Arch. f. klin. Med. XVII.
— Klonische Krämpfe des weichen Gaumens mit objectivem Ohrgeräusch in Folge nasaler Trigeminusneuralgie. Münch. med. Woch. Nr. 22. 1886.
— Die sogenannten Reflexneurosen und ihre Beziehungen zu den Krankheiten der Nase. Aerztl. Intell.-Bl. Nr. 30. 1884.
— Ueber Asthma. Münchn. med. Woch. Nr. 40, 41. 1887.
— Die Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase. München 1883.
Schindler. Fall von Rundzellensarcom im Munde bei einem Kinde mit Erfolg operirt. Monatschr. f. Ohrenh. Nr. 4. 1885.
Schmidt, M. Ueber Pharyngitis lateralis. D. Arch. f. klin. Med. XXVI.
— Ueber die Behandlung von parenchymatösen Kröpfen. D. med. Woch. Nr. 8. 1884.
Schmiegelow. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. II. S. 46.
Schmithuisen. Intern. Centralbl. f. Lar. etc. II. S. 315.
Schrötter, L. Ueber membranförmige Narben im oberen Pharynxraume. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 8. 1882.

Schrötter, L. Ueber angeborenen knöchernen Verschluss der Choanen. Monatsschrift für Ohrenh. etc. Nr. 4. 1885.
— Beitrag zur Behandlung der Larynxstenosen. Wien 1876.
Schubert, P. Zur Casuistik der Aspergillusmykosen. D. Arch. f. klin. Med. XXXVI.
Schuchardt, K. Beiträge zur Entstehung der Carcinome aus chronisch-entzündlichen Zuständen der Schleimhäute und Hautdecken. Volkm. Samml. klin. Vortr. Nr. 257. 1885.
Schuchhardt. Ein behaarter Rachenpolyp. Centralbl. f. Chir. Nr. 41. 1884.
Schumacher. Ueber localisirte Hydrargyrose und ihre laryngoskopische Diagnose. Verhandl. d. Congr. f. inn. Med. zu Wiesbaden 1886.
Schwimmer. Die idiopathischen Schleimhautplaques der Mundhöhle. Vierteljahr. f. Dermat. u. Syph. IV.
— Beitrag zur Glossopathologie. Wien. med. Woch. Nr. 8. 1886.
Seifert, O. Klonische Krämpfe des weichen Gaumens mit objectivem Ohrgeräusch in Folge von chron. Rhinitis. Inter. klin. Rundschau Nr. 29. 1887.
— Ueber Influenza. Volkm. Samml. klin. Vortr. Nr. 240. 1884.
— Ueber Croup der Nasenschleimhaut. Münch. med. Woch. Nr. 38. 1887.
Seitz. Diphtherie und Croup. II. Aufl. Berlin 1879.
Sell. Fälle von Lingua nigra. Intern. Centralbl. f. Lar. etc. II. S. 112.
Semon, F. Die Krankheiten des Halses und der Nase v. M. Mackenzie. 1880. 1884.
— The throat departement of St. Thomas Hospital in 1882.
— Elektrische Erleuchtung verschiedener Höhlen des menschlichen Körpers etc. Intern. Centralbl. f. Lar. etc. I. S. 341, 342.
Sidlo. Blasen und Emphysembildung am weichen Gaumen. Wien. med. Presse Nr. 23. 1877.
Simon, E. Schmidt's Jahrb. Band 107. S. 161.
Soltmann. Jahrbücher f. Kinderheilk. XII.
Sommerbrodt, J. Ueber im Pharynx localisirte Hydrargyrose. Berl. klin. Woch. Nr. 47. 1886.
— Ueber eine Papillargeschwulst im Pharynx. Virch. Arch. LI.
Sonnenburg. Arch. f. klin. Chir. XXIX. Heft 3.
Steinbrügge. Zeitschr. f. Ohrenheilk. VIII.
Steiner. Ueber die Entwicklung der Stirnhöhlen und deren krankhafte Erweiterung durch Ansammlung von Flüssigkeit. Arch. f. klin. Chir. XIII. 1.
Stöhr, Ph. Ueber Mandeln und Balgdrüsen. Virch. Arch. Bd. 97. 2.
Störk. Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase und des Rachens. 1880.
— 3 Fälle von Haematoma retropharyngeale. Wien. med. Woch. Nr. 46. 1878.
— Ueber die Localbehandlung des Empyems der Highmorshöhle. Wien. med. Woch. Nr. 43. 1886.
Strassmann. Ueber Tuberkulose der Tonsillen. Virch. Arch. LXXXXVI.
Strübing. Ueber acutes angioneurotisches Oedem. Zeitschr. f. klin. Medic. IX.
Strümpell. Lehrbuch der spec. Pathol. u. Therapie. II. Aufl. 1885.
Swain. Die Balgdrüsen am Zungengrunde und deren Hypertrophie. D. Arch. f. klin. Med. XXXIX. 5 u. 6.
Taylor. Lancet. II. 1876, p. 685.
Thiery. Beobachtungen an einem Zungenlosen. Arch. f. klin. Chir. XXXII.
Tillmanns. Ueber todte Osteome der Nasen- und Stirnhöhle. Arch. f. klin. Chir. XXXII. 3.
Tornwaldt. Ueber die Bedeutung der Bursa pharyngea. Wiesbaden 1885.
— Ein Fall von Tuberkulose der Nasenschleimhaut. D. Arch. f. klin. Med. XXVII.
Touton. Casuistisches zum Lichen ruber planus der Haut und Schleimhaut. Berl. klin. Woch. Nr. 23. 1886.
Trautmann. Anatomische, pathologische und klinische Studien über Hyperplasie der Rachentonsille. Berlin 1886.
Unna. Ueber die normale Zungenoberfläche und den normalen Zungenbelag. Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. VIII.
— Ueber kreisfleckige Exfoliation der Hohlhand und der Zunge. Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. VIII.
Unruh. Ein Beitrag zur Pathologie der Diphtherie. Jahrb. f. Kinderheilk. XVII.

Vogel, A. Krankheiten der Lippen und der Mundhöhle. Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. VII. 1.
Volkmann. Einige Fälle von Cheilitis glandularis. Virch. Arch. L.
— Ueber den Charakter und die Bedeutung der fungösen Gelenkentzündungen. Volkm. Samml. klin. Vortr. Nr. 168 u. 169, S. 31.
Voltolini. Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes etc. II. Aufl. 1872.
— Die Pharyngoskopie und Rhinoskopie. II. Aufl. 1879.
— Ueber elektrolytische Operation mit Demonstration von Instrumenten. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 10. 1886.
Wagner, E. Krankheiten des weichen Gaumens. Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. VII. 1.
— Die Erkrankungen des weichen Gaumens im Abdominaltyphus. D. Arch. f. klin. Med. XXXVII.
Waldeyer-Bickel. Der lymphatische Apparat d. Pharynx. D. med. Woch. Nr. 20. 1884.
Weber, Otto. Pitha's u. Billroth's Handb. d. allg. u. spec. Chirurgie. III. 1.
Weichselbaum. Die phlegmonöse Entzündung der Nebenhöhlen der Nase. Wien. medic. Jahrb. 1881.
— Tuberkulose der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Allg. Wien. med. Zeitung. Nr. 27, 28. 1881.
Weinlechner. Abnorm langer Proc. styloid. als Ursache von Schlingbeschwerden. Wien. med. Woch. Nr. 5. 1882.
Welcker. Die Asymmetrien der Nase und des Nasenskeletes. Stuttgart 1882.
Wendt, E. Die Krankheiten der Nasenrachenhöhle und des Rachens. Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. VII. 1.
Wernher. Ueber die Auftreibung des Sinus maxillaris durch Flüssigkeiten besonders durch Schleimcysten. Arch. f. klin. Chir. XIX. 4.
Wertheimber. Die Schlunddiphtherie. München 1871.
Wille. Der Trigeminushusten. D. med. Woch. Nr. 16, 17. 1885.
Winternitz. Hydrotherapie. Ziemssen's Handb. d. allgem. Therapie II. 3.
Wyman. Autumnal catarrh. New-York 1872.
Zaufal. Ueber die Untersuchung des Nasenrachenraums von der Nase aus, insbesondere mit trichterförmigen Spiegeln. Arch. f. Ohrenheilk. XII.
— Die normalen Bewegungen der Rachenmündung der Eustachischen Röhre. Arch. f. Ohrenheilk. IX, X.
— Die Plica salpingopharyngea. Arch. f. Ohrenh. XV.
— Ueber die allgemeine Verwendbarkeit der kalten Drahtschlinge zur Operation der Nasenpolypen. Prag 1878.
Zeissl. Lehrbuch der Syphilis. 4. Aufl. 1882.
— Eine noch nicht beschriebene Geschwulst der Sublingualdrüse. Wien. med. Jahrb. 1881.
Zenker, W. Eine Mittheilung über die Percussion der Stirnhöhlen. Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie. XXVII.
Ziem. Ueber Asymmetrie des Schädels bei Nasenkrankheiten. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 2–5. 1883.
— Ueber partielle und totale Verlegung der Nase. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 1–4. 1879.
— Ueber Nasenblennorrhoe bei Neugebornen. Allg. med. Centralztg. Nr. 101. 1885.
— Ueber Blennorrhoe der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 4. 1880.
— Delirium und vorübergehendes Irresein nach Operationen in der Nase. Monatschr. f. Ohrenh. Nr. 9. 1885.
Ziemssen, v. Ueber diphtheritische Lähmungen und deren Behandlung. Klin. Vortr. IV. Nervensystem. 1887.
Zuckerkandl, E. Normale und pathologische Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhänge. Wien 1882.
— Otto. Zur Frage der Blutung nach Tonsillotomie. Intern. klin. Rundschau Nr. 35. 1887.

Sachregister.

Acne vibrissarum 244.
Accumulatoren 100.
Actinomykosis 53.
Adenoides Gewebe 84; Wucherungen des — 116.
Ageusia 59.
Algosis faucium 188.
Allotriogeusia 60.
Allotrioosmie 279.
Alpdrücken 233, 286.
Aluminium acetico-tartaricum 218, 240, 241.
Anaesthesie der Mundhöhle 58; des Rachens 198; der Nase 275; — dolorosa 198; — gustatoria 59.
Anatomie der Mundhöhle 1; des Rachens 83; der Nase 207; der Speicheldrüsen 65; der Nebenhöhlen 293.
Angina arthritica 107; catarrhalis acuta 106; couenneuse 151; diphtheritica 155; — erysipelatosa 143; follicularis 108; hämorrhagica 113; herpetica 151; kachectica 113; lacunaris 108; Ludovici 76; nosocomialis phagedaenica 177; pultacée 113; scorbutica 113; syphilitica 178; tonsillaris 108; toxica 107; typhosa 113; ulcerosa 113; vasomotoria 201.
Angioneurosen 61, 201, 282, 283, 284.
Anomalien der Mundhöhle 7; des Rachens 100; der Nase 220; der Nebenhöhlen 295.
Anosmie 277.
Aphthen 25; Bednar'sche 33.
Aspergillus in Rachen und Nase 189, 259.
Asthma 133, 270, 285.

Ballonspray 96, 217.
Batterie galvanokaustische 99.
Bauernwetzel 70.
Bepinselungen der Mundhöhle 6; des Rachens 96; — der Nase 219.
Blennorrhoea acuta der Nase 289; — chronica 237; Störk'sche 236; — der Nebenhöhlen 298, 301, 304, 306.
Blutungen der Mundhöhle 54; des Rachens 189; — nach Tonsillotomie 141; der Nase 233, 260; des Sinus frontalis 302.
Bougies medicamentöse 219, 234.
Bursa pharyngea 84, 91; Catarrh der 115; Cysten 116, 194.

Catarrhus autumnalis 284, 285.
Cauterisation der Mundhöhle 6; des Rachens 97; der Nase 219.
Cheilitis glandularis 20.
Choanen-Verschluss 102; — Zunge 124.
Chromsäure 6, 97, 219.
Cocain 6, 68, 69, 89, 97, 147, 219, 289.
Concretionen der Speicheldrüsen 80; der Mandeln 193; — der Nase 265.
Coryza acute 225; caseosa 236; vasomotoria sive symphathetica 284; — professionelle 226; — syphilitica 247.
Coryzarien 219.
Cynanche cellularis maligna 76; — contagiosa 154.
Cysticercus — der Zunge 53.

Defecte siehe Perforationen.
Dentitionsgeschwür 32.
Diphtherie der Mundhöhle 36; des Rachens 155; der Nase 160, 246; der Nebenhöhlen 300; des Kehlkopfes, Trachea und Bronchien 160; der Haut 163; der Sexualorgane 162; der Wundränder 167; croupöse 157; gangränöse 164; septische 163, 165; Nachkrankheiten und Complicationen — 165.
Dysphagia hysterica 201.

Ecchinococcus — 53.
Ecraseur für die Nase 271.
Eczem des Naseneingangs 243.
Einreibungen medicamentöse 7, 95.
Elektricität 7, 95, 220.
Elektrolyse 100, 195, 275.
Emphysem des Rachens 195.
Empyem des Sinus ethmoidalis 306; — frontalis 302; maxillaris 299; sphenoidalis 305.

*

Ephidrosis parotidea 74.
Epilepsie bei Nasenkrankheiten 286.
Epithelialabschilferungen der Zunge 34.
Epithelperlen 33.
Erosionen hämorrhagische 25.
Erysipel der Mundhöhle 24; des Rachens 143; der Nase 242.
Excoriationen oberflächliche der Zunge 34; der Nase 227, 232, 244.
Exfoliation kreisfleckige 34.

Follikularverschwärungen des Gaumens 33; der Tonsillen 108.
Formfehler der Mundhöhle 7; des Rachens 100; der Nase 220.
Fremdkörper der Speicheldrüsen 80; des Rachens 191; der Nase 264.
Fröschleingeschwulst 57.
Frühsommerkatarrh siehe Heufieber.

Galvanokaustik Instrumentarium 98, 99; im Rachen 97, 139; in der Nase 219, 225, 235.
Gangraen der Mundhöhle 37; des Rachens 176; der Nase 247.
Gaumenmandel siehe Tonsilla palatina.
Gaumenspalte 7, 100.
Geschwülste der Mundhöhle 55; des Rachens 194; der Nase 266; der Speicheldrüsen 78; der Nebenhöhlen der Nase 300, 304, 305, 306.
Geschwüre der Mundhöhle 27, des Rachens 177, 179; der Nase 227, 248, 252, 253, 255, 256, 257.
Geruchlosigkeit 277.
Gingivitis 10.
Globus hystericus 22, 199.
Glossitis dissecans 19; syphilitica indurativa 20; suppurativa 17.
Glossodynia exfoliativa 35; nervosa 35, 58.
Granula 126
Guineawurm 53.
Gumma der Mundhöhle 42; des Rachens 179; der Nase 248.
Gurgelwässer 95.

Hämatoma retropharyngeale 190; der Nase 261.
Halsumschläge 94.
Hasenscharte 7.
Hemiglossitis herpetica 24.
Herpes labialis 23; pharyngis 151; narium 243.
Herzaffectionen bei Diphtherie 166.
Heufieber 284.
Hydrargyrose 27.
Hydrops der Kieferhöhle 298; der Stirnhöhle 301.
Hygiene der Haut 110.
Hyperästhesia gustatoria 60; olfactoria 278; der Mundhöhle 58; des Rachens 198; der Nase 276.
Hypergeusia 60.
Hyperosmie 278.
Hypertrophie der Gaumenmandeln 128; der Rachenmandeln 116; der Lippen 8; Nasenknorpel und Knochen 232; Muscheln 231; der Parotis 78; der Seitenstränge 127; der Uvula 135; der Zunge 19; — der Zungenbalgdrüsen 22.
Hypochondrie und Hysterie des Halses 134, 199.

Ichthyosis oris 12.
Inhalationsapparate 96, 217.
Inspection der Mundhöhle 5; des Rachens 88; der Nase 213; des Nasenrachenraums 89.
Insufflationen 97, 219.
Irrigator für die Nase 216.

Kakosmia objectiva 237; subjectiva 278.
Keratosis oris 12.
Keuchhustengeschwür 32.
Kieferklemme 9.
Knochenblasen der Nase 223, 306.
Knoten syphil. siehe Gumma.
Krämpfe der Kaumuskeln 62; Lippen 62; des orbicularis oris 62; der Rachenmuskeln 201; der Zunge 61.

Lacunen Katarrh der 108.
Lähmung der Kaumuskeln 63; der Lippen 63; der Zunge 63; diphtheritische 167; der Rachenmuskeln 168, 203.
Landkartenzunge 34.
Lepra des Mundes 48; des Rachens 186.
Leptothrix buccalis 3, 52, 188.
Leukoplakia oris 12.
Lichen ruber planus oris 15.
Löffel schafer 16.
Lupus der Mundhöhle 47; des Rachens 185; der Nase 256.

Makroglossie 19.
Mandel siehe Tonsilla.
Mandelsteine 193.
Massage 7, 95.
Maul- und Klauenseuche der Mundhöhle 48; des Rachens 187.
Menthol 97, 219, 289.
Micrococcus diphtheriae 156.
Microstomie 7.
Migräne 287.
Miliaria des Rachens 151.

Missbildungen der Mundhöhle 7; — des Rachens 100; der Nase 220.
Mukokele 298, 301.
Mumps 70.
Mundentzündung siehe Stomatitis.
Mundfäule 30.
Mykosen der Mundhöhle 49; des Rachens 187; der Nase 259.
Mykosis tonsillaris benigna 187.
Myocarditis bei Diphtherie 166.
Myxadenitis labialis 20.

Nase angeborne Enge 222; — Weite 222; Bad 216; Blennorrhoe 229, 237; Blutungen 260; — Bürste von Hartmann 240; Catarrh purulenter 229; — Douche 216; — Husten 287; Schleimpolypen 266; — Sonde 215; Spiegel 213; Syphilis 247.
Nasenrachen-Catarrh acuter 107; chronischer 115; phlegmonöser 144; Polypen 267.
Nebenhöhlen der Nase, Anatomie 293; Krankheiten der 293.
Nervenkrankheiten der Mundhöhle 58; des Rachens 198; der Nase 275.
Neubildungen der Mundhöhle 55; des Rachens 194; der Nase 266; der Speicheldrüsen 78; der Nebenhöhlen 300, 304, 305, 306.
Neuralgie der Mundhöhle 58; des Rachens 199; der Nase 276.
Neurasthenia nasalis 280.
Neurose secretorische 201; vasomotorische des Rachens 201; der Nase 282, 283.
Nierenaffection bei Diphtherie 165.
Nigritics linguae 21.
Niesanfälle 285.
Noma 37.

Oedem acutes der Lippen etc. 61; — des Rachens 142; der Nase 245.
Oidium albicans 49, 51, 187.
Orchitis parotidea 71.
Osteome todte der Nase 304.
Ozaena genuine 237; scrofulöse 255; symptomatische 240; syphilitische 249.
Ozaenacoccus 237.

Palpation der Mundhöhle 6; des Rachens 93; der Nase mit Sonde 215.
Papeln siehe Plaques.
Papillitis 10.
Parästhesia oris 59; — gustatoria 60; olfactoria 278; pharyngis 199.
Parasiten der Zunge 53; — der Nase 259.
Parosmie 278;
Parotitis epidemica 69; suppurativa 73.
Pavor nocturnus 135.
Peenash 259.
Pemphigus der Mundhöhle 24; des Rachens 152.
Perforationen des harten Gaumens 8, 42; des weichen Gaumens 101, 179; des Septum — 220; 227, 252, 254, 255.
Perichondritis der Nasenscheidewand 232; serosa 243.
Periglossitis sublingualis 18.
Periparotitis 70.
Peritonsillitis 145.
Pharyngitis acuta catarrhalis 106; atrophicans 115, 130, 142; chronica 114; diphtheritica 154; exsudativa 151; fibrinosa 153; fötida 131; gangränosa 176; granulosa 126; hypertrophica 115; lateralis 127; phlegmonosa 142; sicca 115, 130, 142; scrophulosa 184, 185; typhosa 113.
Pharyngokele 105.
Pharyngomykosis benigna sive leptothricia 52, 188.
Pharyngoskopie siehe Rhinoskopie.
Pharynxhydrargyrose 28.
Plaques gutartige der Zunge 34; pterygoidiennes 33; syphilitische der Mundhöhle 41; des Rachens 178; der Nase 248.
Processus styloideus, abnorme Länge des, 101.
Prolapsus linguae 19.
Psoriasis oris 12.
Ptyalismus 66.
Punaisie 239.

Rachencatarrh siehe Pharyngitis.
Rachenhusten 133.
Rachenmandel s. Tonsilla pharyngea.
Ranula 57.
Raucherplaques 12.
Räume pneumatische 293.
Reflexneurosen 116, 119, 133, 221, 233, 239, 279.
Retropharyngealabscess 147; Hämatom 190; Struma 196.
Rhagaden im Mundwinkel 41.
Rhineurynter 263.
Rhinitis catarrhalis acuta 225; chronica atrophicans 231; — atrophicans foetida 237; hypertrophica 231; crouposa fibrinosa 245; diphtheritica 160; exsudativa 243; gangränosa 247; phlegmonosa 242; purulenta 229.
Rhinobyon 263.
Rhinolithen 265.
Rhinosclerom 187, 257, 307.
Rhinoskopia anterior 213; posterior 89.
Rhinoskopisches Bild 90.
Ringmesser von Gottstein 123; Hartmann 123; V. Lange 123; W. Mayer 122.

Rosenfieber 284.
Rothlauf des Rachens 143.
Rotz der Mundhöhle 48; des Rachens 187; der Nase 256.

Salivation 66, 287.
Sarcine 52, 189.
Sattelnase 220.
Scarificationen 95.
Schleimhautpapel siehe Plaques.
Schlingenschnürer gedeckter von Hartmann 123; für die Nase 271.
Schnupfen nervöser 283, 285.
Schnupfpulver siehe Coryzarien.
Schwämmchen 49.
Schwellgewebe der Nase 211; abnorme Reizbarkeit 231, 282.
Scrophulose des Rachens 184, der Nase 255.
Seitenstränge Entzündung 127.
Septum Abscess 242; Defecte 220; Verbiegungen und Auswüchse 221, 223.
Sialodochitis fibrinosa 75.
Sinus-Krankheiten 293.
Soor des Mundes 49; — Rachens 187; der Nase 259.
Speicheldrüsen-Anatomie 65; Krankheiten der 65; -fluss 66, 67; -steine 80; -verminderung 68.
Spinen des Septum 223.
Sprays 96, 217.
Spritzen für die Nase 217.
Stallfieber 284.
Staphylhämatom 190.
Stenosen siehe Verengerungen.
Stomacace 30.
Stomatitis aphthosa 25; catarrhalis 9; diphtheritica 36; exsudativa 23; gangraenosa 37; mercurialis 27; parenchymatosa 16; phlegmonosa 16; scorbutica 29; sicca 11; ulcerosa 27.
Stomatomykosis sarcinica 52.
Strahlenpilz 53.
Stricturen siehe Verengerungen.
Struma retropharyngea 196.
Sublingualis, Erkrankungen der, 75.
Submaxillaris, Erkrankungen der, 75.
Supraorbitalneuralgie 276, 287, 301.
Sykosis des Naseneingangs 244.
Synechien der Nase 223, 246.
Syphilis der Mundhöhle 41; des Rachens 178; der Nase 247.

Tamponade d. Nase n. Gottstein 214, hintere und vordere 263.
Therapie allgemeine der Mundhöhle 6; des Rachens 94; der Nase 216;
Thränenträufeln 285.
Tonsilla palatina 85; Hypertrophie der 128; pharyngea 84; Hypertrophie der 116.
Tonsillotomie 141.
Trichine 53.
Trichter von Zaufal 92, 214, 215.
Trigeminus-Husten 133, 287, 288; -Neuralgie 287.
Trismus 62.
Tuberkulose der Mundhöhe 45; des Rachens 182; der Nase 253; der Nebenhöhlen 307.
Tylosis oris 12.

Universalhandgriff für galvanokaustische Operationen 98.
Untersuchungsmethode der Mundhöhle 5; des Rachens 88; der Nase 213.
Uraemie bei Diphtherie 166.
Uvula 85; Formfehler 101; Hypertrophie 135.
Uvulotomie 140.

Variola der Mundhöhle 24; des Rachens 153.
Vegetationen siehe Wucherungen.
Verbiegungen des Septum 221.
Verengerungen der Mundhöhle 7; des Larynx und Trachea 167; der Nase 220, 222; des Pharynx 102, 103, 180, 183.
Verkalkung der Nasenschleimhaut 265; der Nebenhöhlen 307.
Verwachsungen der Mundhöhle 7; des Rachens 102, 180, 183; der Nase 220, 246; der Tuben 102.

Wasserkrebs 37.
Wolfsrachen 7, 100.
Wucherungen adenoide 116; polypoide der Nase 231, 232.

Zäpfchen siehe Uvula.
Zahnbildung in der Nase 269.
Zahnfleisch Entzündung des 10; Tuberculose 45; Neubildungen 55.
Ziegenpeter 70.
Zunge Belag 2; Carcinom 56; phlegmonöse Entzündung 17; parenchymatöse 19; schwarze 21; Syphilom 42; Tuberculose 45.
Zungenbändchen zu kurzes, zu langes 8.
Zungenpapillen — Hypertrophie der 20.
Zungensteine 55.

16 F 27

DIE KRANKHEITEN

DER

MUNDHÖHLE, DES RACHENS UND DER NASE.

Mit Einschluss

der

Rhinoskopie und der local-therapeutischen Technik

für

praktische Aerzte und Studirende

von

DR. PHILIPP SCHECH,

Docent an der Universität München.

Mit 14 Abbildungen.

Zweite sehr vermehrte und verbesserte Auflage.

LEIPZIG UND WIEN.

TOEPLITZ & DEUTICKE.

1888.

Im gleichen Verlage erschienen:

Anatomie:

Ueber die topographischen Verhältnisse des Genitales einer inter partum verstorbenen primipara. Von Prof. Dr. *Hans Chiari*. Mit 5 lith. Tafeln und 2 Abbild. 4°. 1885. Preis fl. 3.60 = M. 6.—.

Anatomie der äusseren Formen des menschlichen Körpers. Von Prof. Dr. *Carl Langer*. Mit 120 Holzschn. 1884. Preis fl. 5.40 = M. 9.—.

Arzneiverordnungslehre:

Arzneiverordnungslehre für Aerzte und Studirende. Von Dr. *Alfred Buchwald*. Mit 15 Holzschn. 1885. Preis fl. 1.80 = M. 3.—.

Augenspiegel:

Der Augenspiegel und die ophthalmoskopische Diagnostik. Von Doc. Dr. *F. Dimmer*. Mit 73 Abbild. im Text. 1887. 8°. Preis fl. 3.— = M. 5.—.

Chirurgie:

Handbuch der chirurgischen Technik bei Operationen und Verbänden. Von Dr. *Albert R. v. Mosetig-Moorhof*. Mit 230 Abbild. Zweite verb. u. verm. Aufl. 1886. 8°. Preis fl. 10.80 = M. 18.—, eleg. geb. fl. 12.— = M. 20.—.

Coca:

Das Cocablatt. Eine pharmakognostische Abhandlung von Dr. *Jos. Nevinný*. Mit 4 lithogr. Taf. und 2 Abbild. 1886. Preis fl. 1.50 = M. 2.50.

Elektrotherapie:

Grundriss der Elektrotherapie. Von Dr. *A. Watteville* (London). Autor. deutsche Ausg. von Dr. *Max Weiss* in Wien. Mit 100 Abb. 8°. 1886. Preis fl. 3.60 = M. 6.—.

Epistaxis:

Die Epistaxis und ihre Behandlung vom rhino-chirurgischen Standpunkte. Von Dr. *Egmont Baumgarten*. 1886. Preis fl. —.80 = M. 1.40.

Gebärmutter-Ruptur:

Ueber Ruptur der Gebärmutter und ihre Mechanik. Von Prof. *L. Bandl*. Mit 4 lithogr. Taf. 8°. 1875. Preis fl. 2.— = M. 4.—.

Geburtshilfe, operative:

Die Beckeneingangszangen. Uebersichtliche Darstellung der modernen Zangenmodificationen und ihrer Verwerthbarkeit für die Extraction des im Beckeneingange stehenden Schädels. Von Docent Dr. *Carl Breus*. Mit 29 Holzschn. 1885. 8°. Preis fl. 1.80 = M. 3.—.

Geburtshilfe, praktische:

Die praktische Geburtshilfe für Aerzte und Studirende bearb. v. Dr. *Josef Horner*. Mit 90 Abbild. 1887. 8°. Preis fl. 3.60 = M. 6.—.

Geheimmittel:

Die wichtigsten Geheimmittel und Specialitäten. Eine Sammlung der neuesten Untersuchungs-Ergebnisse über ihre Zusammenstellung. Von Dr. *Fl. Kratschmer*. 1888. Preis fl. 3.60 = M. 6.—.

Greisenalter:

Das Greisenalter. Klinische Vorlesungen von Prof. *E. Demange*. Autorisirte deutsche Ausg. Von Dr. *F. Spitzer*. Mit 6 Taf. 1887. Preis fl. 1.80 = M. 3.—.

Hals- und Nasenkrankheiten:

Erfahrungen auf dem Gebiete der Hals- und Nasenkrankheiten. Von Dr. *O. Chiari*. 1887. Preis fl. 1.50 = M. 2.50.

Im gleichen Verlage erschienen:

Harnblase:

Die Tumoren der Harnblase mit Rücksicht auf Wesen, Symptome und Behandlung derselben. Von Sir *Henry Thompson* (London). Deutsch von Dr. *Richard Wittelshöfer*. Mit 40 Holzschn. u. 6 Taf. 1885. 8°. Preis fl. 2.40 = M. 4.—.

Harnconcretionen:

Die Harnconcretionen des Menschen und die Ursachen ihrer Entstehung. Von Prof. Dr. *R. Ultzmann*. Mit 22 Taf. in Lichtdruck. 1882. kl. 4°. Cart. Preis fl. 8.— = M. 14.—.

Hirnfurchung:

Ueber die Bedeutung der Hirnfurchung. Von Doc. Dr. *Joh. Seitz*. Mit 39 Abbild. 1887. Preis fl. 1.50 = M. 2.50.

Hydrotherapie:

Zur Pathologie und Hydrotherapie der Cholora. Von Prof. Dr. *W. Winternitz*. 1887. Preis fl. —.90 = M. 1.50.

Zur Pathologie und Hydrotherapie der Lungenphthise. Von Prof. Dr. *W. Winternitz*. 1887. Preis fl. 1.20 = M. 2.—.

Infections-Krankheiten:

Die Infections-Krankheiten vom ätiologischen und hygienischen Standpunkte. Systemat. Zusammenstellung der wichtigsten Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der gegenwärtigen Infectionslehre. Von Prof. Dr. *J. Nowak*. Mit 2 Holzschn. und 1 lithograph. Tafel. 1882. Preis fl. 2.— = M. 3.60.

Kehlkopf-Krankheiten:

Die Krankheiten des Kehlkopfes. Mit Einschluss der Laryngoskopie und der laryngo-therapeutischen Technik. Von Doc. Dr. *J. Gottstein*. Mit 34 Abbild. 1884. Preis fl. 3.60 = M. 6.—.

Lues congenita tarda:

Ueber Lues congenita tarda. Von Dr. *J. Rabl*. 1887. Preis fl. 1.80 = M. 3.—.

Magenoperationen:

Die Magenoperationen an Prof. Billroth's Klinik. 1880 bis März 1885. Von Dr. *Victor R. v. Hacker*. 1886. Preis fl. 1.20 = M. 2.—.

Massage:

Die Massage und ihre Verwerthung in den verschiedenen Disciplinen der praktischen Medicin. Von Dr. *A. Reibmayr*. 3. Aufl. 1887. Preis fl. 1.80 = M. 3.—.

Die Technik der Massage. Von Dr. *A. Reibmayr*. Mit 130 Holzschn. 3. Aufl. 1888. Preis fl. 2.40 = M. 4.—.

Nerven-Krankheiten:

Neue Vorlesungen über die Krankheiten des Nervensystems, insbesondere über Hysterie. Von *J. M. Charcot*. Autor. deutsche Ausgabe von Dr. *Sigm. Freud*. Mit 59 Abbild. 1886. Preis fl. 5.40 = M. 9.—.

Nervöse Centralorgane:

Anleitung beim Studium des Baues der nervösen Centralorgane im gesunden und kranken Zustande. Von Prof. Dr. *H. Obersteiner*. Mit 178 Abbild. 1888. Preis fl. 7.80 = M. 13.—.

Netzhaut:

Untersuchungen über den feineren Bau der Netzhaut. Mit 91 Abbild. Von Prof. Dr. *M. Rorysiekiewicz*. 1887. Preis fl. 2.40 = M. 4.—.

Im gleichen Verlage erschienen:

Neurasthenie:

Die sexuelle Neurasthenie, ihre Hygiene, Aetiologie, Symptome und Behandlung. Mit einem Capitel über die Diät für Nervenkranke von weil. *G. M. Beard.* Herausgegeben von *A. D. Rockwell.* Autor. deutsche Ausgabe. 1885. Preis fl. 2.— = M. 3.60.

Pneumonie:

Die acute lobäre Pneumonie. Von Prof. *R. Lépine* (Lyon). Deutsch von Doc. Dr. *K. Bettelheim.* Mit 2 Holzschn. 1883. Preis fl. 3.— = M. 5.—.

Privat-Irrenanstalt:

Die Privat-Irrenanstalt vom medicinal- und sanitätspolizeilichen Standpunkte. Von Dr. *A. Schmitz.* 1887. Preis fl. 1.80 = M. 3.—.

Prostitution:

Die Prostitution in Wien in historischer, administrativer und hygienischer Beziehung von Dr. *Jos. Schrank.* 2 Bde. 1886. Preis fl. 6.— = M. 12.—.

Psychiatrie:

Jahrbücher für Psychiatrie. Redigirt von Hofrath Dr. *Th. Meynert* und Doc. Dr. *J. Fritsch.* Erschienen Band I—VII. 1879—1887.

Zur Pathogenese der Gehirnblutungen. Von Dr. *C. Lechner.* (Separ.-Abdr.) 1881. Preis fl. 1.— = M. 2.—.

Rachen-Entzündung:

Die chronische Rachen-Entzündung. Eine klinisch-anatomische Studie. Von Dr. *W. Roth.* 1883. 8°. Preis fl. —.50 = M. 1.—.

Rückenmarks-Krankheiten:

Die Krankheiten des Rückenmarks. Von *Byrom Bramwell* (Edin). Uebersetzt von Doc. Dr. *Nathan Weiss.* 2. Aufl. von Dr. *Max Weiss.* Mit 102 Holzschn. und 81 lith. Abbild. 1885. Preis fl. 7.20 = 12.—.

Rückenmarks-Schwindsucht:

Die Rückenmarks-Schwindsucht. Eine Vorlesung. Von Prof. Dr. *A. Adamkiewicz.* Mit 4 Holzschn. u. 2 lithogr. Taf. 1885. Preis fl. 1.20 = M. 2 —.

Scrofulose:

Die Scrofulose, ihre Pathologie und allgemeine Therapie. Von Dr. *O. Kanzler.* 1887. Preis fl. 1.80 = M. 3.—.

Syphilis:

Die Syphilis und die venerischen Krankheiten. Ein kurzgefasstes Lehrbuch zum Gebrauch für Studirende und praktische Aerzte. Von Doc. Dr. *Ernest Finger.* Mit 4 Farbentafeln. 1886. Preis fl. 4.20 = M. 7.—.

Tobsucht:

Die transitorische Tobsucht. Eine klinisch-forensische Studie. Von Dr. *Otto Schwartzer.* 1880. Preis fl. 2.— = M. 4.—.

Wörterbuch, medicinisches:

German English medical dictionary. By *Joseph R. Waller.* MD. 1884. geb. Preis fl. 2.— = M. 3.60.

Wundbehandlung an Billroth's Klinik:

Anleitung zur antiseptischen Wundbehandlung nach der an Prof. Billroth's Klinik gebräuchlichen Methode. Von Dr. *Victor R. v. Hacker.* 2. Aufl. 1884. Preis fl. —.50 = M. 1.—.

Druck von Wilhelm Köhler, Wien, VI. Mollardgasse 41

COUNTWAY LIBRARY
HC 1YX3 E